

# אינפי 1 – מתמטיקה – פתרון תרגיל 5

1. גזו את הפונקציות הבאות:

$$f(x) = \sin\left(\frac{12x^3 - x^2 + 2x - 1}{3x^4 - 1}\right) \text{ א.}$$

$$f'(x) = \cos\left(\frac{12x^3 - x^2 + 2x - 1}{3x^4 - 1}\right) \cdot \frac{(36x^2 - 2x + 2)(3x^4 - 1) - (12x^3 - x^2 + 2x - 1)12x^3}{(3x^4 - 1)^2} \text{ פתרון:}$$

$$f(x) = (\sin(x^2 - 7) + \cos(2x + 5))^{10} \text{ ב.}$$

$$f'(x) = 10(\sin(x^2 - 7) + \cos(2x + 5))^9 (\cos(x^2 - 7)2x - \sin(2x + 5) \cdot 2) \text{ פתרון:}$$

$$f(x) = \ln\left(\ln\left(\frac{3x - 12}{x^2 + 1}\right)\right) \text{ ג.}$$

$$\left(\frac{3x - 12}{x^2 + 1}\right)' = \frac{3(x^2 + 1) - (3x - 12)2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{3 - 3x^2 + 24x}{(x^2 + 1)^2} \text{ פתרון:}$$

$$\left(\ln\left(\frac{3x - 12}{x^2 + 1}\right)\right)' = \frac{x^2 + 1}{3x - 12} \frac{3 - 3x^2 + 24x}{(x^2 + 1)^2} \text{ לכן:}$$

$$\left(\ln\left(\ln\left(\frac{3x - 12}{x^2 + 1}\right)\right)\right)' = \frac{1}{\ln\left(\frac{3x - 12}{x^2 + 1}\right)} \frac{x^2 + 1}{3x - 12} \frac{3 - 3x^2 + 24x}{(x^2 + 1)^2} \text{ לכן:}$$

$$f(x) = e^{x^3 \sin(x)} \text{ ז.}$$

$$f'(x) = e^{x^3 \sin(x)} (3x^2 \sin(x) + x^3 \cos(x)) \text{ פתרון:}$$

$$f(x) = \tan(5x + \sqrt{x^2 - 2x - 1}) \text{ ה.}$$

$$f'(x) = \frac{1}{\cos^2(5x + \sqrt{x^2 - 2x - 1})} (5 + \frac{1}{2\sqrt{x^2 - 2x - 1}}(2x - 2)) \text{ פתרון:}$$

$$f(x) = \sqrt[6]{7x^2 - 3} \text{ ו.}$$

$$f'(x) = \frac{1}{6} (7x^2 - 3)^{\frac{-5}{6}} 14x = \frac{1}{6\sqrt[6]{(7x^2 - 3)^5}} \text{ לכן } f(x) = (7x^2 - 3)^{\frac{1}{6}}$$

2. גזו את הפונקציות הבאות:

$$f(x) = (x - 5)^{(2x+4)} \text{ א.}$$

$$f(x) = e^{\ln((x-5)^{(2x+4)})} = e^{(2x+4)\ln(x-5)} \text{ פתרון:}$$

$$f'(x) = e^{(2x+4)\ln(x-5)} \left(2\ln(x-5) + \frac{2x+4}{x-5}\right) = (x-5)^{(2x+4)} \left(2\ln(x-5) + \frac{2x+4}{x-5}\right)$$

$$f(x) = (\sin x)^{\cos x} . \text{ ב.}$$

פתרונות:  $f(x) = e^{\ln((\sin x)^{\cos x})} = e^{\cos x \ln(\sin x)}$

$$f'(x) = e^{\cos x \ln(\sin x)} \left(-\sin x \ln(\sin x) + \cos x \frac{\cos x}{\sin x}\right) = (\sin x)^{(\cos x)} \left(-\sin x \ln(\sin x) + \frac{\cos^2 x}{\sin x}\right)$$

ולכן:  $f(x) = \sin(x^{\cos x}) . \text{ ג.}$

פתרונות: נסמן  $g(x) = x^{\cos x} = e^{\ln(x^{\cos x})} = e^{\cos x \ln x}$

$$g'(x) = e^{\cos x \ln x} \left(-\sin x \ln x + \frac{\cos x}{x}\right) = x^{\cos x} \left(\frac{\cos x}{x} - \sin x \ln x\right)$$

$$f'(x) = \cos(x^{\cos x}) x^{\cos x} \left(\frac{\cos x}{x} - \sin x \ln x\right)$$

ולכן:  $f(x) = \cos(x^{\cos x}) x^{\cos x} \left(\frac{\cos x}{x} - \sin x \ln x\right)$

3. מצאו את הנגזרות מסדר גבוה הבודאות:

$$y = \tan(x) \text{ עבור } \frac{d^2 y}{dx^2} . \text{ א.}$$

פתרונות:  $y'' = \frac{-1}{\cos^4 x} 2\cos x (-\sin x) = \frac{2\sin x}{\cos^3 x}$  לכן  $y' = \frac{1}{\cos^2 x}$

$$y = \frac{x^3 - 3}{x^2 + 2} \text{ עבור } \frac{d^2 y}{dx^2} . \text{ ב.}$$

פתרונות:  $y' = \frac{3x^2(x^2+2) - (x^3-3)2x}{(x^2+2)^2} = \frac{3x^4 - 2x^4 + 6x^2 + 6x}{(x^2+2)^2}$

$$y''' = \frac{(12x^3 - 8x^3 + 12x + 6)(x^2+2)^2 - (3x^4 - 2x^4 + 6x^2 + 6x)2(x^2+2)2x}{(x^2+2)^4}$$

ולכן:  $y''' = \frac{(4x^3 + 12x + 6)(x^2+2)^2 - (6x^4 + 12x^2 + 12x)2(x^2+2)2x}{(x^2+2)^4}$

פתרונות:  $y = e^{e^x} \text{ עבור } \frac{d^3 y}{dx^3} . \text{ ג.}$

$$y' = e^{e^x} e^x$$

$$y'' = e^{e^x} e^x e^x + e^{e^x} e^x = e^{e^x} e^x (e^x + 1) = e^{e^x+x} (e^x + 1)$$

$$y''' = e^{e^x+x} (e^x + 1) (e^x + 1) + e^{e^x+x} e^x = e^{e^x+x} ((e^x + 1)^2 + e^x)$$

$$y = 3e^{2x+5} + 16x + 4 \text{ עבור } \frac{d^5 y}{dx^5} . \text{ ד.}$$

פתרונות:

$$y' = 6e^{2x+5} + 16$$

$$y'' = 12e^{2x+5}$$

$$y^{(3)} = 24e^{2x+5}$$

$$y^{(4)} = 48e^{2x+5}$$

$$y^{(5)} = 96e^{2x+5}$$

$$y=4\sin(2x-3)+6\cos(15-x)+2 \quad \text{עבור } \frac{d^{92}y}{dx^{92}} \text{.}$$

**פתרון:**

עבור  $f(x)=4\sin(2x-3)$ , כיוון שרוצים את הנגזרת ה-92, זה כמו הנגזרת ה-0 (הפונקציה עצמה), כי זו כפולה של 4. לכן  $f^{(92)}=4\cdot 2^{92}\sin(2x-3)=2^{94}\sin(2x-3)$ .

עבור  $g(x)=6\cos(15-x)$  קיבל באותו האופן  $g^{(92)}=6\cdot(-1)^{92}\cos(15-x)=6\cos(15-x)$  ולכן  $g(x)=6\cos(15-x)$ . לכן סה"כ:  $y^{(92)}=2^{94}\sin(2x-3)+6\cos(15-x)$

$$\text{רמז: השתמשו בנוסחה של סינוס לזוויות כפולות} \quad y=\sin(x)\cos(x) \quad \text{עבור } \frac{d^{20}y}{dx^{20}}.$$

$$\text{פתרון: } \sin(x)\cos(x)=\frac{1}{2}\sin(2x) \quad \text{לכן } \sin(2x)=2\sin(x)\cos(x) \quad \text{לכן כמו בתרגיל לעיל קיבל:}$$

$$y^{(20)}=\frac{1}{2}\sin(2x)2^{20}=2^{19}\sin(2x)$$

**4. פתרון:**

באיינטגרציה  $f(x)=e^{nx}$   $f'(x)=ne^{nx}$ ,  $f''(x)=n^2e^{nx}$ ,  $f'''(x)=n^3e^{nx}$  וכו', כלומר  $f^{(n)}(x)=n^n e^{nx}$ . (פורמלית ניתן להוכיח נוסחה זו)

**5. פתרון:**

$$\text{כלומר: } g''(x)=e^{f(x)}f'(x)f'(x)+e^{f(x)}f''(x) \quad \text{לכן } g'(x)=e^{f(x)}f'(x) \quad g(x)=e^{f(x)}$$

$$\cdot g''(x)=e^{f(x)}(f'(x)^2+f''(x))$$

$$6. \text{ היעזרו במשפט הפונקציה ההפוכה כדי למצוא את } \frac{dx}{dy} \quad \text{עבור } y=1+\frac{1}{x^4}$$

**פתרון:**

$$\frac{dy}{dx}=-4x^{-5}=\frac{-4}{x^5} \quad \text{לכן, } y=1+x^{-4}$$

$$\frac{dx}{dy}=\frac{-x^5}{4} \quad \text{לכן:}$$

$$x=\frac{1}{\sqrt[4]{y-1}} \quad \text{כלומר } x^4=\frac{1}{y-1} \quad y-1=\frac{1}{x^4}$$

ובנוסף:

$$\frac{dx}{dy}=\frac{-\left(\frac{1}{\sqrt[4]{y-1}}\right)^5}{4}=\frac{-1}{4\sqrt[4]{(y-1)^5}}$$