


הנדסה אנליטית

הפרבולה

הגדרת הפרבולה – המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שנמצאות במרחק שווה מנקודה קבועה ומישר קבוע נקרא פרבולה.

המשוואה האלגברית של הפרבולה



נבחר את המוקד כנקודה על הכיוון החיובי של ציר ה-x ואת המדרוך כישר המאונך לציר ה-x כך שציר ה-y חוצה את המרחק שבין המוקד למדרוך. לכן קודקוד הפרבולה הוא בראשית הצירים. מכאן ששיעורי המוקד הם $F(\frac{p}{2}, 0)$ ומשוואת המדרוך ℓ היא $x = -\frac{p}{2}$. נמצא את משוואתה של פרבולה כזאת, הנקראת פרבולה קנונית.

משוואת הפרבולה שמוקדה בנקודה $(\frac{p}{2}, 0)$ והמדרוך שלה הוא $x = -\frac{p}{2}$ היא:

$$y^2 = 2px$$

שאלה 1

מצא את משוואתו של מיתר בפרבולה $y^2 = 12x$ שאמצעו בנקודה (4,3).

שאלה 2

הישר $2x - y + 4 = 0$ חותך מהפרבולה $y^2 = 2px$ מיתרת שיעור ה-x של אמצע המיתר הוא 2.5, מצא את:

- א. משוואת הפרבולה.
- ב. את קצוות המיתר.

משיק לפרבולה

נדגיש תחילה שמשיק לפרבולה לא יכול להיות מאונך לציר ה- y (ראה הערה ג' בעמ' הבא). נוכל להגדיר:

ישר שאינו מאונך לציר ה- y משיק לפרבולה אם יש לו נקודה אחת ויחידה משותפת עם הפרבולה.

משוואת המשיק לפרבולה $y^2 = 2px$ בנקודה (x_1, y_1) שעליה היא:

$$yy_1 = p(x+x_1)$$

שאלה 3

ישר ששיפועו 2 משיק לפרבולה $y^2 = 16x$ מצא את משוואת הישר ואת נקודת ההשקה.

שאלה 4

ישר המאונך לציר X עובר דרך מוקד הפרבולה $y^2 = 12x$ וחותך אותה בנקודות A, B . מצא את משוואות המשיקים לפרבולה בנקודות A, B .

שאלה 5

2017 מועד ב'

נתונה הנקודה $A(20, 0)$.

B היא נקודה שנמצאת על ציר ה- y ואינה ראשית הצירים.

דרך הנקודה B מעבירים ישר ℓ_1 , המקביל לציר ה- x .

דרך ראשית הצירים, O , מעבירים ישר, ℓ_2 , שמאונך לישר AB .

הישרים ℓ_1 ו- ℓ_2 נחתכים בנקודה C .

א. הוכח שהמקום הגיאומטרי של הנקודות C הנבנות כמתואר נמצא על פרבולה, ומצא את משוואתה.