

החבורה הסימטרית (המשך)

בשבוע ש עבר הוכחנו משפט: $(1 \leq n \leq A_n \trianglelefteq S_n)$ (כל $n \leq A_n$ מושפע מ S_n).

ראשית - הכנות חשובות גם מצד עצמן:

A. קבוצת יוצרים ל A_n

תזכורת: קבוצת כל החלופים יוצרת את S_n .

מסקנה: $\{ \pi \in S_n : \text{sign}(\pi) = 1 \}$ היא בדיק קבוצת כל התמורות בהן מכפלות מאורך זוגי של חילופים. וכך

$$\left\{ (i, j) (k, l) : \begin{array}{l} i, j, k, l \in \{1, \dots, n\} \\ \text{different letters} \end{array} \right\} \coprod \left\{ (i, j) (j, l) : \begin{array}{l} i, j, l \in \{1, \dots, n\} \\ \text{different letters} \end{array} \right\}$$

יצרת את A_n

עובדת: לכל i, j, k, l אוטיות שונות $(i, j) (k, l) = (j, k, i) (j, k, l)$. כלומר כל שני כפლ מחזוריים מאורך 2 אפשר לייצג בתורה כפל שני מחזוריים מאורך 3.

מסקנה: קבוצת כל המוחזוריים מאורך 3 יוצרת את A_n

1. הצמדה

הגדרה: $xgx^{-1} = h \in G$ נקראים איברים צמודים אם קיים $x \in G$ כך ש $xgx^{-1} = h$.
תרגיל: זהיחס שקיולות.

תרגיל

שתי תמורות $\pi, \sigma \in S_n$ צמודות אם יש להן אותו מבנה מחזוריים.

עובדת

אם $x \trianglelefteq G$ אז לכל $N \in g$, כל הצמודים לו ג"כ בנ

הוכחה

$$xgx^{-1} \in xNx^{-1} = N, x \in G$$

משפט

עבור $n \leq 5$ לא טריוויאלית יחידה של S_n היא טריוויאלית יחידה של A_n .

הוכחה

תהא $N \subseteq S_n$. ניתן להניח $\{e\} \neq N$ (כי אחרת היא טריוויאלית).

$\frac{|N|}{|A_n|} = [N : A_n] = [N : A_n]$ מ"ל $N \subseteq A_n$. מ"ע כי אם $A_n \subseteq N$ או $A_n \subseteq N$ אז $A_n \subseteq N$. האינדקס הוא מספר שלם (לגרנו).

אם $A_n \subseteq N$ אז $[N : A_n] = \frac{|N|}{|A_n|} = 1$ נקבע $N = A_n$.

אם $N \subseteq S_n$ אז $[N : A_n] = \frac{|N|}{|A_n|} = 2$ מכיוון $|N| = |S_n|$, הנחנו $N \subseteq S_n$.

הערה: כמובן, לא $\exists \pi \in [N : A_n]$ (מ"ע כי אז נקבע $|S_n| \geq |N|$)

יתר על כן, מספיק להוכיח ש N מכילה מהJOR אחד מאורך 3, כי אם N מכילה מהJOR אחד מאורך 3 אז לפחות עיל, היא מכילה את כל ה策ומדים לויהות ו N תח"נ), וכן היא מכילה את כל המחוורים מאורך 3. קבוצת כל המחוורים מאורך 3 יוצרת את A_n (הוכחנו) ולכן $N \subseteq A_n$

כעת, תהא $S_n \subseteq N \neq \{e\}$. לכן קיימים איבר $\pi \in N$ שאינו $\pi = \gamma_1\gamma_2\gamma_3\dots\gamma_t$ פירוק של π מכפלה של מהחוורים זרים. בה"כ, π מהJOR מאורך מקסימלי בין גורמי המכפלה. יהא $\hat{\pi} = (i_1, i_2, \dots, i_m)$.

מקרה א $2 < m$
 אז $\hat{\pi} = (\hat{\gamma}_1, \hat{\gamma}_2, \dots, \hat{\gamma}_t)$. נסמן $\hat{\gamma}_1 := (i_1, i_2, \dots, i_m)$, $\hat{\gamma}_2 := (i_2, i_1, i_3, \dots, i_m)$, ..., $\hat{\gamma}_t := (i_t, i_1, i_2, \dots, i_{t-1})$.
 אותו מבנה מהחוורים, אך הם策ומדים, לכן מכיוון $\hat{\pi} \in N$ או גם $\pi \in N$ כולם $\hat{\pi}\pi^{-1}, \pi\hat{\pi}^{-1} \in N$ וגם $\hat{\pi}\pi^{-1} \in N$. נחשב:

$$\hat{\pi}\pi^{-1} = \hat{\gamma}_1\hat{\gamma}_2\hat{\gamma}_3\dots\hat{\gamma}_t(\gamma_1\gamma_2\gamma_3\dots\gamma_t)^{-1}$$

$$= \hat{\gamma}_1\hat{\gamma}_2\hat{\gamma}_3\dots\hat{\gamma}_t\gamma_t^{-1}\dots\gamma_3^{-1}\gamma_2^{-1}\gamma_1^{-1}$$

$$= \hat{\gamma}_1\gamma_1^{-1} = (i_2, i_1, i_3, \dots, i_m)(i_m, i_{m-1}, i_{m-2}, \dots, i_3, i_2, i_1) = \dots$$

נבדוק לאן כל איבר הולך: i_1 הולך ל i_2 , i_2 הולך ל i_3 , ..., i_3 הולך ל i_4 , ..., i_m הולך ל i_1 . i_4 הולך ל i_3 - וכל האיברים i_4, \dots, i_m הולכים לאן?

$$\dots = (i_1, i_2, i_3)$$

סיימנו מקרה א'.

מקרה ב נזכיר: $\pi = \gamma_1\dots\gamma_t \in N$ (מכפלה של מהחוורים זרים). ניתן להניח כולם מאורך 2.

תנאי מקרה ב': כל המחוורים מאורך 2.

אם $t = 1$ אז $\pi = \gamma_1$ חילופי. $N \subseteq S_n$ מכילה חילופי, אך מכילה את כל הח-ילופים (מ"ע כי הם策ומדים), לכן מכילה את ת"ח הנוצרת ע"י החילופים,

כלומר את $S_n \trianglelefteq N$. מסקנה: $N = S_n$. נ.א. $S_n \trianglelefteq N$.
 לכן, נניח $t \leq 2$ ונסמן $\hat{\gamma}_1 = (i_1, i_3)$, $\hat{\gamma}_2 = (i_2, i_4)$, $\pi = \gamma_1 \gamma_2 \dots \gamma_t$. נסמן: $\hat{\gamma}_t = \hat{\gamma}_1 \hat{\gamma}_2 \dots \hat{\gamma}_t$
 ל π ו $\hat{\pi}$ אותו מבנה מחזירים, לכן הם צמודים. $N \trianglelefteq S_n$ ו $\pi \in N$ לכן גם $\hat{\pi} \in N$ וגם $\hat{\pi} \pi^{-1} \in N$. נחשב:

$$\hat{\pi} \pi^{-1} = (\hat{\gamma}_1 \hat{\gamma}_2 \gamma_3 \dots \gamma_t) (\gamma_t^{-1} \dots \gamma_3^{-1} \gamma_2^{-1} \gamma_1^{-1})$$

$$= \hat{\gamma}_1 \hat{\gamma}_2 \gamma_2^{-1} \gamma_1^{-1} = (i_1, i_3) (i_2, i_4) (i_3, i_4) (i_1, i_2)$$

$$= (i_1, i_4) (i_2, i_3)$$

לכן N מכילה את כל התמורות שהן מכפלות של שני חילופים זרים ולא קיבלו מחרור מאורך (3).
בפרט עבור $n \leq 5$:
 n מכילה את $\sigma_1 = (1, 2)(4, 5) \in N$ ולכן $\sigma_2 = (4, 5)(2, 3) \in N$

$$N \ni \sigma_1 \sigma_2 = (1, 2)(4, 5)(4, 5)(2, 3) = (1, 2, 3)$$

כלומר N מכילה מחרור מאורך. סימנו. ■

חברות פשוטות

הגדרה

חבורה G היא פשוטה אם אין לה תת"נ לא טריויאלית. נ.א. אם $N = G \Leftrightarrow N \trianglelefteq G$ או $N = \{e\}$

דוגמה

חבורה מסדר ראשון p . G . לפי משפט לגרנז' $|N| \mid |G| = p \Leftrightarrow N \leq G$. אם $|N| = 1$ או $|N| = p$. נ.א. אם $|N| \in \{1, p\}$

משפט

עבור $n \leq 5$ חבורה פשוטה.

הוכחה

דומה להוכחת המשפט הקודם ותושםתו.

הערה

חישוב אחורי חבורות סופיות פשוטות ומינום, פרויקט ענק של ששים שנים אחרונות.

קבוצות יוצרים של S_n (השלמה)

תזכורת: נסמן $\{ (i, j) : 1 \leq i < j \leq n \}$ קבוצה כל החלופים ב- S_n .

הראינו: $S_n = \langle T_n \rangle$

הערה: $|\langle T_n \rangle| = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$

תרגיל: כל תמורה $S_n \in \pi$ ניתנת כתגובה מכפלה של לכל היותר $1 - n$ תמורות.

עובדיה

הקבוצה $\{ (i, n) : 1 \leq i < n \}$ יוצרת את S_n

הוכחה

לכל חילוף $(i, j) = (i, n)(j, n)(i, n), (i, j)$, כלומר, כל תמורה ניתנת כתגובה מכפלה של לכל היותר $3(n-1)$ חילופים מהקבוצה הנ"ל.

עוד קבוצה חשובה ביותר

קבוצת יוצרי קווקסטר: $\{ (i, i+1) : 1 \leq i < n \}$

עובדיה

קבוצת יוצרי קווקסטר יוצרת את S_n

הוכחה

לכל חילוף (i, j) :

$$(i, j) = (i, i+1)(i+1, i+2)(i+2, i+3) \dots (j-2, j-1)(j-1, j)(j-2, j-1) \dots (i_2, i_1)$$

משפט

לכל $\pi, \pi \in S_n$ ניתן כתיבה מכפלה של $(\pi)^{\text{inv}}$ יוצרי קווקסטר (ולא פחות)

הוכחה

לא תנתן

תרגיל

מצא קבוצה S_n , $|A| = 2$, $A \subseteq S_n$ שיצרת את

רמزا

$$\langle \gamma, \tau \rangle = S_n : \gamma = (1, 2, \dots, n), \tau = (1, 2)$$