

פיזיקה למתמטיקאים

משוואות אוילר לגראנג: תנועה על פני חרוט

1. כדור בעל מסה m מאולץ לנוע על פני חרוט (ללא חיכוך). מיקומו בכל רגע נתון בקורדינטות גליליות ע"י (r, θ, z) .

(א) רשמו את הלגראנגיין

תהי הזווית בין היוצר של החרוט לצירו, α . אזי $r = z \tan \alpha$ ונקבל

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + \dot{z}^2) - mgz = \\ &= \frac{1}{2}m(\dot{z}^2 \tan^2 \alpha + z^2 \tan^2 \alpha \dot{\theta}^2 + \dot{z}^2) - mgz \end{aligned} \quad (1)$$

(ב) רשמו את משוואות התנועה. מהו קבוע התנועה?

משוואות התנועה עברו θ, z בהתאם לה

$$m\ddot{z}(\tan^2 \alpha + 1) = mz \tan^2 \alpha \dot{\theta}^2 - mg, \quad (2)$$

$$\frac{d}{dt}(mz^2 \tan^2 \alpha \dot{\theta}) = 0, \quad (3)$$

כאשר התנועה הזוויתית

$$(4) \quad L = mz^2 \tan^2 \alpha \dot{\theta}$$

קבוע.

(ג) פתרו את משוואת התנועה עברו z כאשר ידוע כי $\dot{\theta} = -v_0$.

מحلוץ $\dot{\theta}$ מ (4) והצבה ב (2) נקבל

$$(5) \quad \ddot{z} = \frac{A}{z^3} - B,$$

כאשר $A = L^2 \cos^4 \alpha / m^2 \sin^2 \alpha$, $B = g \cos^2 \alpha$. על מנת לפתור את המשוואה ההומוגנית $\ddot{z} = A/z^3$ נכפול את שני האגפים שלה ב \dot{z} ונרשום $\frac{d}{dt}(\dot{z}^2/2) = \frac{d}{dt}(-A/2z^2)$, או $\ddot{z}\dot{z} = A\dot{z}/z^3$ ונקבל את המשוואה

$$(6) \quad \dot{z}^2 + \frac{A}{z^2} = C.$$

הפתרונות הכללי של (6) נתון ע"י $z_h = \sqrt{M \exp(4ct) - A/C}$, כאשר C קבוע אינטגרציה. הפתרון הכללי של (5) יהיה אפוא C, M

$$(7) \quad z = z_h - \frac{1}{2}Bt^2 = \sqrt{M \exp(4ct) - \frac{A}{C}} - \frac{1}{2}Bt^2$$

ומתנאי ההתלה נקבל

$$^1 .C = (v_0 z_0 - 2A)/2z_0^2, \quad M = v_0 z_0^3/(v_0 z_0 - 2A)$$

¹ יש לדרוש $2A > v_0 z_0$ על מנת שמשוואת (6) תהיה מוגדרת היטב. כמובן, אם נניח כי רדיוס הcador r_0 , אז משוויה (7) מתארת את התנועה עבור זמנים t המקיימים $.z(t) > r_0/\tan \alpha$