

# פיסיקה למתמטיקאים

## תרגיל 5: משוואות המילטון וחוקי שימור

1. הלגרנג'יאן של גוף בעל מסה  $m$  עם פוטנציאל  $U(r) = -GMm/r$  נתון ע"י

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) - U(r)$$

(א) מצאו את ההמילטוניאן של הבעיה.

האם הוא זהה לאנרגיה של המערכת? מדוע?

(ב) רשמו את משוואות התנועה של המילטון

(ג) רשמו את הלגרנג'יאן בקואורדינטות קרטזיות והראו כי הוא סימטרי

תחת טרנספורמצית סיבוב  $x \rightarrow x + \epsilon y, y \rightarrow y - \epsilon x$

(ד) מצאו שמורה של טרנספורמצית הסיבוב. מהי שמורה זו?

2. הלגרנג'יאן של חלקיק חפשי בקורדינטות פאראבוליות  $(\xi, \eta, \phi)$  נתון ע"י

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m(\xi^2 + \eta^2)(\dot{\xi}^2 + \dot{\eta}^2) + \frac{1}{2}m\xi^2\eta^2\dot{\phi}^2$$

(א) מצאו את התנעים הצמודים  $(p_\xi, p_\eta, p_\phi)$ .

(ב) מצאו את ההמילטוניאן.

3. נגדיר את סוגרי פואסון של שתי פונקציות

$f(q_1, \dots, q_n; p_1, \dots, p_n; t), g(q_1, \dots, q_n; p_1, \dots, p_n; t)$  להיות

$$\{f, g\} = \sum_i \left( \frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial g}{\partial q_i} \right)$$

(א) הוכיחו כי  $\frac{df}{dt} = \{f, \mathcal{H}\} + \frac{\partial f}{\partial t}$ , כאשר  $\mathcal{H}$  ההמילטוניאן של המערכת

(ב) רשמו את ההמילטוניאן משאלה 1 בקואורדינטות קרטזיות והראו כי

השמורה שמצאתם ב 1d מקיימת  $\{f, \mathcal{H}\} = 0$

(ג) הכלילו את תוצאת 3b לפוטנציאל כלשהוא מהצורה

$$U(x, y) = U(x^2 + y^2)$$

4. הוכיחו את התכונות הבאות של סוגרי פואסון

(א) אנטיסימטריות  $\{f, g\} = -\{g, f\}$  ולכן  $\{f, f\} = 0$

(ב)  $\{f, const\} = 0$

(ג) לינאריות  $\{f, \alpha g + \beta h\} = \alpha\{f, g\} + \beta\{f, h\}$

(ד) זהות יעקובי  $\{f, \{g, h\}\} + \{h, \{f, g\}\} + \{g, \{h, f\}\} = 0$

$$\{f, gh\} = \{f, g\}h + \{f, h\}g \quad (\text{ה})$$

5. ההמילטוניאן של אוסילטור הרמוני פשוט נתון ע"י

$$\mathcal{H} = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$$

$$a = \sqrt{\frac{m\omega}{2}} \left( x + i\frac{p}{m\omega} \right), \quad a^* = \sqrt{\frac{m\omega}{2}} \left( x - i\frac{p}{m\omega} \right)$$

(א) בטאו את  $\mathcal{H}$  באמצעות  $a, a^*$ .

(ב) חשבו את סוגרי פואסון  $\{a, a^*\}$ ,  $\{a, \mathcal{H}\}$ ,  $\{a^*, \mathcal{H}\}$ .

(ג) רשמו את משוואות התנועה עבור  $a, a^*$  ופתרו אותן.

(ד) בטאו את  $x, p$  באמצעות הפתרונות שקיבלתם.

(ה) חשבו את  $\{x, p\}$  ע"י שימוש בתוצאות 5ד. השוו לחישוב הישיר.