

פיזיקה למתמטיקאים

תרגיל 1: דינמיקה

1. גוף בעל מסה m נע בהשפעת כח הכביד ובהשפעת התנודות האוויר. התנ-
גדות האוויר פרופורציונית ל מהירות הגוף ונתונה ע"י $\gamma \hat{z} = F$, כאשר γ
קבוע חיובי.

- (א) מהם הממדים של γ ?
 - (ב) רשמו את משוואות התנועה (עבור המהירות) בכוונים x ו y .
 - (ג) רשמו פתרון כללי למשוואת התנועה בכוון y .
 - (ד) מהו פתרון משווהת התנועה בכוון x ?
 - (ה) בטאו את מהירות הגוף לאחר זמן רב בעזרת m, γ ו g , אם ידוע כי ב-
 $t = 0$ הגוף במנוחה
 - (ו) נניח כי אנו נתונים בבעיה של זריקה, כך שבאופן עקרוני הגוף יכול לנوع
בשלשה כוונים במרחב. מדוע ניתן להסתפק בפתרון דו מימדי (בכוון-
ים x, y ?)?
2. חלקיק טוען בעל מסה m ומטען חשמלי q נע בהשפעת שדה חשמלי $\hat{E} = E\hat{y}$
ושדה מגנטי $\hat{B} = B\hat{z}$. הכוחות החשמלי והמגנטי נתונים ע"י $E = q\hat{E}$ ו $B = qv \times \hat{B}$ בהתאם. (הערה: הניחו כי מסת החלקיק זניחה).
- (א) רשמו את משוואות התנועה של החלקיק עבור המהירות.
 - (ב) מהו פתרון משווהות התנועה בכל כוון?
 - (ג) נתנו שב $t = 0$ מהירות החלקיק נתונה ע"י $(v_x, v_y, v_z) = (v_0, 0, 0)$ (v_0 ו v_0 והגדלים הנתונים בשאלת).
 - (ד) נתנו שב $t = 0$ החלקיק נמצא בראשית הצירים. מהו וקטור המקום
של החלקיק כפונקציה של הזמן?
 - (ה) תארו באופן איקוני את צורת המסלול שמבצע החלקיק.
 - (ו) מהו המסלול שהוא מבצע החלקיק אם מהירותו ההתחלתית הייתה
בכוון z בלבד?