

אינפי 1 - תרגיל 2

1. הוכח ש  $\sqrt{3}$  אינו רציונאלי

**פתרון:**

נניח בשלילה ש  $\sqrt{3}$  רציונאלי, לכן הוא שווה לשבר המצומצם  $\frac{p}{q} = \sqrt{3}$  נעלה בריבוע  $p^2 = 3q^2$ . לכן  $p$  מתחלק בשלוש, כלומר  $p = 3p'$  עבור  $p'$  כלשהוא, לכן  $p^2 = 9p'^2 = 3q^2$  לכן  $3p' = q$  לכן  $q$  גם מתחלק ב-3 כמו  $p$  בסתירה לכך שהשבר מצומצם.

2. יהי  $x \in \mathbb{R}$  מספר ממשי המקיים  $x \geq 0$ . נניח בנוסף  $x < \varepsilon$   $\forall \varepsilon > 0$ . הוכח/הפוך:  $x = 0$ .

**הוכחה:**

נניח בשלילה  $x \neq 0$ , לכן לפי הנתון  $x > 0$ . ניקח  $\varepsilon = \frac{x}{2}$ , לכן  $0 < \varepsilon < x$  בסתירה לנתון שכל  $0 < \varepsilon$  מקיים  $x < \varepsilon$ .

3. תהי  $A \subseteq \mathbb{R}$  כך שקיים  $\varepsilon > 0$  כך ש  $\forall a \in A : a > \varepsilon$  הוכח שאפס אינו החסם התחתון של  $A$ .

**הוכחה:**

נניח בשלילה שאפס הינו החסם התחתון של  $A$ . ניקח  $0 < \frac{\varepsilon}{2}$ . ברור ש  $\frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$  ולכן  $\forall a \in A : a > \frac{\varepsilon}{2}$  כלומר  $\frac{\varepsilon}{2}$  חסם מלרע גדול מאפס, בסתירה לכך שאפס הינו החסם מלרע הקטן ביותר.

4. תהיי  $B = \left\{ (-1)^{n-1} \left( 2 + \frac{3}{n} \right) \mid n \in \mathbb{N} \right\}$ . מצא חסם עליון, חסם תחתון, מינימום ומקסימום (כאשר הם קיימים)

**תשובה:** מקסימום 5, מינימום  $-3\frac{1}{2}$

5. יהיו קבוצות לא ריקות  $A, B \subseteq \mathbb{R}$ , נניח שמתקיים  $\forall a \in A, \forall b \in B : a \leq b$  (כל איבר ב  $A$  קטן שווה מכל איבר ב  $B$ )

\*א. הוכח:  $\sup A \leq \inf B$  (תרגיל חשוב מאד. יש להשתמש באפסילון)

**פתרון:** נניח בשלילה ש  $\sup A > \inf B$  ניקח  $\varepsilon = \frac{\sup A - \inf B}{2} > 0$  אזי

$\sup A - \varepsilon = \frac{\sup A + \inf B}{2}$  שזה אמצע הקטע  $[\inf B, \sup A]$ . אבל לפי משפט קיים  $a \in A$  כך ש  $a > \sup A - \varepsilon$

$$\inf B + \varepsilon = \frac{\sup A + \inf B}{2} = \sup A - \varepsilon$$

אבל לפי משפט קיים  $b \in B$  כך ש  $b < \inf B - \varepsilon = \sup A + \varepsilon < a$ .  
ובסיכום מצאנו  $b < a$  בסתירה לנתון.

ב. נניח שמתקיים שיוויון בסעיף א', כלומר,  $\sup A = \inf B$ . הוכח/הפוך:  $A \cap B \neq \emptyset$ .  
(במילים: יש איבר שנמצא גם ב  $A$  וגם ב  $B$ ).

**הפרכה:** ניקח  $A = (0,1)$  ו-  $B = (1,2)$ .  $\sup A = \inf B = 1$  אבל  $A \cap B = \emptyset$ .

ג. אם הוכחת בסעיף ב', מה הוא האיבר המשותף ל  $A$  ו  $B$ ? אם הפרכת, מתי כן יהיה לשתי הקבוצות איבר משותף?

**תשובה:** האיבר המשותף יתקיים כאשר ל  $A$  יהיה מקסימום, ול  $B$  יהיה מינימום. ואז  $\sup A \in A$  ו  $\inf B \in B$ .

6. תהי  $A \subseteq \mathbb{R}$ , נתון  $0 \notin A$ . נגדיר את הקבוצה  $A^{-1}$  באופן הבא  $A^{-1} = \left\{ \frac{1}{a} \mid a \in A \right\}$ . הוכח או הפוך על ידי דוגמא נגדית:

א. אם  $A$  חסומה מלעיל אזי  $A^{-1}$  חסומה מלעיל

ב. אם  $A$  חסומה מלעיל אזי  $A^{-1}$  חסומה מלרע

ג. אם  $A^{-1}$  חסומה מלעיל אזי  $A$  חסומה מלעיל

ד. אם  $A^{-1}$  חסומה מלעיל אזי  $A$  חסומה מלרע

**הפרכה:** ניקח  $A = (-1,0) \cup (0,1) = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 < x < 0, \text{ or } 0 < x < 1\}$ .  $A$  חסומה על ידי  $\pm 1$  אבל  $A^{-1}$  אינה חסומה מלעיל ואינה חסומה מלרע (שכן אחד חלקי מספר קטן חיובי הולך לאינסוף, ואחד חלקי מספר קטן שלילי הולך למינוס אינסוף).  $(A^{-1})^{-1} = A$  ולכן גם הכיוונים ההפוכים לא נכונים.

7. תהי  $A \subseteq \mathbb{R}$  קבוצה חסומה מלעיל. נגדיר  $B = \{-a \mid a \in A\}$  הוכח ש  $B$  חסומה מלרע וש-  
 $\inf B = -\sup A$

**פתרון:**  $A$  חסומה מלעיל, נניח על ידי  $M$  כלומר  $\forall a \in A: a \leq M$  לכן  $\forall a \in A: -M \leq -a$  כלומר  $B$  חסומה מלרע ע"י  $-M$ . כמו כן, אם  $M$  הינו חסם המלעיל הקטן ביותר של  $A$ , וודאי ש  $-M$  הינו חסם המלרע הקטן ביותר של  $B$  (קל להוכיח).

8. תהי  $A \subseteq \mathbb{R}$  כך ש  $\forall a \in A: a > 0$  ותהי  $A^{-1} = \left\{ \frac{1}{a} \mid a \in A \right\}$ .

הוכח ש  $m$  חסם תחתון של  $A \Leftrightarrow \frac{1}{m}$  חסם עליון של  $A^{-1}$  (ואפס חסם תחתון של  $A$  אם"ם  $A^{-1}$  לא חסומה).

**הוכחה:** דבר ראשון, אם  $m = 0$  אזי  $A^{-1}$  לא חסומה כי לכל  $\varepsilon > 0$  קיים  $a \in A$  כך ש

$a < 0 + \varepsilon = \varepsilon$  (כי  $m = 0$  חסם תחתון) לכן לכל  $M > 0$  ניקח  $\varepsilon = \frac{1}{M}$  ולכן קיים  $a \in A$  כך ש

$a < \varepsilon = \frac{1}{M}$  ולכן  $\frac{1}{a} > M$  כלומר  $A^{-1}$  לא חסומה. בכיוון ההפוך, אם  $A^{-1}$  לא חסומה אז לכל

$M > 0$  קיים  $a \in A$  כך ש  $\frac{1}{a} > M$ . לכן לכל  $\varepsilon > 0$  ניקח  $M = \frac{1}{\varepsilon}$  ולכן קיים  $a \in A$  כך ש

$\frac{1}{a} > M = \frac{1}{\varepsilon}$  ולכן  $a < \varepsilon$ . נובע מכך החסם התחתון של  $A$  הוא אפס כי הוא חסם מלרע שמקיים

את התנאי לכל  $\varepsilon > 0$  קיים  $a \in A$  כך ש  $a < 0 + \varepsilon$ .

כעת, נניח  $m \neq 0$  לכן  $\forall a \in A: m \leq a$  ולכן  $\forall a \in A: \frac{1}{a} \leq \frac{1}{m}$  כלומר  $\frac{1}{m}$  חסם מעיל של  $A^{-1}$ .

נניח  $M_1$  חסם מעיל קטן יותר ל  $A^{-1}$  כלומר  $M_1 < \frac{1}{m}$  ו  $\forall a \in A: \frac{1}{a} \leq M_1$ . אבל אז

$\forall a \in A: \frac{1}{M_1} \leq a$  כלומר  $\frac{1}{M_1}$  חסם מלרע של  $A$ . אבל  $M_1 < \frac{1}{m}$  ולכן  $\frac{1}{M_1} > m$  בסתירה לכך ש

$m$  חסם תחתון.

בכיוון ההפוך, נניח  $\frac{1}{m}$  חסם עליון של  $A^{-1}$ . נגדיר  $B = A^{-1}$  ולכן  $B^{-1} = A$  והטענה נובעת מהכיוון

שהוכחנו.