

פתרונות לשאלות הפתוחות בתרגיל פתוח 7

סמסטר א', תשע"ה-תשע"ו

22 בדצמבר 2015

משפט 6.1 הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס בהחלט אם ורק אם קיים $C > 0$ כך שלכל $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ כך ש:

$$1. \forall n \in \mathbb{N}, |b_n| \leq 1$$

$$2. \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$$

$$\text{מתקיים } \sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n \leq C$$

הוכחה:

(\Leftarrow): נתון שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס בהחלט, כלומר

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = C_0 \in \mathbb{R}.$$


ניתן כעת להראות את חסימות הטור $\sum a_n b_n$ ע"י שימוש בתנאי 1 בלבד:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} |a_n b_n| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \cdot |b_n| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = C_0.$$

(\Rightarrow): נגדיר את הסדרה¹

$$b_n = \begin{cases} \operatorname{sgn}(a_n) & n \leq N_0 \\ 0 & n > N_0 \end{cases}$$

¹היכן ש $\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$ וכנובע $|\operatorname{sgn}(x)| = \begin{cases} 1 & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$. באופן גרפי, אתם יכולים לדמיין את $\operatorname{sgn}(x)$ בצורה הבאה:



הערה לסטודנטים חרוצים, שקדנים ומתקדמים: פונקציות מסוג זה, שנקראות פונקציות עדרה, מהוות כר פורה לדוגמאות נגדיות רבות. דוגמה מעניינית נוספת לפונקצית מדרגה היא Haar Function שמוגדרת כבתור

$$h(x) = \begin{cases} 1 & x \in [0, \frac{1}{2}] \\ -1 & x \in [\frac{1}{2}, 1] \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

ובדומה ניתן להכליל למערכת של פונקציות $\{h_n\}_{n=1}^{\infty}$ שמקבלות את הערכים הקבועים ± 1 לסירוגין על קטעים דיאדיים, כלומר קטעים מהצורה $[\frac{1}{2^{k+1}}, \frac{1}{2^k}]$ עבור $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$.

ואמנם בסימונים הללו

$$|b_n| = \begin{cases} |\operatorname{sgn}(a_n)| & n \leq N_0 \\ 0 & n > N_0 \end{cases}.$$

הסדרה $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ מקיימת את שני התנאים מעלה:

1. היא חסומה ע"י 1.

2. החל ממוקם מסוים היא אפסה זהותית ולכן לפי הגדרת הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} |b_n| = 0$.

לפיכך יתקיים

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n \leq C_1 \quad (1)$$

נניח בשלילה שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ לא מתכנס. נסמן את סדרת הסכומים החלקיים שלו כבתור

$$S_N = \sum_{n=1}^N |a_n|.$$

מאחר שמדובר בטור חיובי אז

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \infty \Rightarrow S_N \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \infty.$$

מכך נסיק שקיים $N_0 \in \mathbb{N}$ שעבורו

$$\sum_{n=1}^{N_0} |a_n| > C_1.$$

מאיך גיטא, מאחר ש $|a_n| = a_n \cdot \operatorname{sgn}(a_n)$ ניתן להגדיר את הסדרה,

$$a_n b_n = \begin{cases} |a_n| & n \leq N_0 \\ 0 & n > N_0 \end{cases}$$

אולם

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \sum_{n=1}^{N_0} |a_n| > C_1 \quad (2)$$

אבל זו סתירה למסקנה (1). מהסתירה נסיק כי הטור $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ מתכנס ומכאן ש $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס בהחלט. ■

טענה 6.2 הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{2n}}{(n+x)^{n+y}(n+y)^{n+x}}$ מתכנס עבור $\begin{cases} x, y > 0 \\ x + y > 1 \end{cases}$


הוכחה: נפשט תחילה את האיבר בטור

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{n^{2n}}{(n+x)^{n+y}(n+y)^{n+x}} \\ &= \left(\frac{n^n}{(n+x)^n} \right) \cdot \left(\frac{n^n}{(n+y)^n} \right) \cdot \frac{1}{(n+x)^y (n+y)^x} \\ &= \frac{1}{(n+x)^y \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n (n+y)^x \left(1 + \frac{y}{n}\right)^n} \end{aligned}$$

נשווה בצורה גבולית עם הטור $\sum b_n = \sum \frac{1}{n^{x+y}}$ שני הטורים הם טורים חיוביים והמנה ביניהם שואפת לקבוע:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(n+x)^y (1+\frac{x}{n})^n (n+y)^x (1+\frac{y}{n})^n}}{\frac{1}{n^{x+y}}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^x \cdot n^y}{(n+x)^y (n+y)^x} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(1+\frac{x}{n})^n \cdot (1+\frac{y}{n})^n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+x}\right)^y \left(\frac{n}{n+y}\right)^x \cdot e^{-x} \cdot e^{-y} \\ &= 1 \cdot 1 \cdot e^{-(x+y)} \end{aligned}$$

לכן הם מתכנסים יחדיו. הטור שלנו מתכנס אמ"מ $\sum \frac{1}{n^{x+y}} < \infty$ כלומר אמ"מ $x+y > 1$. אם נשרטט תחום זה:



■