

פתרון תרגיל בית 2 מבוא לחוגים ומודולים 88-212 סמסטר ב' תשפ"א

שאלה 1. נסתכל על החוג $R = M_3(\mathbb{C})$, ובתוכו על ארבע תת-הקבוצות הבאות:

$$\left\{ \begin{pmatrix} * & 0 & * \\ 0 & * & 0 \\ 0 & 0 & * \end{pmatrix} \right\}, \quad \left\{ \begin{pmatrix} * & 0 & * \\ 0 & * & 0 \\ * & 0 & * \end{pmatrix} \right\}, \quad \left\{ \begin{pmatrix} * & * & * \\ 0 & * & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}, \quad \left\{ \begin{pmatrix} * & * & * \\ * & * & 0 \\ * & 0 & * \end{pmatrix} \right\}$$

לכל אחת מתת-הקבוצות, קבעו והוכיחו:

- האם היא תת-חוג?
- האם היא תת-חוג בלי יחידה? אם כן, האם יש בה יחידה?
- הראו שאף אחת מתת-הקבוצות האלו אינן אידאל של R מבלי להיעזר בשאלה 8.

(תזכורת: בכל מקום שמופיעה כוכבית אמור להופיע איבר של שדה הבסיס \mathbb{C} , והכוכביות לא בהכרח שוות זו לזו. למשל, $\left\{ \begin{pmatrix} * & 0 & * \\ 0 & * & 0 \\ 0 & 0 & * \end{pmatrix} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 & b \\ 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & d \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbb{C} \right\}$.)

פתרון. ראשית, לפי הגדרתן כל הקבוצות האלו סגורות לחיסור. לכן, על מנת לבדוק האם הן תת-חוג בלי יחידה (או תת-חוג), מספיק לבדוק סגירות לכפל. לאורך הפתרון נסמן על ידי I_3 את מטריצת היחידה מסדר 3×3 מעל \mathbb{C} .

$$S_1 = \left\{ \begin{pmatrix} * & 0 & * \\ 0 & * & 0 \\ 0 & 0 & * \end{pmatrix} \right\} \text{ סגורה לכפל, כי}$$

$$\begin{pmatrix} a & 0 & b \\ 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e & 0 & f \\ 0 & g & 0 \\ 0 & 0 & h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ae & 0 & af + bh \\ 0 & cg & 0 \\ 0 & 0 & dh \end{pmatrix}$$

כמו כן, $I_3 \in S_1$, ולכן זהו תת-חוג. כיוון שהוא מכיל את היחידה, הוא לא יכול להיות אידאל.

$$S_2 = \left\{ \begin{pmatrix} * & 0 & * \\ 0 & * & 0 \\ * & 0 & * \end{pmatrix} \right\} \text{ בעצם, אם היינו מחליפים את האינדקסים 2 ו-3, היינו מקבלים}$$

שזהו החוג $\mathbb{C} \times M_2(\mathbb{C})$. עם זאת, ניתן גם לבדוק ישירות שיש סגירות לכפל:

$$\begin{pmatrix} a & 0 & b \\ 0 & c & 0 \\ d & 0 & e \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f & 0 & g \\ 0 & h & 0 \\ i & 0 & j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} af + bi & 0 & ag + bj \\ 0 & ch & 0 \\ df + ei & 0 & dg + ej \end{pmatrix}$$

גם פה $I_3 \in S_2$ ולכן זהו תת-חוג, ומאותו הנימוק כמו S_1 הוא לא יכול להיות אידאל.

$$S_3 = \left\{ \begin{pmatrix} * & * & * \\ 0 & * & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

נראה שזהו תת-חוג בלי יחידה:

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & d & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e & f & g \\ 0 & h & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ae & af + bh & ag \\ 0 & dh & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

הפעם $I_3 \notin S_3$, ולכן זהו תת-חוג בלי יחידה שאינו תת-חוג. נשים לב שגם אין בו יחידה; אכן,

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e & f & g \\ 0 & h & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ולכן לא נוכל למצוא מטריצה $\begin{pmatrix} e & f & g \\ 0 & h & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ שתהיה יחידה בו. נראה במפורש שזהו אינו

אידיאל: $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in S_3$ אבל

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \notin S_3$$

$$S_4 = \left\{ \begin{pmatrix} * & * & * \\ * & * & 0 \\ * & 0 & * \end{pmatrix} \right\}$$

הוא אינו סגור לכפל, כי

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\in S_4} \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\in S_4} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \notin S_4$$

לכן הוא לא תת-חוג בלי יחידה, לא תת-חוג, ולא אידיאל.

שאלה 2. יהי R חוג, ותהי $S \subseteq R$ תת-קבוצה. הוכיחו כי $C_R(C_R(C_R(S))) = C_R(S)$ (הדרכה: הראו כי אם $S \subseteq S'$, אז $C_R(S) \supseteq C_R(S')$).

פתרון. בשלב הראשון, נוכיח את הטענה שבהדרכה: אם $S \subseteq S'$ אז $C_R(S) \supseteq C_R(S')$. אכן, יהי $x \in C_R(S')$. מהגדרת המרכז, $xs = sx$ לכל $s \in S'$. בפרט, זה נכון לכל $s \in S$, ולכן $x \in C_R(S)$.

כעת נעבור להוכחת הטענה. כיוון ש- $S \subseteq C_R(C_R(S))$, לפי טענת העזר שהוכחנו מתקיים $C_R(S) \supseteq C_R(C_R(C_R(S)))$ (פה S משחק בתפקיד עצמו ו- $C_R(C_R(S))$ משחק בתפקיד S').

בכיוון השני, אנחנו יודעים ש- $T \subseteq C_R(C_R(T))$ לכל $T \subseteq R$. ניקח $T = C_R(S)$, ונקבל $C_R(S) \subseteq C_R(C_R(C_R(S)))$. הראינו הכלה משני הכיוונים, ולכן $C_R(C_R(C_R(S))) = C_R(S)$, כנדרש.

שאלה 3 (רענון הגדרות). יהיו R ו- S חוגים, ויהי $\varphi: R \rightarrow S$ הומומורפיזם. הוכיחו את הטענות הבאות:

$$\text{א. } \varphi(-x) = -\varphi(x)$$

ב. אם x הפיך ב- R , אז $\varphi(x)$ הפיך ב- S .

ג. אם x נילפוטנטי ב- R (כלומר, קיים $n > 0$ כך ש- $x^n = 0$), אז $\varphi(x)$ נילפוטנטי ב- S .

ד. אם φ אפימורפיזם, אז $\varphi(Z(R)) \subseteq Z(S)$.

הוכחה.

א. כיוון ש- φ הומומורפיזם,

$$\varphi(x) + \varphi(-x) = \varphi(x + (-x)) = \varphi(0_R) = 0_S$$

אך הנגדי לחיבור של כל איבר הוא יחיד, ולכן $\varphi(-x) = -\varphi(x)$.

ב. מכך ש- φ הומומורפיזם של חוגים, אנחנו יודעים ש- $\varphi(1_R) = 1_S$. לכן

$$\varphi(x) \varphi(x^{-1}) = \varphi(xx^{-1}) = \varphi(1_R) = 1_S$$

וגם

$$\varphi(x^{-1}) \varphi(x) = \varphi(x^{-1}x) = \varphi(1_R) = 1_S$$

ולכן $\varphi(x)$ הפיך, וההופכי שלו הוא $\varphi(x^{-1})$.

ג. נניח ש- x נילפוטנטי ב- R . לכן קיים $n > 0$ כך ש- $x^n = 0_R$. כיוון ש- φ מכבד כפל,

$$\varphi(x)^n = \varphi(x^n) = \varphi(0_R) = 0_S$$

ומכאן ש- $\varphi(x)$ נילפוטנטי.

ד. נניח ש- φ אפימורפיזם, ויהי $x \in Z(R)$. צ"ל: $\varphi(x) \in Z(S)$.
יהי $s \in S$. כיוון ש- φ אפימורפיזם, קיים $y \in R$ כך ש- $\varphi(y) = s$. אך $x \in Z(R)$,
לכן $xy = yx$ ומכאן

$$\varphi(x) s = \varphi(x) \varphi(y) = \varphi(xy) = \varphi(yx) = \varphi(y) \varphi(x) = s \varphi(x)$$

הראינו ש- $\varphi(x)$ מתחלף עם כל איבר של S , ולכן $\varphi(x) \in Z(S)$.

□

שאלה 4. נסמן $R = M_2(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$.

א. מצאו את ההומומורפיזם היחיד של חוגים $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow R$.

ב. מצאו את כל ההומומורפיזמים של חוגים $\psi: \mathbb{Z}[\sqrt[3]{2}] \rightarrow R$ (הדרכה: הסבירו מדוע כל ההומומורפיזם כזה נקבע על ידי התמונה של $\sqrt[3]{2}$).

ג. ענו במהירות: האם בין ההומומורפיזמים מהסעיף הקודם יש אפימורפיזם?

פתרון. נסמן $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}\}$

א. אנחנו יודעים שבכל הומומורפיזם, $\varphi(1_{\mathbb{Z}}) = 1_R$. במקרה שלנו,

$$\varphi(1) = \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{1} \end{pmatrix}$$

מהחיבוריות של φ , לכל $n \in \mathbb{Z}$ יתקיים

$$\varphi(n) = \begin{pmatrix} \bar{n} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{n} \end{pmatrix}$$

במילים אחרות, אם n זוגי אז נקבל את מטריצת האפס, ואם n אי-זוגי נקבל את מטריצת היחידה.

ב. ראשית נזכור כי

$$\mathbb{Z}[\sqrt[3]{2}] = \left\{ a + b\sqrt[3]{2} + c\left(\sqrt[3]{2}\right)^2 \mid a, b, c \in \mathbb{Z} \right\} = \left\{ a + b\sqrt[3]{2} + c\sqrt[3]{4} \mid a, b, c \in \mathbb{Z} \right\}$$

נניח כי $\varphi(\sqrt[3]{2}) = A$ ידוע לנו. אז לכל $x \in \mathbb{Z}[\sqrt[3]{2}]$,

$$\begin{aligned} \varphi(x) &= \varphi\left(a + b\sqrt[3]{2} + c\sqrt[3]{4}\right) = \varphi(a) + \varphi(b)\varphi\left(\sqrt[3]{2}\right) + \varphi(c)\varphi\left(\sqrt[3]{2}\right)^2 = \\ &= \varphi(a) + \varphi(b) \cdot A + \varphi(c) \cdot A^2. \end{aligned}$$

לכן ברגע שקבענו מי זה $\varphi(\sqrt[3]{2})$ כל φ יוגדר באופן יחיד. מי יכול להיות $\varphi(\sqrt[3]{2})$? כיוון ש- φ הומומורפיזם, חייב להתקיים

$$\varphi\left(\sqrt[3]{2}\right)^3 = \varphi\left(\left(\sqrt[3]{2}\right)^3\right) = \varphi(2) = \begin{pmatrix} \bar{0} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{0} \end{pmatrix}$$

כלומר צריך למצוא את כל המטריצות $A \in M_2(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ המקיימות $A^3 = 0$, וכל מטריצה כזו תגדיר לנו הומומורפיזם (זו לא טענה טריוויאלית, כי צריך לוודא שאין עוד "יחסים" ש- $\sqrt[3]{2}$ מקיים. אבל זה נכון). בחוג הזה אין הרבה מטריצות, אפשר לבדוק ישירות ולמצוא את כל האפשרויות.

למי שזוכר קצת אלגברה לינארית, אפשר להקל עלינו בחיפוש מעט. A היא מטריצה 2×2 , לכן אם $A^3 = 0$ בהכרח $A^2 = 0$. הפולינום האופייני שלה הוא $p_A(x) = x^2$, אז מתקיים $\text{tr}(A) = \bar{0}$ (כי זה המקדם של x), והיא צריכה להיות לא הפיכה. אז המטריצות האפשריות הן $\begin{pmatrix} \bar{0} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{0} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \bar{0} & \bar{1} \\ \bar{0} & \bar{0} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \bar{0} & \bar{0} \\ \bar{1} & \bar{0} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{1} \\ \bar{1} & \bar{1} \end{pmatrix}$, ולכן יש ארבעה הומומורפיזמים כאלו.

ג. לא. כיוון ש- $\mathbb{Z}[\sqrt[3]{2}]$ חילופי, אילו היה אפימורפיזם $\psi: \mathbb{Z}[\sqrt[3]{2}] \rightarrow M_2(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$, גם $M_2(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ היה חילופי, בסתירה.

שאלה 5. יהי p מספר ראשוני.

א. יהי R חוג בלי יחידה מסדר p . הוכיחו כי או ש- $R \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ עם חיבור וכפל מודולו p (של הנציגים), או $R \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +, \odot)$ עם חיבור מודולו p וכפל האפס שבו תמיד $x \odot y = 0$.

ב. תנו דוגמאות לחוגים עם יחידה מסדר p^2 שאינם איזומורפיים. רשות: יש ארבעה כאלו, עד כדי איזומורפיזם. נסו למצוא את כולם.

ג. העשרה: קראו את המאמר "מיון חוגים סופיים מסדר p^2 " מאת בנג'מין פיין וענו כמה חוגים בלי יחידה יש מסדר p^2q עבור $q \neq p$ ראשוני.

פתרון.

א. החבורה החיבורית של R היא מסדר p , ולכן חייבת להיות ציקלית ואיזומורפית ל- $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. כעת נותר לקבוע מהו הכפל.

נבחר a יוצר של החבורה החיבורית של R . אם $a^2 = 0$ אז $r_1 r_2 = 0$ לכל $r_1, r_2 \in R$. אכן, אפשר לכתוב $r_1 = m_1 a$ ו- $r_2 = m_2 a$ לאישהו $m_1, m_2 \in \mathbb{N}$, ואז

$$r_1 r_2 = m_1 m_2 \cdot a^2 = m_1 m_2 \cdot 0 = 0$$

נניח $a^2 \neq 0$. אזי $a^2 = ma$ לאישהו $1 \leq m \leq p-1$. אם $n = m^{-1} \pmod{p}$ אז ההעתקה $\varphi: \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \rightarrow R$ המוגדרת לפי $\varphi(k + p\mathbb{Z}) = kna$ היא איזומורפיזם. אכן, היא הומומורפיזם כי

$$\begin{aligned} \varphi(k + p\mathbb{Z}) + \varphi(k' + p\mathbb{Z}) &= (kna) + (k'na) = (k + k')na = \varphi((k + k') + p\mathbb{Z}) \\ \varphi(k + p\mathbb{Z}) \cdot \varphi(k' + p\mathbb{Z}) &= (kna) \cdot (k'na) = kk'n^2 a^2 = kk'n(nm)a = kk'na = \varphi(kk' + p\mathbb{Z}) \end{aligned}$$

(המעבר האחרון נכון מאחר ש- $nm \equiv 1 \pmod{p}$ וכן $pa = 0$ ב- R). כמו כן, הגרעין שלה הוא בפרט תת-חבורה חיבורית של $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$; אך הוא לא שווה לכולה, כי $\varphi(1 + p\mathbb{Z}) = na \neq 0$ ולכן φ חח"ע. כיוון ש- φ פונקציה חח"ע בין שתי קבוצות מאותו הגודל, היא גם על. בסך הכל φ איזומורפיזם.

ב. ארבעת החוגים היחידים עד כדי איזומורפיזם מסדר p^2 הם $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ ו- \mathbb{F}_{p^2} (השדה עם p^2 איברים).

כיצד לוודא שהם לא איזומורפיים? בכל אחד משלושת החוגים הראשונים יש מחלקי אפס, ולכן אף אחד מהם אינו שדה. זה מראה ש- \mathbb{F}_{p^2} אינו איזומורפי לאף אחד מהם. $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ אינו איזומורפי ל- $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ ול- $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[x]/\langle x^2 \rangle$ כי החבורות החיבוריות שלהם לא איזומורפיות; והחוגים $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ ו- $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[x]/\langle x^2 \rangle$ אינם איזומורפיים כי

שאלה 6. הוכיחו שתת-הקבוצות הבאות הן אידאלים.

א. עבור חוג R , $I = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & a_1 & a_2 \\ 0 & 0 & a_3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \mid a_i \in R \right\} \triangleleft \left\{ \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ 0 & a_4 & a_5 \\ 0 & 0 & a_6 \end{pmatrix} \mid a_i \in R \right\}$

ב. יהי R חוג. הוכיחו $R[x] \triangleleft \{f \in R[x] \mid f(212) = 0\}$. מה יקרה אם נדרוש $f(212) = 1$ במקום?

ג. נסמן

$$I = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & 0 \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Q} \right\}, \quad J = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Q} \right\}$$

הוכיחו ש- $I \leq_l M_2(\mathbb{Q})$ אידאל שמאלי ו- $J \leq_r M_2(\mathbb{Q})$ אידאל ימני. הוכיחו כי $I \cap J$ אינו אידאל.

פתרון. א. היא תת-חבורה חיבורית של חוג המטריצות המשולשיות העליונות S . כדי

להוכיח שהיא אידאל, נבדוק בליעה משני הצדדים:

$$\begin{pmatrix} 0 & a_1 & a_2 \\ 0 & 0 & a_3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ 0 & b_4 & b_5 \\ 0 & 0 & b_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & a_1 b_4 & a_1 b_5 + a_2 b_6 \\ 0 & 0 & a_3 b_6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ 0 & b_4 & b_5 \\ 0 & 0 & b_6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & a_1 & a_2 \\ 0 & 0 & a_3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & b_1 a_1 & b_1 a_2 + b_2 a_3 \\ 0 & 0 & b_4 a_3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

לכן זהו אידאל.

ב. I הוא תת-חבורה חיבורית של $R[x]$ כי היא לא ריקה, ואם $f, g \in I$, אז

$$(f - g)(212) = f(212) - g(212) = 0 - 0 = 0$$

נראה בליעה משני הצדדים: אם $f \in I$ ו- $g \in R[x]$,

$$(f \cdot g)(212) = f(212) \cdot g(212) = 0 \cdot g(212) = 0$$

$$(g \cdot f)(212) = g(212) \cdot f(212) = g(212) \cdot 0 = 0$$

לכן $f \cdot g, g \cdot f \in I$, ומכאן I אידאל של $R[x]$.
אם היינו דורשים $f(212) = 1$, זה לא היה אידאל, ואפילו לא תת-חבורה חיבורית (למשל, פולינום האפס לא היה בתוך I).

ג. I ו- J הם תת-חבורות חיבוריות של $M_2(\mathbb{Q})$, כי

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a' & b' \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - a' & b - b' \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in I$$

וכן

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ b & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a' & 0 \\ b' & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - a' & 0 \\ b - b' & 0 \end{pmatrix} \in J$$

נראה ש- I אידאל ימני:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & d \\ e & f \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac + be & ad + bf \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in I$$

בדומה, J אידאל שמאלי:

$$\begin{pmatrix} c & d \\ e & f \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ca + db & 0 \\ ea + fb & 0 \end{pmatrix} \in J$$

החיתוך שלהם הוא $I \cap J = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{Q} \right\}$. זו גם תת-חבורה חיבורית, אבל היא לא אידאל, כי אין בליעה מאף צד. למשל,

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\in I \cap J} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \notin I \cap J$$

שאלה 7. הפריכו את הטענות השגויות הבאות:

א. איחוד אידאלים הוא אידאל.

ב. יהיו $S \subseteq R$ חוגים, ויהי $I \triangleleft S$. אז $I \triangleleft R$.

ג. יהי R חוג. אז תת-החוג הבא הוא אידאל של $R \times R$:

$$\Delta = \{(r, r) \mid r \in R\} \subseteq R \times R$$

פתרון. א. ניקח $R = \mathbb{Z}, I = 2\mathbb{Z}, J = 3\mathbb{Z}$. אז $I, J \triangleleft R$, אבל $I \cup J \not\triangleleft R$, כי זו אפילו לא תת-חבורה חיבורית. למעשה, $I \cup J$ הוא אידאל של R אם ורק אם $I \subseteq J$ או $J \subseteq I$ (מדוע?).

ב. ניקח $R = \mathbb{Q}, S = \mathbb{Z}, I = 2\mathbb{Z}$. אנחנו יודעים ש- I הוא אידאל של \mathbb{Z} , אבל I אינו אידאל של \mathbb{Q} (כי האידאלים היחידים של \mathbb{Q} הם $\{0\}$ ו- \mathbb{Q}).

ג. ניקח $R = \mathbb{Z}$. אז $(1, 1) \in \Delta$, אבל $(1, 0) \notin \Delta$ ו- $(1, 1) \cdot (1, 0) = (1, 0)$, ולכן אין בליעה.

שאלה 8. יהי R חוג. בשאלה זו נחקור את המרכז ואת האידאלים של חוג המטריצות מעל R .

א. הראו כי $Z(M_n(R)) = Z(R)I_n$. כלומר, המרכז של $M_n(R)$ מכיל רק מטריצות סקלריות, שהאיבר באלכסון שלהן הוא מהמרכז של R .

ב. הראו כי אם $I \triangleleft R$, אז $M_n(I) \triangleleft M_n(R)$.

ג. הראו כי כל אידאל של $M_n(R)$ הוא מהצורה הנ"ל. כלומר, הראו שאם $J \triangleleft M_n(R)$, אז קיים $I \triangleleft R$ שעבורו $J = M_n(I)$.

(הדרכה לטעיפים א' ו-ג': היעזרו במטריצות e_{ij} שבהן יש 1 במקום ה- (i, j) ו-0 בכל מקום אחר.)

הוכחה. לאורך הפתרון, e_{ij} יסמן את המטריצה שיש בה 1 במקום ה- (i, j) ו-0 בשאר המקומות. ניתן לבדוק ישירות מהגדרת הכפל שמתקיים $e_{ij}e_{kl} = \delta_{jk}e_{il}$. כמו כן, הקבוצה $\{e_{ij}\}_{i,j=1}^n$ מהווה בסיס של $M_n(R)$, בדיוק במובן של מרחבים וקטוריים - כל מטריצה ניתנת לכתובה בצורה יחידה באופן $\sum_{i,j=1}^n a_{ij}e_{ij}$.

א. תהי $A \in Z(M_n(R))$. נכתוב $A = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}e_{ij}$. לכן לכל $X \in M_n(R)$ מתקיים $AX = XA$. נבחר $X = e_{kl}$, ונקבל:

$$Ae_{kl} = \left(\sum_{i,j=1}^n a_{ij}e_{ij} \right) e_{kl} = \sum_{i,j=1}^n (a_{ij}e_{ij}e_{kl}) = \sum_{i=1}^n a_{ik}e_{il}$$

$$e_{kl}A = e_{kl} \left(\sum_{i,j=1}^n a_{ij}e_{ij} \right) = \sum_{i,j=1}^n (a_{ij}e_{kl}e_{ij}) = \sum_{j=1}^n a_{lj}e_{kj}$$

כדי שיתקיים שוויון בהכרח $a_{ik} = 0$ לכל $i \neq k$ (כי במקום ה- (i, l) במטריצה הראשונה כתוב a_{ik} ובמטריצה השנייה כתוב 0) ו- $a_{lj} = 0$ לכל $l \neq j$ (בדומה). אם ניקח $(i, j) = (k, l)$ נקבל שבמקום ה- (k, l) במטריצה הראשונה כתוב a_{kk} ובמטריצה השנייה כתוב a_{ll} , ולכן $a_{kk} = a_{ll}$. כיוון שזה נכון לכל k, l , זה מראה שהמטריצה A סקלרית, כנדרש.

ב. נניח $I \triangleleft R$. נראה ש- $M_n(I)$ תת-חבורה חיבורית: יהיו $A, B \in M_n(I)$, ונכתוב $A = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}e_{ij}$ ו- $B = \sum_{i,j=1}^n b_{ij}e_{ij}$ עבור $a_{ij}, b_{ij} \in I$. אז

$$A - B = \sum_{i,j=1}^n (a_{ij} - b_{ij}) e_{ij}$$

היא מטריצה שכל איבריה ב- I , ולכן $A - B \in M_n(I)$. נראה את תכונת הבליעה. תהי $A = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}e_{ij} \in M_n(I)$, ותהי $C = \sum_{k,l=1}^n c_{kl}e_{kl} \in M_n(R)$ (לכן $a_{ij} \in I$ ו- $c_{kl} \in R$). מכאן

$$A \cdot C = \left(\sum_{i,j=1}^n a_{ij}e_{ij} \right) \cdot \left(\sum_{k,l=1}^n c_{kl}e_{kl} \right) = \sum_{i,j,k,l=1}^n (a_{ij}c_{kl}e_{ij}e_{kl}) = \sum_{i,l=1}^n \left(\sum_{j=1}^n a_{ij}c_{jl} \right) e_{il}$$

כל $\sum_{j=1}^n a_{ij}c_{jl} \in I$, כי כל $a_{ij} \in I$ והאידיאל I מקיים את תכונת הבליעה מימין. בכך הראינו ש- I בולע מימין. ההוכחה לכיוון השני זהה.

ג. יהי $J \triangleleft M_n(R)$. נגדיר $I = \{a \in R \mid a \cdot e_{11} \in J\}$.

טענה 1. $I \neq \emptyset$. אכן, $0 \in I$.

טענה 2. $I \triangleleft R$. זו תת-חבורה חיבורית: אם $a, b \in I$, אז $a \cdot e_{11}, b \cdot e_{11} \in J$ לכן גם $(a - b) \cdot e_{11} \in J$, ומכאן $a - b \in I$. נראה את תכונת הבליעה: יהי $a \in I$ ויהי $r \in R$. לכן $a \cdot e_{11} \in J$ ו- $r \cdot e_{11} \in M_n(R)$. כיוון ש- J אידיאל,

$$(a \cdot r) e_{11} = (a \cdot e_{11}) (r \cdot e_{11}), (r \cdot a) e_{11} = (r \cdot e_{11}) (a \cdot e_{11}) \in J$$

ולכן $a \cdot r, r \cdot a \in I$ זה מראה ש- I אידיאל.

טענה 3. $M_n(I) \subseteq J$. תהי $\sum_{i,j=1}^n a_{ij}e_{ij} \in M_n(I)$; לכן לכל i, j לפי הגדרת I , $a_{ij} \cdot e_{11} \in J$, כיוון ש- J אידיאל, גם

$$e_{i1} \cdot (a_{ij}e_{11}) \cdot e_{1j} = a_{ij}e_{ij} \in J$$

כיוון ש- J סגור לחיבור, $\sum_{i,j=1}^n a_{ij}e_{ij} \in J$.

טענה 4. $J \subseteq M_n(I)$. תהי $A = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}e_{ij} \in J$. לכן לכל $1 \leq k, l \leq n$, מהבליעה של J נקבל

$$e_{1k} \left(\sum_{i,j=1}^n a_{ij}e_{ij} \right) e_{l1} = a_{kl} \cdot e_{11} \in J$$

לפי הגדרת I , $a_{kl} \in I$ לכל $1 \leq k, l \leq n$. לכן $A \in M_n(I)$, כנדרש. זה מוכיח את הדרוש.

□

שאלה 9.

א. הראו כי אם R_1, \dots, R_n חוגים ו- $I_j \triangleleft R_j$ אידיאלים, אז $\prod_{j=1}^n I_j \triangleleft \prod_{j=1}^n R_j$.

ב. הראו כי אם R_1, \dots, R_n חוגים, אז כל אידיאל של $\prod_{j=1}^n R_j$ הוא מהצורה $\prod_{j=1}^n I_j$ לאידיאלים $I_j \triangleleft R_j$.

ג. הראו כי טענת הסעיף הקודם אינה נכונה אם מדובר על מכפלה אינסופית.

הוכחה.

א. ראשית, נשים לב ש- $\prod_{j=1}^n I_j$ היא תת-חבורה חיבורית: אם $(a_1, \dots, a_n), (b_1, \dots, b_n) \in \prod_{j=1}^n I_j$ אז

$$(a_1, \dots, a_n) - (b_1, \dots, b_n) = (a_1 - b_1, \dots, a_n - b_n) \in \prod_{j=1}^n I_j$$

כשהשתמשנו בכך שכל I_j הוא תת-חבורה חיבורית. נראה את תכונת הבליעה: יהי $(a_1, \dots, a_n) \in \prod_{j=1}^n I_j$ ויהי $(r_1, \dots, r_n) \in \prod_{j=1}^n R_j$. כיוון שכל I_j אידאל, $r_j a_j \in I_j$ לכל $1 \leq j \leq n$, ולכן

$$(a_1, \dots, a_n) \cdot (r_1, \dots, r_n) = (a_1 r_1, \dots, a_n r_n) \in \prod_{j=1}^n I_j$$

$$(r_1, \dots, r_n) \cdot (a_1, \dots, a_n) = (r_1 a_1, \dots, r_n a_n) \in \prod_{j=1}^n I_j$$

כנדרש.

ב. יהי $J \triangleleft \prod_{j=1}^n R_j$. לכל $1 \leq j \leq n$ נסמן על ידי e_j את הווקטור שבו 1 במקום ה- j ו-0 בשאר המקומות, ונגדיר $I_j = \{a \in R_j \mid a e_j \in J\}$. אז $I_j \triangleleft R_j$; ומתקיימת תכונת הבליעה כי אם $a e_j \in J$ ו- $r \in R$ אז גם $(ar) e_j = (a e_j) (r e_j) \in J$ ובדומה ל- $r a$. מהסגירות לחיבור של J נובע $\prod_{j=1}^n I_j \subseteq J$. מצד שני, לכל $(a_1, \dots, a_n) \in \prod_{j=1}^n I_j$ מתקיים $(a_1, \dots, a_n) e_j = a_j e_j \in J$, ולכן $a_j \in I_j$. זה מראה את ההכלה בכיוון ההפוך.

ג. נראה שעבור מכפלות אינסופיות הטענה אינה נכונה. בתוך $\prod_{i \in I} R_i$ נסתכל על הסכום הישר $\bigoplus_{i \in I} R_i$ שהוגדר בתרגיל הבית הראשון (תזכורת: בסכום הישר רק מספר סופי של קואורדינטות הוא שונה מ-0). זהו אידאל של המכפלה הישרה (בדקו!), אך הוא לא מכפלה ישרה של אידאלים של R_i .

□

הערה. שימו לב שבשתי השאלות האחרונות השתמשנו במובן חזק בכך שבחוגים שלנו יש יחידה. אילו היינו עובדים עם חוגים ללא יחידה, הטענות היו שגויות. למשל, היה ניתן למצוא חוג בלי יחידה R ואידאל $J \triangleleft M_n(R)$ שאינו מן הצורה $M_n(I)$ לאף $I \triangleleft R$.

שאלה 10. תהי X קבוצה. הזכרו ש- $(P(X), \Delta, \cap)$ הוא חוג חילופי. תהי $\tau \neq \emptyset \subseteq P(X)$ תת-קבוצה לא ריקה.

א. נאמר ש- τ סגורה לאיחוד אם $A, B \in \tau$ גורר $A \cup B \in \tau$. נאמר ש- τ סגורה להכלה אם $A \subseteq B \in \tau$ גורר $A \in \tau$. הוכיחו כי τ אידאל אם ורק אם τ סגורה לאיחוד והכלה.

ב. נניח ש- X סופית. הוכיחו ש- τ אידאל אם ורק אם קיים $C \subseteq X$ כך ש- $\tau = P(C)$.

ג. מצאו אידאל τ של $(P(\mathbb{N}), \Delta, \cap)$ שאינו מן הצורה $P(C)$.

פתרון. א. \Leftarrow נניח ש- τ אידאל של $P(X)$. לכל $A, B \in \tau$ מתקיים

$$A \cup B = (A \Delta B) \Delta (A \cap B)$$

וכיוון ש- τ סגורה לחיבור ולכפל של החוג, $A \cup B \in \tau$. לכן τ סגורה לאיחוד. כדי להראות ש- τ סגורה להכלה, תהי $B \in \tau$ ותהי $A \subseteq B$. לכן $A = A \cap B$, ומהבליעה של τ ביחס לכפל נקבל $A \in \tau$. לכן τ סגורה להכלה.

\Rightarrow נניח ש- τ סגורה לאיחוד ולהכלה. כדי לראות ש- τ תת-חבורה חיבורית, כלומר סגורה לחיסור, יהיו $A, B \in \tau$. החיסור שלהם הוא $A \Delta B \subseteq A \cup B$. כיוון ש- τ סגורה לאיחוד, $A \cup B \in \tau$, ומהסגירות להכלה $A \Delta B \in \tau$. כדי לראות בליעה, תהי $A \in \tau$ ותהי $B \in P(X)$. כיוון שהחוג חילופי, מספיק לבדוק בליעה מצד שמאל. אכן, $B \cap A \subseteq A$, ומהסגירות להכלה $B \cap A \in \tau$.

ב. \Leftarrow נניח ש- τ אידאל. ניקח $C = \cup_{A \in \tau} A$. כיוון ש- X סופית, גם $P(X)$ סופית, ולכן τ סופית; זה מראה ש- C היא איחוד של מספר סופי של איברים מ- τ , ולפי הסעיף הקודם - $C \in \tau$. לפי הסגירות להכלה נקבל $P(C) \subseteq \tau$. מצד שני, אם $A \in \tau$ אז $A \subseteq C$ לפי הגדרת C , ולכן $A \in P(C)$. זה מראה ש- $\tau \supseteq P(C)$, ולכן נקבל שוויון.

\Rightarrow הקבוצה $P(C)$ סגורה לאיחוד ולהכלה, ולכן היא אידאל (לפי הסעיף הקודם).

ג. נסתכל בתוך $P(\mathbb{N})$ על אוסף תת-הקבוצות הסופיות $\tau = \{A \subseteq \mathbb{N} \mid |A| < \infty\}$. זהו אוסף שסגור לאיחוד ולהכלה, ולכן לפי סעיף א' זהו אידאל. אך הוא לא מהצורה $P(C)$, (אחרת C הייתה צריכה להכיל כל תת-קבוצה סופית של \mathbb{N} , כלומר להיות כל \mathbb{N} , אבל $\tau \not\subseteq \mathbb{N}$).

בהצלחה!