

פיזיקה למתמטיקאים 320-88

תרגיל 1: דינמיקה ותנע קווי

1. גוף בעל מסה m נע בהשפעת כח הכביד ובהשפעת התנודות האוויר. התנודות האוויר פרופורציונית ל מהירות הגוף ונתונה $\gamma \vec{v} = -\vec{F}$ כאשר γ קבוע חיובי.

- (א) מהם המימדים של γ ?
- (ב) רשמו את משוואות התנועה (עבור המהירות) בכוונים x ו y
- (ג) רשמו פתרון כללי למשוואות התנועה בכוון y
- (ד) מהו פתרון משווהת התנועה בכוון x ?
- (ה) בטאו את מהירות הגוף לאחר זמן רב בעזרת γ , m ו g אם ידוע כי ב- $t=0$ הגוף במנוחה

2. חליק טעון בעל מסה m ומטען חשמלי q נע בהשפעת שדה חשמלי $\vec{E} = E_0 \hat{y}$ ושדה מגנטי $\vec{B} = B_0 \hat{z}$. השדות אחידים וקבועים. הכח החשמלי והכח המגנטי נתונים ע"י $\vec{F}_E = q\vec{E}$ ו $\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}$ בהתאם. (הערה: הניחו כי מסת החלקיק זניחה).

- (א) רשמו את משוואות התנועה של החלקיק עבור המהירות
- (ב) מהו פתרון משווהת התנועה בכל כוון?
- (ג) נתון כי ב- $t=0$ מהירות החלקיק נתונה ע"י $(v_x, v_y, v_z) = (v_0, 0, 0)$. בטאו את פתרון משוואות התנועה ע"י v_0 והגדלים הנתונים בשאלת.
- (ד) נתון כי ב- $t=0$ החלקיק נמצא בראשית הצירים. מהו וקטור המקום של החלקיק כפונקציה של הזמן?
- (ה) תארו באופן איקוטי את צורת המסלול שמבצע החלקיק.
- (ו) מהו המסלול שהוא מבצע החלקיק אם מהירותו ההתחלתית הייתה בכוון z בלבד?

3. חלקיק בעל מסה m_1 מתנגש אלסטית בחלקיק בעל מסה m_2 . החלקיק m_2 נמצא תחילה במצב מנוחה במערכת היחס של המעבדה. לאחר ההתנגשות מוסט המסלול של m_1 בזווית θ_1 מן הכוון ההתחלתי שלו.

(א) הראו כי $\tan \theta_1 = \frac{\sin \theta}{\cos \theta + m_1/m_2}$ כאשר θ זוית ההסתה במערכת מרכז המסה.

(ב) הראו הראו כי הערך המקסימלי של זוית הפיזור θ_1 במערכת המעבדה נתון ע"י $A = m_2/m_1 \tan \theta_1 = A/\sqrt{1 - A^2}$ כאשר $A = m_2/m_1$.

(ג) בניסוי נמצא, שהחקיקי α (אטומי הליום ללא אלקטرونים) העוברים דרך גז של אטומי מימן יש סטייה מקסימלית של 15° (במערכת המעבדה). הערכו את המסה של חלקיק α יחסית לאטום המימן

4. רכב חל פולט גז לאחר מכן ב מהירות u_0 (יחסית לרכב). קצב השני של מסת הרכב בגין שריפת הדלק קבוע $-\dot{M}$.

(א) מצאו את מהירות רכב החלל ומיקומו כפונקציה של הזמן (הניחו כי ב- $t = 0$ מהירות החללית u_0 ומסת M_0).

(ב) חזרו על סעיף (א) כאשר ידוע גם כי פועל על החללית כח חיכוך הפרופורציוני ל מהירות ונתנו ע"י $b = 2\alpha f(v) = -bv$. הניחו בניסוף כי