

תרגיל בית 3 – מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

הנשנה ב-23.08 בשיעור התדריל

הערה: הניקוד לשאלת הוא ביחס למספר הסעיפים שלו, ולא רמת הקושי בפתרוננה.

שאלה 1 [15 נק']

שחקן מטיל שני קוביית משחק הוגנות, לבנה ושחורה. לאחר שראה את חוצאות הנטלה, a ו- b, הוא בוחר מספר שלם שנמצא בקטע [a, b] בהסתברות שווה. לדוגמה: אם הקוביית הראו 4,6 המספר הנבחר יכול להיות אחד מהמס' 4,5,6 בהסתברות 1/3. אם ידוע שאחרי הטלת הקוביית נבחר המספר 6, מה ההסתברות שהקובייה הלבנה הראתה 6 בהטלה?

שאלה 2 [15 נק']

לקוחות מגיעים למרכז שירות של חברה סלולרית לפי התפלגות פואסון. בממוצע מגיעים 4 לקוחות בדקה.
א. אם ידוע שלפחות לקוח אחד הגיע בדקה מסוימת, מה ההסתברות שהגיעו סה"כ 3 לקוחות באotta דקה?
ב. לבדיקת איכות השירות, מחליטים בחברה לזוגות 10 קטיעי זמן בני דקה כל אחד (לא חופפים) ביום העבודה מסוים, ולרשום את מספר הלקוחות המגיעים באותו דקה. אם באותו קטיע זמן (דקה) הגיעו יותר מ- 4 לקוחות, הקטיע יחשב עמוס. מה ההסתברות שיהיו לפחות 2 קטיעים עמוסים ככלא מבין כל קטיעי הזמן שנדגמו?

שאלה 3 [24 נק']

בקו ייצור כל פריט תקין בהסתברות 0.7, ללא תלות בפריטים האחרים. מתחילה לייצר פריטים עד אשר מיצר פריט פגום ואז נפסיק מיד הייצור ע"י בקרת האיכות.
א. מצא את פונקציית ההסתברות של מספר הפריטים שנוצרו כולל הפריט הפגום.
ב. מצא את פונקציית ההסתברות של מספר הפריטים שנוצרו לא הפריט הפגום.
ג. מה ההסתברות שנוצרו לפחות 5 פריטים תקינים?

עתה מפעילים את קו הייצור ללא בקרת איכות ומיצרים 10 פריטים בדיק וועזרים:

- ד. מצא את פונקציית ההסתברות של מספר הפריטים התקינים שנוצרו.
- ה. מה ההסתברות שהוא בייצור לפחות 2 פריטים פגומים?
- ו. בדקו 7 פריטים שנוצרו וממצו שמדוברם תקינים. מה ההסתברות שם- 3 הפריטים נותרים, לכל היותר פריט אחד פגום?

שאלה 4 [12 נק']

כד מכיל 4 כדורים לבנים ו-4 כדורים שחורים. מוציאים באקראי 4 כדורים ללא החזרה. אם 2 מהם לבנים ו-2 שחורים הניסוי מסתתיים. אם לא, מוציאים את ה כדורים לכד ושוב מוציאים באקראי 4 כדורים וממשיכים כמקודם עד שיש בדיק 2 לבנים בין ה-4 שהוצאו. מה ההסתברות לחזור על הניסוי בבדיקה n פעמים?

שאלה 5 [12 נק']

מספר החולצות שקונה אדם הנכנס לחנות הוא $1 + X$, כאשר ($X \sim Bin(5, 0.8)$, בלתי תלוי בקונים האחרים).
מספר האנשים שנכנסים לחנות במשך שעה מפולג פואסונית עם פרמטר 20. מצא את תוחלת מספר החולצות הנמכרות בחנות בשעה כלשהי.

שאלה 6 [12 נק']

בכל אחת מ- 3 קופסאות יש 2 מהחיצות. אחת הקופסאות מכילה בכל אחת מהמחיצות מטבע זהב, השנייה מכילה בכל מחיצה מטבע כסף והשלישית מכילה באחת מהמחיצות מטבע כסף ובשנייה מטבע זהב. קופסה אחת נבחרה באופן מקרי, לאחר מכן נבחרה מהחיצה בקובפה באופן מקרי.

א. מה ההסתברות שבמחיצה שנבחרה יש מטבע כסף?

ב. מה החיצה נפתחה ונמצא שם מטבע זהב. מה ההסתברות שבמחיצה השנייה מטבע כסף?

שאלה 7 [6 נק']

אוגוסטוס וברוטוס משחקים משחק. אוגוסטוס לוקח 2 קופסאות ושם בקובפה הראשונה x זוזים ובקובפה השנייה $2x$ זוזים. לאחר שאוגוסטוס סיים מגיע ברוטוס וпотה קופסה באקראי ורואה 100 זוזים. ברוטוס חושב האם כדאי לו לפתח את הקופסה השנייה במקום?

ברוטוס שלנו למד הסתברות ומהליכת חשב: $200 \cdot 0.5 + 50 \cdot 0.5 = 125$. ובעצם ברוטוס מגיע למסקנה שככל מקרה עדיף לו לעבור קופסה? היכן ברוטוס טועה.

שאלה 8 [6 נק']

אם יש דרך לנצח את הקזינו? נבדוק!.

ישראל ישראלי טס ללאס וגאס וחושב על שיטה לתחמן את המערכת, הוא מתכוון להמר על רולטה בשיטה שמתוארת להלן.

בשלב ראשון ישראלי שם על אודום דולר 1

- אם הוא זכה הוא מתחיל את התהליך מההתחלה (מהמר שוב על דולר)

- אם הוא הפסיד הוא מהמר על אודום 2 דולר

אם הוא זכה בשלב זה, הוא מתחיל את התהליך מההתחלה (מהמר שוב על דולר)

אחרת מהמר על אודום 4 דולר וכך הלאה.

ישראל ישראלי אומר לעצמו בשלב מסוים, "תמיד אזכה ואז ארוויה פי 2 מכמות הכספי האחרון ששפטתי" כלומר:

$$\text{הפסד} - 2^{n-1} + 2^n + 4 + 8 + \dots = 1 + 2 + 4 + 8 + \dots$$

הרווה - 2^n

לכן בכל תהליך (שייעצר בשלב כלשהו) ישראל ישראלי חושב שהוא ירווה דולר 1 ולכן הוא תחמן את הקזינו. שימו לב שהROLטה הסיכוי לקבל שחור או אודום אין חצי חצי, יש 18 מספרים אודומים ו- 18 שחורים ועוד שני מספרים ירוקים המסומנים: 0,00. (אם יוצא ירוק הבית זוכה).

א. הסבירו לישראל ישראלי שהוא טועה ובדקו מה יקרה אם לישראל ישראלי יש מיליון דולר.

ב. מה יקרה אם לישראל שלנו יש אינסוף כסף? (בדקו את התוחלת?)