

מעריך תרגול 9 מופשטת 3

תרגיל 9.1 יהי $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ פולינום מדרגה p עם $p - 2$ שורשים ממשיים ו 2 שורשים מרוכבים שאינם ממשיים (שורשים אלה בהכרח צמודים). נסמן ב E את שדה הפיצול שלו. הוכיחו כי

$$\text{Gal}(E/F) \cong S_p$$

פתרון: כבר ראינו שחבורת גלואה משוכנת בתוך S_p . בנוסף ברור ש

$$p \mid [E : \mathbb{Q}] = |\text{Gal}(E/\mathbb{Q})|$$

לפי משפט קושי זה אומר שיש בחבורת גלואה איבר מסדר p . איבר כזה חייב להיות מחזור באורך p . כמו כן, הצמוד המרוכב הוא איבר בחבורת גלואה. הוא מחליף את שני השורשים המרוכבים ומקבע את השאר. ולכן השיכון ל S_p שולח אותו לחילוף. חילוף ומחזור באורך p יוצרים את כל S_p ולכן

$$\text{Gal}(E/F) \cong S_p$$

כנדרש.

תרגיל 9.2 שימוש לחבורת גלואה. תהי K/F הרחבת גלואה עם חבורת גלואה G . ויהי $a \in K$. נסמן

$$\text{orb}(a) = \{\varphi(a) \mid \varphi \in G\}$$

(הנקודה היא שזו קבוצה ולכן אין חזרות) - זה בדיוק המסלול של a תחת הפעולה של חבורת גלואה. הוכיחו כי הפולינום המינימלי של a הוא

$$m_a(x) = \prod_{b \in \text{orb}(a)} (x - b)$$

פתרון: מצד אחד $\varphi(a)$ תמיד שורש של הפולינום המינימלי של a ולכן

$$\prod_{b \in \text{orb}(a)} (x - b) \mid m_a$$

כמו כן נזכור ש m_a ספרבילי ולכן אין לו שורשים כפולים. כעת נשאר להוכיח שאין ל m_a שורשים נוספים. נשים לב ש K מפצל את m_a ולכן לכל שורש c של m_a יש $\varphi \in G$ כך ש $\varphi(a) = c$ (טרנזיטיביות על השורשים של פולינום אי פריק וכו'). ולכן כל שורש c של m_a נמצא בתוך $\text{orb}(a)$.

תרגיל 9.3 נביט על ההרחבה $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})/\mathbb{Q}$. מצאו את הפולינום המינימלי של $a = \sqrt{2} - 3\sqrt{3} + 2\sqrt{6}$ (לפחות כפירוק לשורשים). מה הדרגה שלו?

פתרון: נשתמש במשפט הקודם. נזכור שחבורת גלואה של ההרחבה היא $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$. נסמן את האיברים שלה ב

$$\{\text{id}, \theta, \tau, \theta\tau\}$$

כאשר

$$\theta(\sqrt{2}) = -\sqrt{2}, \quad \theta(\sqrt{3}) = \sqrt{3}$$

$$\tau(\sqrt{2}) = \sqrt{2}, \quad \tau(\sqrt{3}) = -\sqrt{3}$$

נמצא את המסלול של a

$$\text{id}(a) = \sqrt{2} - 3\sqrt{3} + 2\sqrt{6}$$

$$\theta(a) = -\sqrt{2} - 3\sqrt{3} - 2\sqrt{6}$$

$$\tau(a) = \sqrt{2} + 3\sqrt{3} - 2\sqrt{6}$$

$$\theta\tau(a) = -\sqrt{2} - 3\sqrt{3} + 2\sqrt{6}$$

הם כולם שונים כי כזכור $1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}$ הוא בסיס עבור המרחב הוקטורי $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ מעל \mathbb{Q} . ולכן הפולינום המינימלי הוא

$$(x - (\sqrt{2} - 3\sqrt{3} + 2\sqrt{6}))(x - (-\sqrt{2} - 3\sqrt{3} - 2\sqrt{6}))(x - (\sqrt{2} + 3\sqrt{3} - 2\sqrt{6}))(x - (-\sqrt{2} + 3\sqrt{3} - 2\sqrt{6}))$$

ודרגתו 4.

הערה 9.4 שווה לציין את הנקודה הבאה: נגיד שהיינו שואלים מה הפולינום המינימלי של $\sqrt{6}$? והיינו משתמשים בשיטה לעיל. היינו מגלים ש

$$\text{orb}(\sqrt{6}) = \{\pm\sqrt{6}\}$$

ולכן הפולינום המינימלי הוא $x^2 - 6$. כפי שאנחנו כבר יודעים.

תרגיל 9.5 חשבו את חבורת גלואה של E/\mathbb{Q} . כאשר E שדה הפיצול של $x^4 - 4x^2 - 1$.

פתרון: כמובן שזו הרחבת גלואה. נשים לב שהשורשים של הפולינום הם $\pm\sqrt{2 \pm \sqrt{5}}$ (קל לחשב). קל לוודא ש $x^4 - 4x^2 - 1$ אי פריק. די קל לבדוק ש

$$[E : \mathbb{Q}] = 8$$

ולכן יש 8 איברים בחבורת גלואה. ננסה להבין מה החבורה לפי הפעולה על השורשים. נמספר את השורשים 1, 2, 3, 4 לפי הסדר את השורשים $\sqrt{2 + \sqrt{5}}, -\sqrt{2 + \sqrt{5}}, \sqrt{2 - \sqrt{5}}, -\sqrt{2 - \sqrt{5}}$.

כל אוטומורפיזם נקבע לפי מה שהוא עושה ל

$$\sqrt{2 + \sqrt{5}}, \sqrt{2 - \sqrt{5}}$$

כמובן שיש אוטומורפיזם טריויאלי ששולח

$$\sqrt{2 + \sqrt{5}} \rightarrow \sqrt{2 + \sqrt{5}}$$

$$\sqrt{2 - \sqrt{5}} \rightarrow \sqrt{2 - \sqrt{5}}$$

האם יש עוד אוטומורפיזם φ_1 שמקיים $\varphi_1(\sqrt{2 + \sqrt{5}}) = \sqrt{2 + \sqrt{5}}$?

אם כן, נשים לב שהוא יקבע את כל $\mathbb{Q}(\sqrt{2 + \sqrt{5}})$ ולכן הוא יהיה שייך לחבורת גלואה $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{2 + \sqrt{5}}, \sqrt{2 - \sqrt{5}})/\mathbb{Q}(\sqrt{2 + \sqrt{5}}))$. הגודל של חבורת גלואה הזאת הוא 2 כי הפולינום האי פריק של $\sqrt{2 - \sqrt{5}}$ מעל $\mathbb{Q}(\sqrt{2 + \sqrt{5}})$ הוא

$$x^2 - (2 - \sqrt{5})$$

נשים לב ש $\sqrt{5} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2 + \sqrt{5}})$ ולכן יש 2 אוטומורפיזמים של E שמקבעים את $\sqrt{2 + \sqrt{5}}$ אחד מהם הוא כמובן ה id אבל השני חייב לשלוח

$$\sqrt{2 - \sqrt{5}} \rightarrow -\sqrt{2 - \sqrt{5}}$$

כי הוא חייב לשלוח שורש לשורש. נסמן את האיבר הזה ב φ_1 ונשים לב שהוא מקביל לתמורה (34) משיקול דומה לגמרי קיים גם אוטומורפיזם φ_2 המקיים

$$\varphi_2(\sqrt{2 - \sqrt{5}}) = \sqrt{2 - \sqrt{5}}$$

1

$$\varphi_2(\sqrt{2 + \sqrt{5}}) = -\sqrt{2 + \sqrt{5}}$$

שהוא מקביל לתמורה (12).

היות שחבורת גלואה פועלת טרנזיטיבית על שורשי פולינום אי פריק נקבל שיש איבר בחבורת גלואה, נסמנו φ_3 כך ש

$$\varphi_3(\sqrt{2 + \sqrt{5}}) = \sqrt{2 - \sqrt{5}}$$

כמובן ש

$$\varphi_3(-\sqrt{2 + \sqrt{5}}) = -\sqrt{2 - \sqrt{5}}$$

אבל מהו

$$\varphi(\sqrt{2 - \sqrt{5}}) = ?$$

נשים לב ש

$$\varphi_3(2 - \sqrt{5}) = \varphi_3(4 - (\sqrt{2 + \sqrt{5}})^2) = 4 - (2 - \sqrt{5}) = 2 + \sqrt{5}$$

ולכן בהכרח

$$\varphi(\sqrt{2 - \sqrt{5}}) = \pm \sqrt{2 - \sqrt{5}}$$

אם נסתכל על התמורה שכל אחד מהם יוצר נראה שהתמורה היא (13)(24) או (1324) בכל מקרה כיוון שאנחנו כבר יודעים ש (34), (12), בחבורה שלנו כל אחד מהם שנוסיף ייצר גם את השני

$$(1324) = (13)(24) \cdot (34)$$

$$(13)(24) = (1324) \cdot (34)$$

בכל מקרה אם נסתכל על התמורות האלה נראה שהן פורשות את D_4 , חבורת הסימטריות של ריבוע. שהיא חבורה בגודל 8 וזוהי חבורת גלואה.