

מטריצות הפיכות

הגדרה: מטריצה A נקראת **הפיכה** אם קיימת מטריצה B כך ש $AB = BA = I$. במקרה זה, מטריצה B נקראת **ההופכית** של A ומסומנת $B = A^{-1}$.

תכונות:

- מטריצה הפיכה היא בהכרח ריבועית
 - אם A ריבועית ו $AB = I$ אזי גם $BA = I$ והינה ההופכית של A
- $$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

תרגיל 6.1 וחצי

הוכח שאם A הפיכה גם המשוחלפת שלה הפיכה ומתקיים ש $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$.
הסק שאם A הפיכה וסימטרית אזי גם ההופכית שלה סימטרית.

[פתרון]

נניח A הפיכה, אזי קיימת לה הופכית כך ש $AA^{-1} = I$. נשחלף את שני האגפים ונקבל $(A^{-1})^t A^t = I^t = I$ ומכאן המש"ל כיוון ש A ריבועית וכך גם המשוחלפת שלה.

אם A הפיכה וסימטרית מתקיים $(A^{-1})^t = (A^t)^{-1} = A^{-1}$ כלומר ההופכית גם סימטרית.

מטריצות אלמנטריות

דיברנו כבר על פעולות שורה אלמנטריות כאשר דיברנו על פעולות שלא משנות את מרחב הפתרונות של המערכת המתאימה למטריצה. נזכיר מהן פעולות השורה האלמנטריות:

1. $R_i \leftrightarrow R_j$
2. כאשר $0 \neq \alpha \in \mathbb{F}$, $R_i \rightarrow \alpha R_i$
3. כאשר $i \neq j$, $R_i \rightarrow R_i + \alpha R_j$

פעולת שורה היא למעשה פונקציה שניתן להפעיל על כל מטריצה. למשל נסמן את פעולת השורה $R_1 \rightarrow R_1 - R_2$ באות ρ אזי מתקיים לדוגמא:

$$\rho \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rho \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

מטריצות אלמנטריות

מטריצת שורה אלמנטרית היא מטריצה המתקבלת מהפעלת פעולת שורה אלמנטרית על מטריצת היחידה.

משפט: לכל מטריצה A מתקיים $\rho(A) = \rho(I)A$.

כלומר, הפעלת פעולת שורה אלמנטרית שקולה לכפל במטריצת השורה האלמנטרית המתאימה.

יש משפט והגדרה דומים עבור מטריצות עמודה אלמנטריות עם כפל בצד השני. כמו כן, כל מטריצת שורה אלמנטרית הינה מטריצת עמודה אלמנטרית עבור פעולה מתאימה. מטריצות אלה נקראות ביחד **מטריצות אלמנטריות**.

מסקנה - אלגוריתם למציאת מטריצה הופכית

דירוג מטריצה שקול לכפל במטריצות אלמנטריות המתאימות לפעולות הדירוג. לכן, אם דירגנו מטריצה ריבועית לצורת מטריצה היחידה קיבלנו $\rho_1(I) \cdots \rho_k(I)A = I$ ולפיכך מתקיים שהמטריצה A הפיכה וההופכית שלה הינה $\rho_1(I) \cdots \rho_k(I)$.

אם נדרג קנונית את מטריצת הבלוקים $(A|I)$ נקבל מטריצה מהצורה $(I|\rho_1(I) \cdots \rho_k(I))$ שכן לפי כפל מטריצת בלוקים, כפל במטריצה האלמנטרית מופעל במקביל על כל אחד מהבלוקים. לכן כאשר אנחנו מדרגים את $(A|I)$ עד שנקבל את מטריצת היחידה משמאל, מימין נקבל את המטריצה ההופכית $(I|A^{-1})$.

דוגמא: (להראות את ההקבלה בין שניהם)

ע"י פעולות שורה אלמנטאריות:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{array} \right)$$

או ע"י מטריצות שורה אלמנטאריות:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = I \Rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

בדיקה:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} = I$$

המטריצות ההופכיות של המטריצות האלמנטאריות:

נסמן:

$\rho_{i,j}(I)$ - המטריצה האלמנטארית המחליפה את שורות i ו-j.

$\rho_{k,i}(I)$ - המטריצה האלמנטארית המכפילה את השורה ה-i ב-k.

ו- $\rho_{i+kj}(I)$ - המטריצה האלמנטארית המוסיפה לשורה ה-i k פעמים את השורה ה-j.

אזי:

$$(\rho_{i,j}(I))^{-1} = \rho_{i,j}(I)$$

$$(\rho_{k,i}(I))^{-1} = \rho_{\frac{1}{k}i}(I) \text{ (-קיים הופכי כי k מהשדה)}$$

$$\text{ו- } (\rho_{i+kj}(I))^{-1} = \rho_{i-kj}(I)$$

(גם הן מטריצות אלמנטאריות!)

ראינו שאם: $\rho_k \cdots \rho_1 A = I$ אז: $\rho_k \cdots \rho_1 = A^{-1}$.

$$\underline{\text{מסקנה:}} \rho_1^{-1} \cdots \rho_k^{-1} = A$$

כלומר, כל מטריצה הפיכה ניתנת להצגה כמכפלת מטריצות אלמנטאריות.

6.18 תרגיל. יהיו $A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$ כך ש A הפיכה. הוכח שהמערכות $Bx=0$ ו $(AB)x=0$ שקולות (כלומר e δ ן אומס פתרונות).

פתרון:

$$x \in \{v \in \mathbb{F}^n : Bv=0\} \Rightarrow Bx=0 \Rightarrow A(Bx)=0 \Rightarrow (AB)x=0 \Rightarrow x \in \{v \in \mathbb{F}^n : ABv=0\}$$

$$x \in \{v \in \mathbb{F}^n : ABv=0\} \Rightarrow (AB)x=0 \Rightarrow A(Bx)=0 \cdot A^{-1} \xrightarrow{\text{משמאל}} Bx=A^{-1} \cdot 0 \Rightarrow x \in \{v \in \mathbb{F}^n : Bv=0\}$$

6.25 תרגיל. תהא A מטריצה ריבועית מעל \mathbb{C} , כך שהמטריצה $A+A^2$ הפיכה. קבע איזה מהמטריצות $A, A+I$ היא הפיכה.

$$\exists D: D(A+A^2) = (A+A^2)D = I \\ \Rightarrow DA(I+A) = A(I+A)D = I \Rightarrow DA = (I+A)^{-1}, A^{-1} = (I+A)D$$

6.40 תרגיל. כפל של מטריצות בלוקים. יהיו $A \in \mathbb{F}^{a \times k}, B \in \mathbb{F}^{a \times m}, C \in \mathbb{F}^{b \times k}, D \in \mathbb{F}^{b \times m}$ ויהיו

$X \in \mathbb{F}^{k \times c}, Y \in \mathbb{F}^{k \times d}, Z \in \mathbb{F}^{m \times c}, W \in \mathbb{F}^{m \times d}$ הוכח:

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X & Y \\ Z & W \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AX+BZ & AY+BW \\ CX+DZ & CY+DW \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^{(a+b) \times (c+d)}$$

פתרון:

1. ראינו בכיתה שעבור מטריצות C, B, A כך שהכפל מוגדר (כלומר מספר עמודות C מס' שורות B, A) מתקיים: $C(A|B) = (CA|CB)$.

2. שימו לב שבאותו אופן ניתן להסתכל על מטריצת הבלוקים $\begin{pmatrix} A \\ - \\ B \end{pmatrix}$ ומטריצה שלישית C כך שהכפל

$$\begin{pmatrix} A \\ - \\ B \end{pmatrix} C = \begin{pmatrix} AC \\ - \\ BC \end{pmatrix}$$

מוגדר (כלומר מספר שורות C מס' עמודות B, A) ויתקיים:

ולכן, מהגדלים הנתונים ברור כי המכפלות מוגדרות ונקבל:

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X & Y \\ Z & W \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X & | & Y \\ Z & | & W \end{pmatrix} \stackrel{\text{לפי 1}}{=} \left(\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Z \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Y \\ W \end{pmatrix} \right) =$$

בגלל המימדים הנתונים

$$\left(\begin{pmatrix} A & B \\ - & - \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Z \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} A & B \\ - & - \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Y \\ W \end{pmatrix} \right) \stackrel{\text{לפי 2}}{=} \left(\begin{array}{c|c} \begin{pmatrix} A & B \\ - & - \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Z \end{pmatrix} \in F^{axc} & \begin{pmatrix} A & B \\ - & - \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Y \\ W \end{pmatrix} \in F^{axd} \\ \hline \begin{pmatrix} C & D \\ - & - \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Z \end{pmatrix} \in F^{bxc} & \begin{pmatrix} C & D \\ - & - \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Y \\ W \end{pmatrix} \in F^{bxd} \end{array} \right) =$$

$$\begin{pmatrix} AX+BZ & AY+BW \\ CX+DZ & CY+DW \end{pmatrix} \in F^{(a+b) \times (c+d)}$$

מרחבים וקטוריים:

מ"ו-הגדרה: קבוצה V

עם פעולה $+$ (חיבור וקטורי) המוגדרת על V ופעולה $\cdot_{\mathbb{F}V}: \mathbb{F} \times V \rightarrow V$ (כפל סקלרי) נקראת מרחב וקטורי

מעל השדה \mathbb{F} אם מתקיימות התכונות הבאות:

- 1 מוגדרות החיבור. לכל $u, v \in V$ מתקיים $u +_V v \in V$,
 - 2 קיבוץ. לכל $u, v, w \in V$ מתקיים $(u +_V v) +_V w = u +_V (v +_V w)$,
 - 3 חילוף. לכל $u, v \in V$ מתקיים $u +_V v = v +_V u$,
 - 4 איבר נייטרלי. קיים איבר $0_V \in V$ כך שלכל $v \in V$ מתקיים $v +_V 0_V = v$
 - 5 איבר נגדי. לכל $v \in V$ קיים $-v \in V$ כך ש $v +_V (-v) = 0_V$.
- 6 תכונות הכפל הסקלרי:

- א. מוגדרות. לכל $v \in V$ ו $\alpha \in \mathbb{F}$ מתקיים $\alpha \cdot_{\mathbb{F}V} v \in V$,
- ב. קיבוץ. לכל $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ ולכל $v \in V$ מתקיים $(\alpha \cdot_{\mathbb{F}} \beta) \cdot_{\mathbb{F}V} v = \alpha \cdot_{\mathbb{F}V} (\beta \cdot_{\mathbb{F}V} v)$,
- ג. כפל יחידה. לכל $v \in V$ מתקיים $1 \cdot_{\mathbb{F}V} v = v$.
- ד. פילוג.

(i) לכל $\alpha \in \mathbb{F}$ ולכל $u, v \in V$ מתקיים $\alpha \cdot_{\mathbb{F}V} (u +_V v) = \alpha \cdot_{\mathbb{F}V} u + \alpha \cdot_{\mathbb{F}V} v$

(ii) לכל $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ ולכל $v \in V$ מתקיים $(\alpha + \beta) \cdot_{\mathbb{F}V} v = \alpha \cdot_{\mathbb{F}V} v + \beta \cdot_{\mathbb{F}V} v$

אברי הקבוצה V נקראים וקטורים, ואברי השדה \mathbb{F} נקראים סקלרים.

1.2 תרגיל. יהא \mathbb{R}^2 עם פעולת חיבור וקטורים הרגילה. בכל אחד מהסעיפים הבאים מוצעת הגדרה לכפל

בסקלר. בדוק האם ההצעה אכן נותנת מרחב וקטורי.

א. $\alpha(x, y) := (\alpha x, y)$

ב. $\alpha(x, y) := (\alpha^2 x, \alpha^2 y)$

פתרון:

א. לא, כי ד לא מתקיים:

$$(k + h)(x, y) = ((k + h)x, y) = (kx + hx, y) \neq k(x, y) + h(x, y) = (kx, y) + (hx, y) = ((k + h)x, 2y)$$

ב. לא, כי ד לא מתקיים:

$$(h + k)(x, y) = ((h^2 + 2hk + k^2)x, (h^2 + 2hk + k^2)y) \neq h(x, y) + k(x, y) = ((h^2 + k^2)x, (h^2 + k^2)y)$$

מכפלה קרטזית-הגדרה

יהיו B, A קבוצות, אזי המכפלה הקרטזית בין A ל- B היא:
 $A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}$, כלומר כל הוקטורים הדו-מימדיים כך שהקואורדינטה הראשונה מגיעה מהקבוצה הראשונה במכפלה והקואורדינטה השנייה מהקבוצה השנייה במכפלה.

הכללה: יהיו קבוצות A_1, \dots, A_n , אזי המכפלה הקרטזית ביניהן היא:
 $A_1 \times \dots \times A_n = \{(a_1, \dots, a_n) : a_i \in A_i \quad \forall i = 1, \dots, n\}$
כלומר כל הוקטורים ה- n -מימדיים כך שהקואורדינטה במקום ה- i מגיעה מהקבוצה במקום ה- i במכפלה.

תכונה: מכפלה קרטזית היא מ"ו כאשר המוכפלים הם מ"ו מעל אותו שדה עם הפעולות:

- סכום וקטורים לפי רכיבים $(u_1, v_1) + (u_2, v_2) := (u_1 + u_2, v_1 + v_2)$
- כפל סקלארי – גם לפי רכיבים $\alpha(u, v) := (\alpha u, \alpha v)$

תת מרחב-הגדרה

יהא V מרחב וקטורי מעל \mathbb{F} . נאמר ש W תת-מרחב של V אם:

1. $\emptyset \neq W \subseteq V$
2. הקבוצה W היא מרחב וקטורי מעל \mathbb{F} ביחס לפעולת החיבור $+_V$ של V , והכפל הסקלארי $\cdot_{\mathbb{F}V}$.

2.1 תרגיל. יהא V מרחב וקטורי מעל שדה \mathbb{F} , ויהא W תת-מרחב של V . הוכח: $0_W = 0_V$.

פתרון:

נתון:

$$\left. \begin{array}{l} W \subseteq V \\ \forall w \in W \quad \exists -w \in W \end{array} \right\} \Rightarrow \forall w \in W \quad w, -w \in V \Rightarrow \underset{\downarrow}{0_V} = w + \underset{\downarrow}{(-w)} = \underset{\downarrow}{0_W}$$

כאיבר כאיבר
ב- V ב- W

תרגילים:

2.9 תרגיל. יהא $V = \mathbb{F}^{n \times n}$. הוכח שכל אחת מהקבוצות הבאות מהווה תת-מרחב של V (ביחס לפעולות של V):

- המטריצות הסימטריות.
- המטריצות האנטי-סימטריות [המטריצות האלכסוניות].
- המטריצות האלכסוניות.
- המטריצות המשולשיות עליונות.
- המטריצות A עם $\text{tr}(A) = 0$.
- המטריצות הסקלריות.
- מטריצות מהצורה $O \oplus A = \begin{pmatrix} O & O \\ O & A \end{pmatrix}$. (כאשר $k < n$).

פתרון:

א. $A, B, k \in F \Rightarrow (A + kB)^t = A^t + kB^t = A + kB$
סימטריות

ב. $A, B, k \in F \Rightarrow (A + kB)^t = A^t + kB^t = -(A + kB)$
אנטי סימטריות

ג.

$A = (a_{ij}), B = (b_{ij}) \Rightarrow \forall i \neq j \quad a_{ij}, b_{ij} = 0 \quad k \in F \Rightarrow A + kB = (a_{ij} + kb_{ij}) : \forall i \neq j \quad a_{ij} + kb_{ij} = 0$
אלכסוניות
 \Rightarrow אלכסוניות $A + kB$

ד.

$A = (a_{ij}), B = (b_{ij}) \Rightarrow \forall i > j \quad a_{ij}, b_{ij} = 0 \quad k \in F \Rightarrow A + kB = (a_{ij} + kb_{ij}) : \forall i > j \quad a_{ij} + kb_{ij} = 0$
משולשיות עליונות
 \Rightarrow משולשיות עליונה $A + kB$

ה. $k \in F, A, B \in F^{n \times n} : \text{tr}(A), \text{tr}(B) = 0 \Rightarrow \text{tr}(A + kB) = \text{tr}(A) + n \cdot k \cdot \text{tr}(B) = 0$

ו.

$A = (a_{ij}), B = (b_{ij}) \Rightarrow \begin{cases} \forall i \neq j \quad a_{ij}, b_{ij} = 0 \\ a_{ii} = \alpha, b_{ii} = \beta \quad \forall i = 1, \dots, n \end{cases} \quad \alpha, \beta, k \in F \Rightarrow$
סקלריות

$A + kB = (a_{ij} + kb_{ij}) : \begin{cases} \forall i \neq j \quad a_{ij} + kb_{ij} = 0 \\ a_{ii} + kb_{ii} = \alpha + k\beta \quad \forall i = 1, \dots, n \end{cases} \Rightarrow$ סקלריות $A + kB$

ז. תהיינה:

$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix} : A \in F^{k \times k}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} : B \in F^{m \times m}, \quad k, m < n$

אזי:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix} + \alpha \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & A + \alpha B \end{pmatrix} \in F^{(\max(k,m)) \times (\max(k,m))}, \quad \max(k,m) < n$$

2.10 תרגיל. תהא $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$, ונגדיר $V_A := \{B \in \mathbb{F}^{n \times n} : BA = AB\}$.

א. הוכח ש V_A תת-מרחב של $\mathbb{F}^{n \times n}$.

ב. הוכח ש V_A סגור גם לכפל מטריצות.

פתרון:

א.

$$B, C \in V_A \Rightarrow (B + kC)A = BA + kCA = AB + kAC = AB + AkC = A(B + kC) \Rightarrow B + kC \in V_A$$

$$B, C \in V_A \Rightarrow (BC)A = B(CA) = B(AC) = (BA)C = (AB)C = A(BC) \Rightarrow BC \in V_A \text{ ב.}$$

3.3 תרגיל. יהיו $U, W \subseteq V$ תת-מרחבים. הוכח: כל תת-מרחב של V המוכל ב UUW מוכל כולו ב U ו/או W .

ב W .

הוכחה: נניח בשלילה ש V איננו מוכל באחד מת"מ אלו, אזי $\exists u \in U \setminus W \wedge \exists w \in W \setminus U$, אבל U, W מוכלים ב- V ולכן: $u, w \in V$. נתבונן ב- $u + w \notin U, W$ (אחרת $u = u + w - w$ יהי ב- W) ולכן $u + w \notin V$ בסתירה לכך ש- $u, w \in V$.

3.4 תרגיל. יהי $V = \mathbb{F}^{n \times n}$. בכל אחד מהסעיפים הבאים נתונים שני תת-מרחבים U, W של V . עבור כל

אחד מהם, בצע את סדרת הבדיקות הבאה:

• תאר את $U \cap W$,

• הוכח ש $U \subseteq W$ או $W \subseteq U$; ואם לא - הראה ש UUW אינו מ"ו ע"י שתיקה $u, w \in UUW$ כך ש $u \in W$,

$w \in U$, ותראה (ישירות) ש $u + w \notin UUW$.

א. U - המטריצות הסימטריות; W - המטריצות האלכסוניות.

ד. U - המטריצות הסקלריות (כלומר מהצורה αI עבור $\alpha \in F$); W - מטריצות מהצורה $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix}$.

(A מטריצה $k \times k$ כאשר $k < n$).

פתרון:

$$U \cap W = \left\{ A = (a_{ij}) \in F^{n \times n} : A = A^t \wedge \forall i \neq j \quad a_{ij} = 0 \right\} \text{ א.}$$

$$A = (a_{ij}) \in W \Rightarrow \forall i \neq j \quad a_{ij} = 0 \Rightarrow \forall i \neq j \quad a_{ij} = a_{ji} \Rightarrow A \in U$$

ולכן $W \subseteq U$

$$U \cap W = \left\{ A \in F^{n \times n} : \exists \alpha \in F : \begin{cases} \forall i \neq j & a_{ij} = 0 \\ \forall i = 1, \dots, n & a_{ii} = \alpha \end{cases} \wedge \exists A' \in F^{k \times k} : A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & A' \end{pmatrix} \right\}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \in U \subseteq U \cup W, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \in W \subseteq U \cup W, \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \notin U, W \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \notin U \cup W$$

ולכן האיחוד איננו ת"מ.

סכום תתי מרחבים-הגדרה

יהא V מרחב וקטורי, ויהיו U, W תת-מרחבים של V . הסכום $U+W$ מוגדר ע"י:

$$U+W = \{u+w : u \in U, w \in W\}$$

אם $U \cap W = \{0\}$, נאמר שהסכום $U+W$ הוא ישר (ונכתוב $U \oplus W$).

תרגילים:

4.5 תרגיל. יהיו

$$U = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) : a_1 = a_2 = \dots = a_n\}; V = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) : a_1 + a_2 + \dots + a_n = 0\}$$

[א. הוכח ש U, V תת-מרחבים של F^n]

ב. הוכח: $F^n = U \oplus V$.

ג. עבור מטריצה $A \in F^{n \times n}$ נגדיר $\Delta A := (a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}) \in F^n$. יהא U תת-מרחב של F^n , ונגדיר

$$U_\Delta := \{A \in F^{n \times n} : \Delta A \in U\}$$

ד. עבור המרחבים U, V הנ"ל: האם $U_\Delta \oplus V_\Delta = F^{n \times n}$?

פתרון:

א. טריוויאלי.

ב. נחפש זוג וקטורים כך ש:

$$\forall v = (v_1 \dots v_n) \quad (v_1 \dots v_n) = (k, \dots, k) + (v_1 - k \dots v_n - k) : \sum (v_i - k) = \sum v_i - nk \Rightarrow$$

$$k = \frac{\sum v_i}{n}$$

↓

ממוצע הקואורדינטות

ולכן:

$$\forall v = (v_1 \dots v_n)$$

$$(v_1 \dots v_n) = \left(\frac{\sum v_i}{n}, \dots, \frac{\sum v_i}{n} \right) + \left(v_1 - \frac{\sum v_i}{n} \dots v_n - \frac{\sum v_i}{n} \right) : \left(\frac{\sum v_i}{n}, \dots, \frac{\sum v_i}{n} \right) \in U \wedge \left(v_1 - \frac{\sum v_i}{n} \dots v_n - \frac{\sum v_i}{n} \right) \in V$$

לגבי החיתוך: $(v_1 \dots v_n) \in V \cap U \Rightarrow nv_1 = 0 \Rightarrow \forall i \quad v_i = 0 \Rightarrow (v_1 \dots v_n) = 0$

ג.

$$\forall A, B \in U_\Delta \quad \exists (a_{11} \dots a_{nn}), (b_{11} \dots b_{nn}) \in \Delta A$$

אלכסונים של A, B

$$\Downarrow$$

$$(a_{11} \dots a_{nn}) + k(b_{11} \dots b_{nn}) \in \Delta(A) \Rightarrow A + kB \in U_\Delta$$

אלכסון של $A + kB$

ד. לא: $0 \neq A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \wedge A \in U_\Delta \cap V_\Delta$

4.7 תרגיל. יהא V מרחב כל הפונקציות $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, ויהיו U - הפונקציות הזוגיות (אלו המקיימות $f(-x) = -f(x)$ לכל $x \in \mathbb{R}$) ו- W - מרחב הפונקציות האיזוגיות (אלו המקיימות $f(-x) = f(x)$ לכל $x \in \mathbb{R}$).

[א. הוכח ש V מרחב וקטורי מעל \mathbb{R}]

[ב. הוכח ש U, W תת-מרחבים של V]

ג. הוכח: $V = U \oplus W$. (באז'ים: כל פונקציה ניתנת להצגה בצורה יחידה כסכום של פונקציה זוגית ופונקציה איזוגית)

פתרון:

א.

$$\forall f, g \in V, k \in \mathbb{R} \Rightarrow \forall x \in \mathbb{R} \quad (f + kg)(x) = f(x) + kg(x) \in \mathbb{R} \Rightarrow f + kg: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \Rightarrow f + kg \in V$$

ב.

$$f(x) = f(-x), g(x) = g(-x) \Rightarrow \forall k \in \mathbb{R} \quad (f + kg)(x) = f(x) + kg(x) = f(-x) + kg(-x) = (f + kg)(-x)$$

\Rightarrow ת"מ U

$$-f(x) = f(-x), -g(x) = g(-x) \Rightarrow \forall k \in \mathbb{R} \quad -(f + kg)(x) = -f(x) - kg(x) = f(-x) + kg(-x) = (f + kg)(-x)$$

\Rightarrow ת"מ U

ג.

+:

$$\forall g(x) \in V \quad g(x) = \frac{\overbrace{g(x)+g(-x)}^{h(x)} + \overbrace{g(x)-g(-x)}^{f(x)}}{2} \cdot \begin{cases} \frac{h(x)}{2} = \frac{g(x)+g(-x)}{2} = \frac{g(-x)+g(x)}{2} = \frac{h(-x)}{2} \Rightarrow \frac{h}{2} \in U \\ \frac{f(x)}{2} = \frac{g(x)-g(-x)}{2} = \frac{-(g(-x)+g(x))}{2} = \frac{-f(-x)}{2} \Rightarrow \frac{f}{2} \in W \end{cases}$$

$$\cap: g \in U \cap W \Rightarrow \forall x \in R \quad g(x) = g(-x) = -g(x) \Rightarrow 2g(x) = 0 \Rightarrow g(x) = 0 \forall x \in R \Rightarrow g = 0$$

4.10 תרגיל. יהיו U, V מרחבים וקטוריים מעל שדה F . הוכח: $U \times V = (U \times \{0_V\}) \oplus (\{0_U\} \times V)$.

+:

$$\forall (u, v) \in U \times V \quad (u, v) = (u, 0) + (0, v) \in (U \times 0) + (0 \times V)$$

\cap :

$$(u, v) \in (U \times 0) \cap (0 \times V) \Rightarrow (u, v) \in (U \times 0) \wedge (u, v) \in (0 \times V) \Rightarrow u \in U \wedge v \in \{0_V\} \wedge u \in \{0_U\} \wedge v \in V \Rightarrow u = 0_U, v = 0_V$$

ובסה"כ סכום ישר.