

שדות ותורת גלואה
מערכי תרגול קורס 88-311

אוקטובר 2021, גרסה 0.27

תוכן העניינים

4	מבוא
5	1 תרגול ראשון
5	1.1 תזכורת מתורת החוגים
8	1.2 קריטריון אייזנשטיין והלמה של גאוס
8	2 תרגול שני
10	2.1 הרחבת שדות
12	3 תרגול שלישי
12	3.1 חישוב פולינום מינימלי
13	3.2 כפליות הממד
14	4 תרגול רביעי
14	4.1 שורשי יחידה
16	4.2 שדות פיצול
16	5 תרגול חמישי
16	5.1 המשך שדות פיצול
18	5.2 המשכה
19	6 תרגול שישי
19	6.1 קומפוזיטום
19	6.2 פולינומים ספרביליים
20	6.3 הרחבות ספרביליות
22	7 תרגול שביעי
22	7.1 חבורת גלואה
23	7.2 מבוא לחישוב חבורת גלואה
26	8 תרגול שמיני
26	8.1 הרחבות נורמליות והרחבות גלואה
29	9 תרגול תשיעי
31	10 תרגול עשירי
31	10.1 התאמת גלואה
32	10.2 העתקת הצמצום

34	10.3 סגור גלואה
34		11 תרגול אחד עשר
34	11.1 פולינומים ציקלוטומיים

מבוא

כמה הערות טכניות לתחילת הקורס:

- דף הקורס נמצא באתר www.math-wiki.com.
- שאלות בנוגע לחומר הלימודי מומלץ לשאול בדף השיחה באתר של הקורס.
- החומר בחוברת הזו נאסף מכמה מקורות, ומבוסס בעיקרו על שינויים ותוספות למערכי תרגול של איתמר שטיין ושירה גילת.
- נשתדל לכתוב **בגופן הזה** כשהגדרות ומושגים חשובים מופיעים בפעם הראשונה. נוסף בצד גם את השם באנגלית, שעשוי לעזור כשמחפשים חומר נוסף שאינו בעברית.
- נשמח לכל הערה על מסמך זה.

מחבר בתשע"ט ותש"ף: תומר באואר
עדכונים בתשפ"ב: גיא בלשר

1 תרגול ראשון

1.1 תזכורת מתורת החוגים

Rng, or
non-unital ring
Additive group

הגדרה 1.1. חוג בלי יחידה $(R, +, \cdot, 0)$ הוא מבנה אלגברי המקיים:

1. $(R, +, 0)$ הוא חבורה אבלית. נקראת החבורה החיבורית של החוג.

2. (R, \cdot) הוא חבורה למחצה.

3. מתקיים פילוג (משמאל ומימין). כלומר לכל $a, b, c \in R$ מתקיים

$$(a + b)c = ac + bc, \quad a(b + c) = ab + ac$$

כאשר ההקשר ברור, נכתוב רק R במקום $(R, +, \cdot, 0)$.

הגדרה 1.2. R הוא שדה אם $(R \setminus \{0\}, \cdot)$ חבורה אבלית.

Field

שדות הם חוגים מאוד טובים. הם חילופיים וכל איבר לא אפסי בהם הפיך.

הגדרה 1.3. יהי R חוג. **אידיאל** של R הוא תת-חבורה חיבורית $I \subseteq R$ שמקיימת בליעה ביחס לכפל: $IR, RI \subseteq I$.

Ideal

תזכורת 1.4. יהי F שדה. נתבונן בחוג $F[x]$.

• זהו תחום אוקלידי – ניתן לחלק פולינומים עם שארית;

• לכן, זהו תחום ראשי – כל אידיאל ב- $F[x]$ נוצר על ידי פולינום אחד. אפשר ממש למצוא את היוצר: היוצר של אידיאל $I \triangleleft F[x]$ הוא הפולינום הלא אפסי מדרגה מינימלית ששייך ל- I .

• האידיאלים המקסימליים ב- $F[x]$ הם בדיוק האידיאלים מהצורה $\langle f(x) \rangle$ כאשר $f \neq 0$ הוא פולינום אי-פריק.

• (אפשר להמשיך למספר משתנים: החוג $F[x_1, \dots, x_n]$ הוא תחום פריקות יחידה ובפרט תחום שלמות, אבל לא תחום ראשי.)

מסקנה 1.5. אם F שדה ו- $f \in F[x]$ פולינום אי-פריק, אז $F[x]/\langle f \rangle$ הוא שדה, ו- F משוכן בתוכו:

$$F \hookrightarrow F[x]/\langle f \rangle$$

לפי המסקנה האחרונה, כדי להבין שדות, עלינו להבין פולינומים אי פריקים.

תזכורת 1.6. יהי R תחום שלמות. איבר לא הפיך $a \in R$ נקרא **אי פריק** אם $a = bc$ גורר ש- b הפיך או c הפיך.

Irreducible

שאלה 1.7. בהינתן פולינום $f(x) \in F[x]$ איך ניתן לקבוע אם הוא אי פריק או לא?

חשוב להדגיש כל הזמן מה השדה שעובדים מעליו. למשל $x^2 - 2$ פריק מעל \mathbb{R} אבל לא מעל \mathbb{Q} . עבורנו התכונה אי פריק היא "הבסיסית" יותר, ופולינום נקרא פריק אם הוא לא אי פריק. נציג מספר שיטות, ונתחיל בכמה אבחנות קלות:

- כל פולינום ממעלה 1 הוא אי פריק. אז המקרה הזה משעמם. מעכשיו נניח כי $\deg f(x) \geq 2$ בטענות לא טריוויאליות.

- כל פולינום שיש לו שורש בשדה F הוא פריק. הסבר: α שורש של $f(x)$ אם ורק אם $x - \alpha \mid f(x)$.

- אם ל- $f(x)$ אין שורשים בשדה F זה לא אומר שהוא אי פריק. למשל ל- $f(x) = (x^2 - 5)^2$ מעל \mathbb{Q} אין שורשים, אבל הוא פריק.

טענה 1.8. לפולינום $f(x) \in F[x]$ ממעלה n מעל שדה יש לכל היותר n שורשים.

דוגמה 1.9. האם $x^n - 1$ פריק עבור $n > 1$ (נניח מעל \mathbb{Q})? כן, כי מייד רואים ש- $x = 1$ הוא שורש.

תרגיל 1.10. יהי $f(x)$ פולינום ממעלה 2 או 3. אז $f(x)$ אי פריק אם ורק אם אין ל- $f(x)$ שורשים.

פתרון. אם ל- $f(x)$ יש שורש הסברנו כבר שהוא פריק. מצד שני אם $f(x) = g(x)h(x)$ כאשר $\deg g(x), \deg h(x) \geq 1$ אז אחד מהם חייב להיות ממעלה 1 וזה אומר של- $f(x)$ יש שורש.

דוגמה 1.11. האם $x^2 - x - 1$ פריק מעל \mathbb{Q} ? בעזרת "נוסחת השורשים" מגלים שהשורשים הם $\frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$ שאינם רציונליים, ולכן הפולינום אי פריק.

תרגיל 1.12. האם הפולינום $x^3 - x + 1$ פריק מעל \mathbb{Z}_3 ?

פתרון. יש בסך הכל 3 מספרים בשדה. מסתבר שאף אחד מהם לא מאפס את הפולינום ולכן הוא אי פריק.

לשמחתנו, גם אם עובדים מעל \mathbb{Q} יש דרך להגיע למספר סופי של שורשים אפשריים שצריך לבדוק.

1.13. הערה. אם $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ אז ניתן להכפיל במכפלה משותפת של המכנים ולקבל פולינום עם מקדמים שלמים שהוא פריק אם ורק אם $f(x)$ פריק. לכן כשעובדים מעל \mathbb{Q} ניתן תמיד להניח שהמקדמים שלמים. למשל, לעבוד עם $3x^2 + 2$ במקום עם $\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}$.

תרגיל 1.14. יהי $f(x) = a_n x^n + \dots + a_0$ כאשר כל המקדמים שלמים, הוכיחו כי אם השבר המצומצם $\frac{q}{r}$ הוא שורש של $f(x)$ אז

$$q \mid a_0, \quad r \mid a_n$$

פתרון. לפי הנתון

$$a_n \left(\frac{q}{r}\right)^n + \dots + a_0 = 0$$

נכפול ב- r^n ונקבל

$$a_n q^n + a_{n-1} q^{n-1} r + \dots + a_1 q r^{n-1} + a_0 r^n = 0$$

מה שאומר ש- $a_0 r^n$ ו- $a_n q^n$ מתקיימים, אבל בגלל ש- r ו- q זרים (הרי השבר מצומצם) אז מתקיים

$$q \mid a_0, \quad r \mid a_n$$

תרגיל 1.15. האם הפולינום $x^3 - x - 6$ אי פריק מעל $\mathbb{Q}[x]$?

פתרון. לפי התרגיל הקודם, אם $\frac{q}{r}$ פתרון (שהוא שבר מצומצם) אז

$$q \mid 6, \quad r \mid 1$$

כך שבסך הכל האפשרויות הן:

$$\frac{q}{r} \in \{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6\}$$

אם עוברים עליהן אפשר לראות ש-2 הוא שורש ולכן הפולינום פריק.

תרגיל 1.16. מצאו את הפירוק של $x^3 - x - 6$ לגורמים אי פריקים מעל \mathbb{Q} .

פתרון. היות ש-2 שורש של הפולינום אנחנו יודעים ש- $x - 2 \mid x^3 - x - 6$. נשתמש בחילוק פולינומים ונגלה

$$\frac{x^3 - x - 6}{x - 2} = x^2 + 2x + 3$$

ל- $x^2 + 2x + 3$ אין שורשים מעל \mathbb{Q} ולכן הוא אי פריק. לסיכום הפירוק הוא

$$x^3 - x - 6 = (x - 2)(x^2 + 2x + 3)$$

כמובן ששיטה זו עובדת גם מעל שדות סופיים.

גם עבור פולינום ממעלה גבוהה מ-3 או פולינומים מעל \mathbb{R} אפשר להשתמש בשיטה הזו, אבל רק כדי למצוא שורש רציונלי ולהראות פריקות. אם לא מוצאים שורש אי אפשר להגיד כלום (בינתיים).

הערה 1.17. זכרו כי לפולינום ממעלה אי זוגית מעל \mathbb{R} תמיד יש שורש אחד לפחות ולכן הוא תמיד פריק.

1.2 קריטריון אייזנשטיין והלמה של גאוס

נעבור לטכניקות אחרות לבדיקת פריקות. מעכשיו נניח כי R תחום שלמות ו- F שדה השברים שלו. הדוגמה שבדרך כלל תשמש אותנו היא $R = \mathbb{Z}$ ו- $F = \mathbb{Q}$.

Eisenstein's
criterion

משפט 1.18 (קריטריון אייזנשטיין). יהי $P \triangleleft R$ אידיאל ראשוני. יהי $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 \in R[x]$ פולינום המקיים

$$i \neq n \quad a_i \in P \quad \bullet$$

$$a_n \notin P \quad \bullet$$

$$a_0 \notin P^2 \quad \bullet$$

אז f אי פריק ב- $F[x]$ (אין לו פירוק אמיתי מעל R). אם f פרימיטיבי ב- R (המחלק המשותף המרבי של מקדמיו הוא 1), אז f אי פריק ב- $R[x]$. במקרה הפרטי שבו $P = \langle p \rangle$ עבור איבר ראשוני p התנאים לעיל שקולים לכך ש- p לא מחלק את a_n , מחלק את a_i עבור $i \neq n$ ו- p^2 לא מחלק את a_0 .

דוגמה 1.19. $x^n - 4x + 2$ אי פריק מעל \mathbb{Q} כי הוא אייזנשטיין עבור $p = 2 \in \mathbb{Z}$. לפעמים צריך להתחכם יותר.

תרגיל 1.20. האם הפולינום $x^4 + 4x^3 + 6x^2 - 1$ אי פריק מעל \mathbb{Q} ?

כדי לפתור את התרגיל נעזר בעובדה ההבאה:

טענה 1.21. $f(x)$ אי פריק אם ורק אם $f(x+c)$ אי פריק לכל $c \in F$.

הוכחה. קל לוודא שתמיד $f(x)$ ו- $f(x+c)$ מאותה מעלה ולכן $f(x) = g(x)h(x)$ פירוק אם ורק אם $f(x+c) = g(x+c)h(x+c)$ פירוק. \square

פתרון. אם נשים לב שהפולינום שלנו הוא למעשה

$$(x+1)^4 - 4(x+1) + 2$$

היות ש- $x^4 - 4x + 2$ אי פריק לפי קריטריון אייזנשטיין, אז גם הפולינום שלנו אי פריק.

2 תרגול שני

לשיטה הבאה שנציג צריך תזכורת נוספת:

תזכורת 2.1 (גרסה ללמה של גאוס). יהי R תחום שלמות ויהי F שדה השברים שלו. יהי $f(x) \in R[x]$. אז $f(x)$ אי פריק ב- $F[x]$ אם ורק אם הוא לא ניתן לפירוק למכפלת פולינומים לא קבועים שמעלתם קטנה מ- $\deg f(x)$.

תזכורת 2.2 (גרסה ללמה של גאוס). יהי $f(x)$ פולינום שכל מקדמיו שלמים. נניח שהוא פרימיטיבי. אז $f(x)$ אי פריק ב- $\mathbb{Z}[x]$ אם ורק אם הוא אי פריק ב- $\mathbb{Q}[x]$.

משפט 2.3 (שיטת הרדוקציה). יהי $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ ויהי p ראשוני כלשהו. נסמן ב- $\bar{f}(x)$ את הפולינום המתקבל מביצוע מודולו p למקדמי f . אם $\deg \bar{f}(x) = \deg f(x)$ ו- $\bar{f}(x)$ אי פריק אז גם $f(x)$ אי פריק.

את ההוכחה נשאיר כתרגיל מודרך לשיעורי בית. כעת נראה יישום.

תרגיל 2.4. האם הפולינום $8x^3 - 6x - 1$ אי פריק ב- $\mathbb{Q}[x]$?

פתרון. היות ש- $\gcd(8, 6, 1) = 1$ הפולינום אי פריק ב- $\mathbb{Q}[x]$ אם ורק אם הוא אי פריק ב- $\mathbb{Z}[x]$. ננסה להשתמש בשיטת הרדוקציה.

ננסה $p = 2$: מתקבל -1 שאינו באותה מעלה כמו f .

ננסה $p = 3$: מתקבל $2x^3 - 1$ שהוא פריק ($x = 2$ שורש).

ננסה $p = 5$: מתקבל $3x^3 - x - 1$ שהוא במקרה אי פריק (בודקים 5 אפשרויות). לכן גם הפולינום $8x^3 - 6x - 1$ אי פריק.

תרגיל 2.5. הפולינום $f(x) = x^4 + 1$ הוא אי-פריק מעל \mathbb{Q} . הראו שלכל p ראשוני, f פריק ב- \mathbb{F}_p .

פתרון. ראשית, כדי להוכיח ש- $f(x)$ אי-פריק מעל \mathbb{Q} , נשים לב כי

$$f(x+1) = (x+1)^4 + 1 = x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 2$$

שהוא אי-פריק לפי אייזנשטיין עם $p = 2$.

כעת נעבור ל- \mathbb{F}_p . נראה שאפשר למצוא פירוק מהצורה

$$x^4 + 1 = (x^2 + ax + b)(x^2 + cx + d)$$

נשווה מקדמים:

$$a + c = 0$$

$$b + ac + d = 0$$

$$ad + bc = 0$$

$$bd = 1$$

אם נציב את המשוואה הראשונה ואת המשוואה האחרונה בשתי המשוואות האמצעיות, נקבל

$$b - a^2 + \frac{1}{b} = 0$$

$$\frac{a}{b} - ab = 0$$

כלומר

$$b + \frac{1}{b} = a^2$$

$$\frac{a}{b} = ab$$

נחלק לשני מקרים:

- אם $a = 0$, נרצה שיתקיים $b^2 + 1 = 0$ (כלומר $\sqrt{-1} \in \mathbb{F}_p$).
- אם $a \neq 0$, נרצה שיתקיים $b^2 = 1$, כלומר $b = \pm 1$. נציב במשוואה הראשונה ונקבל $a^2 = \pm 2 \in \mathbb{F}_p$, כלומר רוצים $\sqrt{\pm 2} \in \mathbb{F}_p$.

לכן עלינו להראות שלכל p , לפחות אחד מבין $-1, 2, -2$ הוא ריבוע מודולו p . בתרגיל הבית תוכיחו כי $\mathbb{F}_p^\times = \langle g \rangle$ היא חבורה ציקלית, כלומר $\mathbb{F}_p^\times \cong \mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z}$; לכן $(\mathbb{F}_p^\times)^2 \cong \mathbb{Z}/\frac{p-1}{2}\mathbb{Z}$ ולכן $[\mathbb{F}_p^\times : (\mathbb{F}_p^\times)^2] = 2$. נתבונן במחלקות המתאימות ל- $-1, 2, -2$ ב- $\mathbb{F}_p^\times/(\mathbb{F}_p^\times)^2$; אם -1 ו- 2 אינם ריבועים, אז שניהם מתאימים למחלקה הלא טריוויאלית, ולכן מכפלתם (-2) תתאים למחלקה הטריוויאלית, כלומר -2 כן יהיה ריבוע מודולו p .

2.1 הרחבת שדות

Subfield
Field extension

Intermediate
field

הגדרה 2.6. יהי $F \subseteq K$ תת-שדה של K . במקרה זה נאמר כי K הוא הרחבה של F ונסמן זאת K/F . כן, זה אותו סימון של חוג מנה, אבל אנחנו לא נתבלבל ביניהם כי שדה הוא חוג פשוט ומכאן שחוגי המנה שלו לא מעניינים.
אם ישנה שרשרת של שדות $F \subseteq L \subseteq K$ נאמר כי L הוא שדה ביניים של ההרחבה K/F .

תזכורת 2.7. ראינו בתרגול הקודם דרך לבנות הרחבת שדות מתוך השדה F : אם $f \in F[x]$ פולינום אי-פריק, אז $F[x]/\langle f \rangle$ הוא שדה שמכיל את f . אם $\deg f = n$, הוכחתם בתרגיל הבית כי $\{1, x, \dots, x^{n-1}\}$ הוא בסיס של $F[x]/\langle f \rangle$ כמרחב וקטורי מעל F .

תרגיל 2.8. בשדה $\mathbb{Q}[x]/\langle x^3 - x^2 + 1 \rangle$, חשבו את ההופכי של $x^2 - 1$ כצירוף לינארי של $1, x, x^2$.

פתרון. נסמן $f(x) = x^3 - x^2 + 1$ ו- $g(x) = x^2 - 1$. כדי לחשב את ההופכי, ניעזר באלגוריתם אוקלידס המורחב למצוא $a(x), b(x) \in \mathbb{Q}[x]$ שעבורם

$$a(x) \cdot f(x) + b(x) \cdot g(x) = 1$$

נחלק עם שארית:

$$x^3 - x^2 + 1 = (x - 1)(x^2 - 1) + x$$

ולכן

$$x = 1 \cdot (x^3 - x^2 + 1) - (x - 1) \cdot (x^2 - 1) = f(x) - (x - 1)g(x)$$

לשלב הבא,

$$x^2 - 1 = x \cdot x - 1$$

ולכן

$$1 = x \cdot x - 1 \cdot (x^2 - 1) = x \cdot (f(x) - (x - 1)g(x)) - g(x) = x \cdot f(x) + (-x^2 + x - 1)g(x)$$

בסך הכל $a(x) = x$ ו- $b(x) = -x^2 + x - 1$. לכן ההופכי של $x^2 - 1$ בשדה $\mathbb{Q}[x]/\langle x^3 - x^2 + 1 \rangle$ הוא $-x^2 + x - 1$.

תזכורת 2.9. תהי K/F הרחבת שדות ויהי $a \in K$.

• מגדירים $F[a] = \{f(a) \mid f \in F[x]\} = \{\sum_{i=0}^n \alpha_i a^i \mid \alpha_i \in F\}$. זהו תת-חוג של F .

• הסיפוח של a ל- F הוא תת-השדה (של K) הקטן ביותר שמכיל את F ואת a . נסמן אותו $F(a)$. הרחבה כזו, באיבר אחד, נקראת גם **הרחבה פשוטה**. בדרך אחרת, השדה $F(a)$ הוא החיתוך של כל תת-השדות שמכילים גם את F וגם את a . חשוב להדגיש את התכונה הפשוטה (אך חשובה) הבאה: אם L שדה ביניים המכיל את a אז $F(a) \subseteq L$. נדגיש כי $F(a) = F$ אם ורק אם $a \in F$.

Simple extension

Algebraic

Transcendental

אם a הוא **אלגברי** מעל F , כלומר שורש של איזשהו פולינום לא אפסי עם מקדמים ב- F , אז $F[a]$ הוא שדה ומתקיים $F[a] = F(a)$; אחרת, אומרים ש- a הוא **טרנסצנדנטי** מעל F , ואז $F[a] \cong F[x]$ ו- $F(a) \cong F(x)$.

דוגמה 2.10. $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$. הסבר: צריך רק לוודא שהוא סגור לכפל לחיבור ולהופכי ואז זה תת-שדה של \mathbb{R} . מצד שני, ברור שכל שדה שמכיל את \mathbb{Q} ו- $\sqrt{2}$ מכיל גם את השדה מסגירות לחיבור ולכפל. שימו לב כי $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ מפני ש- $(\sqrt{2})^{-1} = \frac{1}{2}\sqrt{2}$.

תרגיל 2.11. הוכיחו כי $\sqrt{6} \notin \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$.

פתרון. נניח בשלילה ש- $\sqrt{6} \in \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$. אז קיימים $a, b \in \mathbb{Q}$ עבורם

$$\sqrt{6} = a + b\sqrt{2}$$

לא ייתכן ש- $b = 0$ כי $\sqrt{6}$ לא רציונלי, ולא ייתכן ש- $a = 0$ כי $\sqrt{3}$ לא רציונלי. נעלה משוואה זו בריבוע ונקבל

$$6 = a^2 + 2\sqrt{2}ab + 2b^2$$

כלומר

$$\sqrt{2} = \frac{6 - a^2 - 2b^2}{2ab}$$

מותר לחלק כי כבר הוכחנו $ab \neq 0$. קיבלנו ש- $\sqrt{2}$ רציונלי, וזו סתירה.

הערה 2.12. כמו שאפשר לספח איבר אחד, אפשר לספח קבוצת איברים, והעיקרון דומה.

תרגיל 2.13. האם $\sqrt{2}i \in \mathbb{Q}[\sqrt{2} + i]$?

פתרון. על פניו אפשר לחשוד שלא, כמו בתרגיל הקודם. אבל בעצם

$$(\sqrt{2} + i)^2 = 2 + 2\sqrt{2}i - 1 = 1 + 2\sqrt{2}i$$

נחסר 1 ונחלק ב-2 (פעולות שמשאירות אותנו בתוך השדה) ונקבל כי

$$\sqrt{2}i \in \mathbb{Q}[\sqrt{2} + i]$$

3 תרגול שלישי

Dimension

3.1 הגדרה תהי K/F הרחבת שדות. בפרט K הוא מרחב וקטורי מעל F . **הממד** של K/F הוא הממד של K מעל F ומסמנים אותו $[K : F] = \dim_F K$. לא להתבלבל עם הסימון הזה של אינדקס שראינו בתורת החבורות.

3.2 דוגמה לכל שדה F מתקיים $[K : F] = 1$ אם ורק אם $K = F$.

3.3 דוגמה $[C : R] = 2, [R : Q] = \infty, [Q[\sqrt{2}] : Q] = 2$.

3.4 משפט יהי פולינום אי פריק f מעל F עם שורש a , אז $\deg f = [F(a) : F]$.

במילים אחרות, אם K/F הרחבת שדות ו- $a \in K$ אלגברי מעל F , אז

$$F[x]/\langle f(x) \rangle \cong F[a] \cong F(a)$$

כאשר $f(x)$ הוא פולינום מינימלי של a . שימו לב שאם $b \in K$ שורש אחר של $f(x)$, אז $f(x)$ הוא פולינום מינימלי גם של b ומתקיים $F[a] \cong F[b]$. גם הכיוון ההפוך נכון:

3.5 טענה אם K/F הרחבת שדות כך ש- $K \cong F[a]$, אז $K = F[b]$ עבור איזשהו $b \in K$ שהוא שורש של פולינום מינימלי של a . זה כמובן לא אומר ש- $b \in F[a]$.

3.6 שאלה תהי $F(a)$ הרחבה של F ונניח ש- f הוא הפולינום המינימלי של a (מעל F). האם כל השורשים של f נמצאים ב- $F(a)$?

פתרון. לפעמים כן (למשל $Q(\sqrt{2})$) אבל זה לא תמיד קורה. למשל ניקח את $Q(\sqrt[3]{2})$. ברור כי $Q(\sqrt[3]{2}) \subseteq R$ ושהפולינום המינימלי של $\sqrt[3]{2}$ הוא $x^3 - 2$, אבל שאר השורשים שלו הם מרוכבים ולכן לא נמצאים ב- $Q(\sqrt[3]{2})$.

3.7 הערה המצבים שבהם כן כל השורשים נמצאים בהרחבה הם חשובים ונדבר עליהם בהרחבה בהמשך הקורס.

3.1 חישוב פולינום מינימלי

3.8 תרגיל מהו הפולינום המינימלי של $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ מעל Q ? מעל $Q(\sqrt{2})$?

פתרון. נסמן $a = \sqrt{2} + \sqrt{3}$. מעל $Q(\sqrt{2})$,

$$a - \sqrt{2} = \sqrt{3} \implies a^2 - 2\sqrt{2}a + 2 = 3 \implies a^2 - 2\sqrt{2}a - 1 = 0$$

נטען כי $f(x) = x^2 - 2\sqrt{2}x - 1$ הוא הפולינום המינימלי של a מעל $Q(\sqrt{2})$. אכן, $\sqrt{2} + \sqrt{3} \notin Q(\sqrt{2})$, ולכן הפולינום המינימלי לא יכול להיות לינארי. לכן הוא מדרגה 2, אבל $f(x)$ מדרגה 2 ולכן הוא המינימלי. מעל Q , נשים לב כי

$$a^2 = 2 + 2\sqrt{6} + 3 = 5 + 2\sqrt{6}$$

ולכן $a^2 - 5 = 2\sqrt{6}$ נעלה בריבוע ונקבל

$$a^4 - 10a^2 + 25 = 24 \implies a^4 - 10a^2 + 1 = 0$$

נטען כי $g(x) = x^4 - 10x^2 + 1$ הוא הפולינום המינימלי של $\sqrt{2} + \sqrt{3}$. אכן, הוא מאפס אותו; כדי להראות אי-פריקות, ניזכר שמתרגיל הבית מתקיים $\mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$, וניתן לוודא כי $[\mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3}) : \mathbb{Q}] = 4$. לכן הדרגה של הפולינום המינימלי של $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ מעל \mathbb{Q} צריכה להיות 4, ולכן זהו $g(x)$.

תרגיל 3.9. נתון כי הפולינום המינימלי של a (מעל \mathbb{Q}) הוא $x^3 - 6x^2 + 9x + 11$ מצאו את הפולינום המינימלי של $\frac{1}{a}$.

פתרון. נציב a בפולינום ונשים לב כי

$$a^3 - 6a^2 + 9a + 11 = 0$$

ולכן

$$1 - \frac{6}{a} + \frac{9}{a^2} + \frac{11}{a^3} = 0$$

כלומר הפולינום $11x^3 + 9x - 6x + 1$ מאפס את $\frac{1}{a}$. אין לפולינום שורשים ב- \mathbb{Q} (אם b היה שורש אז $\frac{1}{b}$ שורש של הפולינום המקורי בסתירה לאי פריקות). לכן הוא הפולינום המינימלי (צריך לחלק ב-11 כדי להפוך אותו למתוקן).

3.2 כפליות הממד

תזכורת 3.10 (כפליות הממד). אם $F \subseteq L \subseteq K$, אז

$$[K : L][L : F] = [K : F]$$

תרגיל 3.11. תהי $F \subseteq K$ הרחבת שדות ויהיו $a, b \in K \setminus F$. נניח כי

$$[F(a) : F] = n, \quad [F(b) : F] = m$$

הוכיחו כי $[F(a, b) : F] \leq nm$.

פתרון. הנתון $[F(a) : F] = n$ אומר לנו שהפולינום המינימלי $m_a \in F[x]$ של a מעל F הוא ממעלה n . אבל m_a הוא גם פולינום מעל $F(b)$ שמאפס את a . לכן הפולינום המינימלי של a מעל $F(b)$ מחלק את m_a ולכן הוא ממעלה קטנה (או שווה) ממנו. לכן

$$[F(a, b) : F(b)] \leq n$$

ומכאן נקבל בעזרת כפליות הממד:

$$[F(a, b) : F] = [F(a, b) : F(b)] [F(b) : F] \leq nm$$

תרגיל 3.12. בהמשך לתרגיל הקודם, הראו שאם $(n, m) = 1$ אז $[F(a, b) : F] = nm$.

פתרון. נשים לב כי

$$[F(a, b) : F] = [F(a, b) : F(a)][F(a) : F] = n[F(a, b) : F(a)]$$

$$[F(a, b) : F] = [F(a, b) : F(b)][F(b) : F] = m[F(a, b) : F(b)]$$

כלומר $[F(a, b) : F] \mid n, m$. לפי תורת המספרים האלמנטרית

$$nm = [n, m] \mid [F(a, b) : F]$$

כי n, m זרים, ולכן $[F(a, b) : F] = nm$.

דוגמה 3.13. $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[3]{11}) : \mathbb{Q}] = 6$ כי $(2, 3) = 1$.

תרגיל 3.14. תהי K/F הרחבה סופית, ויהי $p \in F[x]$ פולינום אי-פריק (מעל F) כך ש- $\deg p \nmid [K : F]$. הוכיחו כי ל- p אין שורש ב- K .

הוכחה. נניח בשלילה שיש שורש $\alpha \in K$ של p . לכן $F \subseteq F(\alpha) \subseteq K$. ממשפט 3.4, $\deg p = [F(\alpha) : F] \mid [K : F]$. אבל מכפלויות המימד נקבל $[K : F] \nmid [F(\alpha) : F]$. בסתירה לנתון. \square

הערה 3.15. ייתכן שמעל F הפולינום p יהפוך להיות פריק, גם אם אין לו שורש. למשל, אם ניקח $F = \mathbb{Q}$, $K = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ ו- $p(x) = x^4 - 2$. $p(x) = (x^2 + \sqrt{2})(x^2 - \sqrt{2})$ כי מעל K אבל פריק מעל \mathbb{Q} לפי אייזנשטיין עם $p = 2$.

4 תרגול רביעי

4.1 שורשי יחידה

Primitive root of unity

הגדרה 4.1. יהי F שדה. איבר $\rho \in F$ נקרא **שורש יחידה פרימיטיבי** (או קדום) ממעלה n אם הסדר שלו ב- F^* הוא n . כלומר $\rho^n = 1$ וגם $\rho^i \neq 1$ לכל $1 \leq i < n$.

דוגמה 4.2. ב- \mathbb{C} לכל $n \in \mathbb{N}$ יש שורש יחידה פרימיטיבי, למשל $\rho_n = e^{2\pi i/n}$.

הערה 4.3. אם ρ שורש יחידה פרימיטיבי מדרגה n , אז ρ^k הוא שורש יחידה פרימיטיבי מדרגה n אם ורק אם $(n, k) = 1$.

תרגיל 4.4. יהי $\rho \in F$ שורש יחידה פרימיטיבי מדרגה n . הוכיחו כי $1, \rho, \dots, \rho^{n-1}$ כולם שונים זה מזה, והראו כי

$$x^n - 1 = \prod_{i=1}^n (x - \rho^i)$$

פתרון. נניח כי $\rho^i = \rho^j$ כאשר $i \leq j$. אז $\rho^{j-i} = 1$. אבל $0 \leq j - i < n$, ולכן בהכרח $j = i$, כי ρ הוא שורש יחידה פרמיטיבי מדרגה n . נשים לב ש- ρ^i הוא שורש של $x^n - 1$ לכל i . מכיוון שהם שונים, אלו הם כל השורשים של $x^n - 1$, כי זה פולינום מעל שדה ממעלה n . לכן $x^n - 1 = \prod_{i=1}^n (x - \rho^i)$.

דוגמה 4.5. יהי ρ שורש יחידה פרמיטיבי מדרגה n . אז

$$\mathbb{Q}(\rho) = \{a_0 + a_1\rho + \dots + a_{n-1}\rho^{n-1} \mid a_i \in \mathbb{Q}\}$$

דוגמה 4.6. יהי p ראשוני ויהי ρ_p שורש יחידה פרמיטיבי מדרגה p . אז הוא בוודאי מאפס את $x^p - 1$. נחפש גורם אי פריק של פולינום זה:

$$\frac{x^p - 1}{x - 1} = x^{p-1} + \dots + x + 1$$

שהוא הפולינום המינימלי של ρ_p כי למזלנו פתרנו את תרגילי הבית בתורת החוגים שבהם הוכחנו שהוא אי פריק. לכן $[\mathbb{Q}(\rho_p) : \mathbb{Q}] = p - 1$.

תרגיל 4.7. נסמן $\rho = e^{\frac{\pi i}{6}}$, שהוא שורש יחידה פרמיטיבי מדרגה 12. הוכיחו כי

$$\mathbb{Q}(\rho) = \mathbb{Q}(\sqrt{3}, i)$$

פתרון. נשים לב ש- $\rho = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$. אז ברור ש- $\mathbb{Q}(\rho) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{3}, i)$. מצד שני $\rho^3 = i$ ולכן $i \in \mathbb{Q}(\rho)$ וגם

$$\sqrt{3} = 2(\rho - \frac{i}{2}) \in \mathbb{Q}(\rho)$$

ולכן יש שוויון.

תרגיל 4.8. בהמשך לתרגיל הקודם, חשבו את $[\mathbb{Q}(\rho) : \mathbb{Q}]$.

פתרון. קל לראות ש- $[\mathbb{Q}(\sqrt{3}) : \mathbb{Q}] = 2$ וש- $[\mathbb{Q}(i, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}(\sqrt{3})] = 2$ ולכן

$$[\mathbb{Q}(\rho) : \mathbb{Q}] = 4$$

תרגיל 4.9. בהמשך לתרגיל הקודם, מצאו פולינום מינימלי של ρ .

פתרון. אנחנו יודעים כי $\rho^{12} = 1$. כלומר מדובר בשורש של $x^{12} - 1$. אבל זה כמובן פריק. נתחיל לפרק

$$x^{12} - 1 = (x^6 - 1)(x^6 + 1)$$

ונשים לב כי ρ שורש של $x^6 + 1$. לפי הנוסחה $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$ נקבל

$$x^6 + 1 = (x^2 + 1)(x^4 - x^2 + 1)$$

מפני ש- ρ אינו שורש של $x^2 + 1$, אז הוא צריך להיות שורש של $x^4 - x^2 + 1$. זה פולינום אי פריק כי אנחנו כבר יודעים ש- $[\mathbb{Q}(\rho) : \mathbb{Q}] = 4$. למעשה יש לנו דרך חדשה להוכיח שפולינום הוא אי פריק.

הערה 4.10. בהמשך הקורס נלמד על הפירוק המלא של $x^n - 1$.

4.2 שדות פיצול

הגדרה 4.11. יהי $f \in F[x]$. הפולינום f מתפצל ב- F אם אפשר לפרק אותו למכפלה של גורמים לינאריים. אם f מתפצל בהרחבת שדות E/F , נאמר ש- E הוא שדה מפצל של f .

Split
 E Splits f

דוגמה 4.12. $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ מפצל את $x^2 - 2$ מעל \mathbb{Q} . באופן דומה $\mathbb{Q}[\sqrt{\Delta}]$ מפצל את $ax^2 + bx + c$ כאשר Δ היא הדיסקרימיננטה. אפשר לפצל כמה פולינומים בבת אחת, למשל \mathbb{C} הוא שדה מפצל של כל פולינום מעל \mathbb{Q} .

הגדרה 4.13. יהי $f \in F[x]$. נאמר ש- E/F הוא שדה פיצול של f אם הוא שדה מפצל מינימלי. כלומר אין שדה ביניים (לא טריוויאלי) שהוא שדה מפצל.

Splitting field

משפט 4.14. יהי $f \in F[x]$. כל שדות הפיצול של f מעל F איזומורפיים.

תרגיל 4.15. מצאו את שדה הפיצול של $x^5 - 2$ מעל \mathbb{Q} ואת הממד שלו.

פתרון. נסמן $\rho = e^{2\pi i/5}$. אז השורשים של הפולינום הם

$$\sqrt[5]{2}, \sqrt[5]{2}\rho, \dots, \sqrt[5]{2}\rho^4$$

ולכן שדה הפיצול הוא $E = \mathbb{Q}(\sqrt[5]{2}, \sqrt[5]{2}\rho, \dots, \sqrt[5]{2}\rho^4)$. קל לבדוק כי

$$\mathbb{Q}(\sqrt[5]{2}, \sqrt[5]{2}\rho, \dots, \sqrt[5]{2}\rho^4) = \mathbb{Q}(\sqrt[5]{2}, \rho)$$

וקל לחשב $[\mathbb{Q}(\sqrt[5]{2}) : \mathbb{Q}] = 5$. כמו כן, נשים לב כי $x^5 - 1$ מאפס את ρ . אבל הפולינום הזה אינו הפולינום המינימלי כי הוא פריק. אנחנו כבר יודעים כי

$$x^5 - 1 = (x - 1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)$$

ושהגורם $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ הוא אי פריק. לכן $[\mathbb{Q}(\rho) : \mathbb{Q}] = 4$. מפני ש- $\gcd(4, 5) = 1$, אז לפי תרגיל 3.12 (או מתרגיל הבית), נקבל $[E : \mathbb{Q}] = 20$.

5 תרגול חמישי

5.1 המשך שדות פיצול

תרגיל 5.1. מצאו את שדה הפיצול של $x^4 - 4x^2 - 1$ מעל \mathbb{Q} .

פתרון. צריך בסך הכל למצוא את השורשים. מציבים $t = x^2$ ופותרים. מגלים שהשורשים הם

$$\pm\sqrt{2 + \sqrt{5}}, \pm\sqrt{2 - \sqrt{5}}$$

ולכן שדה הפיצול הוא $\mathbb{Q}(\sqrt{2 + \sqrt{5}}, \sqrt{2 - \sqrt{5}})$.

תרגיל 5.2. הוכיחו כי $f(x) = x^4 - 4x^2 - 1$ הוא אי פריק מעל \mathbb{Q} .

פתרון. דרך א': ברור של- $f(x)$ אין שורשים ב- \mathbb{Q} (כי מצאנו את השורשים). אז נשאר לוודא שהוא לא מתפרק למכפלת פולינומים ממעלה 2. אבל אנחנו כבר יודעים

$$x^4 - 4x^2 - 1 = (x - \sqrt{2 + \sqrt{5}})(x + \sqrt{2 + \sqrt{5}})(x - \sqrt{2 - \sqrt{5}})(x + \sqrt{2 - \sqrt{5}})$$

וקל לבדוק שכל מכפלה של שני גורמים מכאן אינה פולינום מעל \mathbb{Q} .
דרך ב': כמו בתרגיל הבית מוכיחים ש- $[\mathbb{Q}(\sqrt{2 + \sqrt{5}}) : \mathbb{Q}] = 4$. לכן הפולינום המינימלי של $\sqrt{2 + \sqrt{5}}$ הוא ממעלה 4, לכן $x^4 - 4x^2 - 1$ מינימלי ולכן אי פריק.

תרגיל 5.3. כמה תת-שדות יש ל- \mathbb{C} שאיזומורפיים ל- $\mathbb{Q}(\sqrt{2 + \sqrt{5}})$?

פתרון. אם $K \subseteq \mathbb{C}$ הוא שדה ויש $\varphi: \mathbb{Q}(\sqrt{2 + \sqrt{5}}) \rightarrow K$ איזומורפיזם, אז φ מקבע את \mathbb{Q} . כמו כן $\varphi(\sqrt{2 + \sqrt{5}})$ בהכרח נשלח לשורש של $x^4 - 4x^2 - 1$ שזה פולינום עם 4 שורשים (שונים) בסך הכל. מכאן מסיקים שכל אחד מבין

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2 + \sqrt{5}}), \mathbb{Q}(-\sqrt{2 + \sqrt{5}}), \mathbb{Q}(\sqrt{2 - \sqrt{5}}), \mathbb{Q}(-\sqrt{2 - \sqrt{5}})$$

מוכל ב- K . לכן הוא צריך להיות שווה ל- K משיקולי ממד. כעת נשים לב שהשניים הימניים והשמאליים למעשה שווים. אז יש רק שני תת-שדות והם $\mathbb{Q}(\sqrt{2 - \sqrt{5}})$ ו- $\mathbb{Q}(\sqrt{2 + \sqrt{5}})$. אלו שדות איזומורפיים אבל שונים, כי אחד מרוכב והשני ממשי.

תרגיל 5.4. נסמן $E = \mathbb{Q}(\sqrt{2 + \sqrt{5}}, \sqrt{2 - \sqrt{5}})$. חשבו את הממד שלו מעל \mathbb{Q} .

פתרון. כבר ראינו $[\mathbb{Q}(\sqrt{2 + \sqrt{5}}) : \mathbb{Q}] = 4$, ונשאר לבדוק מהו $[E : \mathbb{Q}(\sqrt{2 + \sqrt{5}})]$. ברור שזה לא 1 כי

$$\sqrt{2 - \sqrt{5}} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{2 + \sqrt{5}})$$

שהוא מספר מרוכב ואילו $\mathbb{Q}(\sqrt{2 + \sqrt{5}})$ ממשי. מצד שני, נשים לב ש- $\sqrt{5} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2 + \sqrt{5}})$ ולכן

$$x^2 - 2 + \sqrt{5}$$

פולינום מאפס של $\sqrt{2 - \sqrt{5}}$ מעל $\mathbb{Q}(\sqrt{2 + \sqrt{5}})$. לכן $[E : \mathbb{Q}(\sqrt{2 + \sqrt{5}})] = 2$ וקיבלנו ש- $[E : \mathbb{Q}] = 8$.

תרגיל 5.5. יהי F שדה ממאפיין p . נתבונן בפולינום $f(x) = x^p - x - a$. יהי α שורש של $f(x)$. מצאו את שדה הפיצול של α מעל F .

פתרון. נשים לב כי לכל $k \in \{0, 1, \dots, p-1\}$ מתקיים

$$f(\alpha + k) = (\alpha + k)^p - (\alpha + k) - a = \alpha^p + k^p - \alpha - k - a = 0$$

מפני ש- $(\alpha + k)^p = \alpha^p + k^p$. כלומר $\{\alpha + k\}_{k=0}^{p-1}$ הם כל השורשים של f , כי הוא ממעלה p . לכן שדה הפיצול הוא

$$F[\alpha] = F[\alpha, \alpha + 1, \dots, \alpha + p - 1]$$

טענה 5.6. לכל פולינום $f \in F[x]$ יש שדה מפצל שממדו אינו עולה על $(\deg f)!$.
דוגמה 5.7. בתרגיל 5.5, אם $f(x)$ אי פריק, אז $[F[\alpha] : F] = p$ וזה יכול להיות ממש קטן מ- $p!$.

5.2 המשכה

תרגיל 5.8. יהיו $f, g: F(a_1, \dots, a_n) \rightarrow K$ שני הומומורפיזמים שמקיימים

$$\begin{aligned} f(x) &= g(x) \quad \forall x \in F \\ f(a_i) &= g(a_i) \quad 1 \leq i \leq n \end{aligned}$$

הוכיחו כי $f = g$.

פתרון. הקבוצה $\{r \in F(a_1, \dots, a_n) \mid f(r) = g(r)\}$ היא תת-שדה של $F(a_1, \dots, a_n)$ (קל לבדוק) והיא מכילה את F, a_1, \dots, a_n . לכן היא כל $F(a_1, \dots, a_n)$, ונסיק $f = g$.

הגדרה 5.9. תהי K/F הרחבת שדות, ויהי $\varphi: F \rightarrow E$ שיכון (למה כל הומומורפיזם של שדות הוא שיכון?). שיכון $\bar{\varphi}: K \rightarrow E$ נקרא **המשכה** של φ אם הצמצום של $\bar{\varphi}$ ל- F שווה ל- φ .

Extension of an
embedding

תרגיל 5.10. תהי K/F הרחבת שדות. יהי $g(x) \in F[x]$ אי פריק ויהיו a, b שני שורשים של g . הוכיחו כי יש איזומורפיזם

$$f: F(a) \rightarrow F(b)$$

המקיים כי $f(a) = b$ וכן $f(\alpha) = \alpha$ לכל $\alpha \in F$.

פתרון. נסתכל על העתקת ההכלה $i: F \hookrightarrow F(b)$. אפשר להרחיב אותה להעתקה

$$\hat{i}: F[x] \rightarrow F(b)$$

כך ש- $f(x) = b$ לפי הגדרת פולינומים. כמובן שכעת זו העתקה על. נשים לב שהגרעין הוא $\langle g(x) \rangle$ (כי $g(x)$ פולינום מינימלי של a). לפי משפט האיזומורפיזם הראשון

$$f: F[x]/\langle g(x) \rangle \rightarrow F(b)$$

הוא איזומורפיזם ובאופן דומה ניתן לבנות איזומורפיזם $g: F[x]/\langle g(x) \rangle \rightarrow F(a)$ האיזומורפיזם שאנחנו מחפשים הוא gf^{-1} .

תזכורת 5.11. תהי K/F הרחבת שדות ויהיו $a, b \in K$ איברים עם פולינומים מינימליים m_a, m_b מעל F , בהתאמה. נסמן ב- E_a, E_b את שדות הפיצול של m_a, m_b . אז כל איזומורפיזם

$$f: F(a) \rightarrow F(b)$$

שמקבע את איברי F (כלומר $f(\alpha) = \alpha$ לכל $\alpha \in F$) ניתן להרחיב לאיזומורפיזם $f: E_a \rightarrow E_b$.

תרגיל 5.12. יהי $g(x) \in F[x]$ פולינום אי פריק עם שדה פיצול E . ויהיו a, b שני שורשים של $g(x)$. הוכיחו כי יש איזומורפיזם $f: E \rightarrow E$ שמקבע את איברי F ומקיים $f(a) = b$.

פתרון. לפי תרגיל קודם יש איזומורפיזם $f: F(a) \rightarrow F(b)$ שמקבע את איברי F ושולח $f(a) = b$ לפי התזכורת אפשר להרחיב אותו לכל E .

6 תרגול שישי

6.1 קומפוזיטום

Compositum

הגדרה 6.1. אם $F, L \subseteq K$, אז **הקומפוזיטום** של F ו- L הוא תת-השדה המינימלי שמכיל את F, L ומסומן בדרך כלל FL או $F \vee L$.

תרגיל 6.2. יהיו $F \subseteq K \subseteq E$ שדות כך ש- E שדה פיצול של פולינום $f(x) \in F[x]$ כלשהו ו- K מכיל שורש a של $f(x)$. הוכיחו כי ניתן למצוא K_1, \dots, K_r תת-שדות של E שכולם איזומורפיים ל- K כך שמתקיים

$$E = K_1 K_2 \cdots K_r$$

פתרון. נסמן ב- b_1, \dots, b_r את שורשי f . ראינו כבר שיש איזומורפיזמים

$$f_i: F(a) \rightarrow F(b_i)$$

ואפשר להרחיב אותם $f_i: E \rightarrow E$. נסמן $K_i = f_i(K)$ לכל i . אז כמובן $K_i \cong K$, ולכל i מתקיים $K_i \subseteq E$ ולכן

$$K_1 K_2 \cdots K_r \subseteq E$$

מצד שני כל השורשים של f שייכים ל- $K_1 K_2 \cdots K_r$ ולכן $E \subseteq K_1 K_2 \cdots K_r$, כדרוש.

6.2 פולינומים ספרביליים

Separable

הגדרה 6.3. פולינום $f(x)$ המתפצל בשדה E נקרא **ספרבילי** (פריד) אם בפירוק שלו אין גורם כפול מן הצורה $(x - \alpha)^2$. בצורה פחות מדוייקת, אפשר לומר שכל השורשים של $f(x)$ שונים זה מזה בשדה הפיצול שלו, ולמעשה אין תלות ב- E .

דוגמה 6.4. נתבונן ב- $F = \mathbb{F}_2(t)$ שהוא שדה השברים של החוג $\mathbb{F}_2[t]$. הפולינום $f(x) = x^2 - t$ הוא אי פריק ואי ספרבילי. רואים זאת לפי החישוב

$$x^2 - t = (x - \sqrt{t})(x + \sqrt{t}) = (x + \sqrt{t})^2$$

כי השדה הוא ממאפיין 2, והוא אי פריק כי $\sqrt{t} \notin F$.

הערה 6.5. דרך אפקטיבית לזהות פולינום ספרבילי היא לפי הקריטריון: $f(x)$ ספרבילי אם ורק אם $\gcd(f(x), f'(x)) = 1$.
 בפרט, אם $f(x)$ אי פריק, אז הוא ספרבילי אם ורק אם $f' \neq 0$.
 בפרט, במאפיין 0, כל פולינום אי פריק הוא ספרבילי.

תרגיל 6.6. האם הפולינום $x^4 - 8x + 16 \in \mathbb{Q}[x]$ ספרבילי?

פתרון. הנגזרת היא $4x^3 - 8$. צריך לבדוק האם הם זרים. נשתמש באלגוריתם אוקלידס כאשר קודם נחלק ב-4 (שהוא הפיך) ונמשיך עם $x^3 - 2$:

$$x^4 - 8x + 16 = x(x^3 - 2) - 6x + 16$$

נחלק ב-6 ונמשיך עם $x - \frac{8}{3}$:

$$(x^3 - 2) = (x^2 + \frac{8}{3}x + \frac{64}{9})(x - \frac{8}{3}) + \frac{512}{27}$$

ולכן הפולינום זרים. כלומר הפולינום $x^4 - 8x + 16$ ספרבילי.

תרגיל 6.7. האם הפולינום $x^4 - 8x^2 + 16$ ספרבילי?

פתרון. קל לפתור על ידי חישוב השורשים ישירות, אבל נשתמש בנגזרת במקום. הנגזרת היא $4x^3 - 16x$ ונשתמש באלגוריתם אוקלידס עם $x^3 - 4x$. נחשב

$$x^4 - 8x^2 + 16 = x(x^3 - 4x) - 4x^2 + 16$$

ומפני ש- $x^3 - 4x = x(x^2 - 4)$, כלומר לפולינום ולנגזרתו יש גורם משותף $x^2 - 4$, נקבל כי $x^4 - 8x^2 + 16$ לא ספרבילי.

6.3 הרחבות ספרביליות

הגדרה 6.8. הרחבת שדות K/F תקרא **ספרבילית** (פְּרִיָּדָה) אם הפולינום המינימלי של כל $a \in K$ מעל F הוא ספרבילי. (כל איבר כזה נקרא **איבר ספרבילי**).

דוגמה 6.9. אם F שדה ממאפיין $p > 0$, אז $F(\sqrt[p]{t})/F(t)$ אינה ספרבילית כי $x^p - t$ לא ספרבילי.

תרגיל 6.10. תהי K/F הרחבת שדות ספרבילית, ויהי L שדה ביניים. הוכיחו כי גם L/F וגם K/L ספרביליות.

פתרון. ברור ש- L/F ספרבילית, כי כל איבר ב- L הוא איבר של K . עבור K/L , יהי $a \in K$ ויהי $f_{a,F}$ הפולינום המינימלי של a מעל F . אז $f_{a,L} | f_{a,F}$ ולכן ל- $f_{a,L}$ אין שורשים כפולים. לכן K/L ספרבילית.

Separable
extension
Separable
element

קעת מטרתנו תהיה להוכיח את הכיוון ההפוך. כלומר: אם L/F ו- K/L הרחבות ספרביליות, אז K/F הרחבה ספרבילית. שימו לב שבמקרה של מאפיין 0, הטענה טריוויאלית; שהרי במאפיין 0 כל פולינום אי פריק הוא ספרבילי. אנחנו נוכיח את זה במקרה של הרחבות סופיות, כלומר $[L : F] < \infty$.

6.11 הגדרה. זרגת הספרביליות של ההרחבה K/F , המסומנת $[K : F]_s$, היא מספר השיכונים של K בסגור האלגברי \bar{F} של F שמקבעים את F . באופן שקול: זו כמות ההמשכות של $\text{id} : F \hookrightarrow \bar{F}$ לשיכון $K \hookrightarrow \bar{F}$.

תזכורת 6.12 (מההרצאה). יהי a איבר אלגברי מעל F עם פולינום מינימלי f . אז מספר ההרחבות של שיכון $\varphi : F \hookrightarrow E$ לשיכון $\psi : F(a) \hookrightarrow E$ שווה למספר השורשים השונים של $\varphi(f)$ ב- E .

תרגיל 6.13 (לבית). אם $\varphi : F \hookrightarrow K$ שיכון ו- $f \in F[x]$, אז f ספרבילי מעל F אם ורק אם $\varphi(f)$ ספרבילי מעל K .

מסקנה 6.14. יהי α אלגברי מעל F . אז:

1. לכל שיכון $\varphi : F \hookrightarrow \bar{F}$ יש לכל היותר $[F(\alpha) : F]$ המשכות לשיכון $F(\alpha) \hookrightarrow \bar{F}$.
בפרט, $[F(\alpha) : F]_s \leq [F(\alpha) : F]$.

2. ספרבילי מעל F אם ורק אם יש בדיוק $[F(\alpha) : F]$ המשכות כאלו (ובאופן שקול):
 $([F(\alpha) : F]_s = [F(\alpha) : F])$.

הוכחה. כמות השורשים השונים שיש ל- $\varphi(f)$ היא לכל היותר $\deg \varphi(f) = \deg f$. כמות השורשים שיש ל- $\varphi(f)$ שוויון אם ורק אם יש $\deg f$ שורשים שונים, כלומר α ספרבילי מעל F .
 \square

מסקנה 6.15. אם K/F הרחבה סופית ו- \bar{F} שיכון, אז:

1. יש לכל היותר $[K : F]$ דרכים להמשיך את φ לשיכון $K \hookrightarrow \bar{F}$. בפרט,
 $[K : F]_s \leq [K : F]$.

2. אם K נוצר על ידי איברים ספרביליים מעל F , אז יש שוויון בסעיף הקודם.

הוכחה. נבחר $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$ כך ש- $K = F(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$. נוכיח את הטענה באינדוקציה על n . את המקרה $n = 1$ הראינו במסקנה הקודמת.

נניח שהטענה נכונה עבור כל הרחבה עם n יוצרים. תהי $K = F(\alpha_1, \dots, \alpha_{n+1})$ הרחבה עם $n + 1$ יוצרים, ונסמן $K_0 = F(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$. כל המשכה $K \hookrightarrow \bar{F}$ של φ נקבעת על ידי התמונה של K_0 , שהיא המשכה של φ ל- \bar{F} , ומהתמונה של α_{n+1} ב- \bar{F} . מהנחת האינדוקציה, יש לכל היותר $[K_0 : F]$ דרכים להמשיך את φ לשיכון $K_0 \hookrightarrow \bar{F}$, ולכל המשכה כזו יש לכל היותר $[K : K_0]$ דרכים להמשיך אותה לשיכון $K \hookrightarrow \bar{F}$. בסך הכל נקבל שיש לכל היותר $[K : F] \cdot [K : K_0] = [K : F]$ שיכונים $K \hookrightarrow \bar{F}$ שממשיכים את φ .

בנוסף, אם $\alpha_1, \dots, \alpha_{n+1}$ ספרביליים מעל F , אז מהנחת האינדוקציה יש בדיוק $[K_0 : F]$ דרכים להמשיך את φ לשיכון \overline{F} של K_0 . מתרגיל 6.10 נקבל ש- α_{n+1} ספרבילי מעל K_0 , ולכן יש בדיוק $[K : K_0]$ דרכים להמשיך כל המשכה כזו לשיכון \overline{F} . מכפלות המימד נקבל שיש $[K : F]$ דרכים להמשיך φ לשיכון \overline{F} של K . כנדרש. \square

טענה 6.16. תהי $K = F(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ הרחבה סופית של F . אז הבאים שקולים:

1. ההרחבה K/F ספרבילית.

2. האיברים $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ ספרביליים מעל F .

3. $[K : F]_s = [K : F]$.

הוכחה. $2 \Leftarrow 1$ טריוויאלי.

$3 \Leftarrow 2$ מהמסקנה הקודמת.

$1 \Leftarrow 3$ נניח בשלילה שקיים איבר $\beta \in K$ לא ספרבילי. נתבונן במגדל השדות $F \subseteq F(\beta) \subseteq K$. את שיכון הזהות $\text{id} : F \hookrightarrow \overline{F}$ אפשר להמשיך ל- $F(\beta)$ ב- $[F(\beta) : F]_s < [F(\beta) : F]$ דרכים, וכל המשכה כזו ניתן להמשיך ל- K בכלל היותר $[K : F(\beta)]$ דרכים. אלו כל המשכות של $\text{id} : F \hookrightarrow \overline{F}$ לשיכון \overline{F} של K , מטיעון דומה להוכחת המסקנה הקודמת. לכן כמות המשכות היא לכל היותר

$$[K : F]_s \leq [K : F(\beta)] \cdot [F(\beta) : F]_s < [K : F(\beta)] \cdot [F(\beta) : F] = [K : F]$$

\square

בסתירה.

מסקנה 6.17. אם K/F ו- L/K הרחבות סופיות וספרביליות, אז גם L/F ספרבילית.

7 תרגול שביעי

7.1 חבורת גלואה

הגדרה 7.1. אוטומורפיזם של הרחבת שדות K/F הוא אוטומורפיזם $\varphi : K \rightarrow K$ המקבע את איברי F . כלומר $\varphi(a) = a$ לכל $a \in F$. באופן שקול, זו העתקה לינארית של מרחבים וקטוריים מעל F .

דוגמה 7.2. כל אנדומורפיזם $\varphi \in \text{End}(K)$ הוא אוטומורפיזם של הרחבה K מעל תת-השדה הראשוני של K .

הגדרה 7.3. תהי K/F הרחבת שדות. חבורת גלואה $\text{Gal}(K/F)$ היא החבורה של כל האוטומורפיזמים של K/F עם פעולת ההרכבה. זו תת-חבורה של $\text{Aut}(K)$. סימונים נוספים עבור $\text{Gal}(K/F)$ הם $G_{K/F}$ ו- $\text{Aut}(K/F)$.

הדבר המרכזי שנעשה בקורס הזה הוא (לנסות) ללמוד הרחבות שדות באמצעות חבורות גלואה.

דוגמה 7.4. תהי F/\mathbb{Q} הרחבת שדות. אז $\text{Gal}(F/\mathbb{Q})$ היא למעשה $\text{Aut}(F)$, לפי דוגמה 7.2. למשל ראינו (כנראה בתורת החוגים) כי $\text{Aut}(\mathbb{Q}(\sqrt{2})) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ולכן זו חבורת גלואה של ההרחבה $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$.

באופן דומה $\text{Gal}(\mathbb{R}/\mathbb{Q}) = \{\text{id}\}$ כי כל אוטומורפיזם של \mathbb{R} מעביר מספר חיובי למספר חיובי (כי $\varphi(a^2) = \varphi(a)^2$), ומכאן שהוא שומר על יחס הסדר ב- \mathbb{R} . לכן כל אוטומורפיזם של \mathbb{R} הוא העתקת הזהות.

תרגיל 7.5 (בהרצאה). יהי $\sigma \in \text{Gal}(K/F)$ ויהי $f(x) \in F[x]$. הוכיחו שלכל שורש $a \in K$ של f , גם $\sigma(a)$ הוא שורש.

פתרו. אם $f(x) = c_0x^n + \dots + c_n$, אז

$$c_0a^n + \dots + c_n = 0$$

מפעילים σ על המשוואה הזו ומקבלים את הדרוש כי σ מקבע את כל המקדמים.

7.2 מבוא לחישוב חבורות גלואה

תרגיל 7.6. חשבו את $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})/\mathbb{Q})$.

פתרו. נסמן $E = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ ונשים לב שזהו שדה הפיצול של $(x^2 - 2)(x^2 - 3)$. כל אוטומורפיזם של E נקבע לחלוטין לפי תמונות $\sqrt{2}$ ו- $\sqrt{3}$. שימו לב כי $\sqrt{2}$ חייב להשלח לשורשים של הפולינום המינימלי שלו $x^2 - 2$ שהם $\pm\sqrt{2}$. הפולינום המינימלי של $\sqrt{3}$ מעל $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ הוא עדין $x^2 - 3$ ולכן $\sqrt{3}$ ישלח ל- $\pm\sqrt{3}$. ישנם ארבעה שורשים שונה אותם עם המספרים

$$1 \leftrightarrow \sqrt{2}, \quad 2 \leftrightarrow -\sqrt{2}, \quad 3 \leftrightarrow \sqrt{3}, \quad 4 \leftrightarrow -\sqrt{3}$$


ונוכל לשכן את $\text{Gal}(E/\mathbb{Q})$ ב- S_4 בעזרת זיהוי זה. ישנן ארבע אפשרויות: האוטומורפיזם $\text{id} \in \text{Gal}(E/\mathbb{Q})$ השולח כל שורש לעצמו. הוא מתאים לתמורת הזהות $\text{id} \in S_4$.

האוטומורפיזם השולח $\sqrt{2} \mapsto -\sqrt{2}$ ו- $\sqrt{3} \mapsto \sqrt{3}$ מתאים לתמורה (1 2).


האוטומורפיזם השולח $\sqrt{2} \mapsto \sqrt{2}$ ו- $\sqrt{3} \mapsto -\sqrt{3}$ מתאים לתמורה (3 4).

האוטומורפיזם השולח $\sqrt{2} \mapsto -\sqrt{2}$ ו- $\sqrt{3} \mapsto -\sqrt{3}$ מתאים לתמורה (1 2)(3 4).

בסך הכל $\text{Gal}(E/\mathbb{Q}) \cong V \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ כאשר V היא חבורת הארבעה של קליין. לצורך חינוכי עתידי נשים לב כי סריג תת-החבורות של החבורה שמצאנו הוא



ואילו סריג תת-השדות של E הוא



תרגיל 7.7. חשבו את $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q})$.

פתרון (בהרצאה). הפולינום המינימלי של $\sqrt[3]{2}$ הוא $x^3 - 2$. יהי $\varphi \in \text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q})$. גם $\varphi(\sqrt[3]{2})$ הוא גם שורש של $x^3 - 2$. אבל $\varphi(\sqrt[3]{2}) = \sqrt[3]{2}$ למה זה שימושי? כעת נשתמש בטענה שכבר הוכחנו בעבר. אם

$$\varphi, \psi: F(a_1, \dots, a_n) \rightarrow F(a_1, \dots, a_n)$$

הם הומומורפיזמים שמסכימים על F ועל האיברים $\{a_1, \dots, a_n\}$, אז $\varphi = \psi$. במונחים החדשים, המשמעות היא ששני איברים בחבורת גלואה של $F(a_1, \dots, a_n)/F$ שמסכימים על $\{a_1, \dots, a_n\}$ הם שווים. במקרה שלנו, מפני ש- $\text{id}(\sqrt[3]{2}) = \sqrt[3]{2}$ נקבל ש- $\varphi = \text{id}$, ולכן $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}) = \{\text{id}\}$ היא החבורה הטריוויאלית.

תרגיל 7.8. חשבו את $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}\rho)/\mathbb{Q})$ כאשר ρ הוא שורש יחידה פרימיטיבי מסדר 3.

פתרון. מפני ש- $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}\rho)$ ו- $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ הן הרחבות איזומורפיות של \mathbb{Q} , אז גם כאן חבורת גלואה היא טריוויאלית.

תרגיל 7.9. חשבו את $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})/\mathbb{Q}(\sqrt{2}))$.

פתרון. הפולינום המינימלי של $\sqrt[4]{2}$ מעל $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ הוא $x^2 - \sqrt{2}$. אם φ בחבורת גלואה, אז לפי מה שראינו קודם $\varphi(\sqrt[4]{2}) = \pm\sqrt[4]{2}$. אם $\varphi(\sqrt[4]{2}) = \sqrt[4]{2}$, אז כבר הסקנו כי $\varphi = \text{id}$ שהוא בוודאי איבר בחבורת גלואה.

עבור האפשרות $\varphi(\sqrt[4]{2}) = -\sqrt[4]{2}$ צריך להזהר! בשלב הזה אנחנו לא יודעים בכלל אם קיימת φ שמקיימת את הנ"ל. השוו לתרגיל הקודם בו גילינו עם שיקול הממשיות שאין φ המקיימת $\varphi(\sqrt[3]{2}) = \sqrt[3]{2}\rho$. מפני שזו בסך הכל הרחבה מסדר 2 אנחנו יודעים שאפשר לכתוב איברים של $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$ בצורה $a + b\sqrt[4]{2}$ כאשר $a, b \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$. אם אכן קיימת φ כזו, אז בהכרח מתקיים

$$\varphi(a + b\sqrt[4]{2}) = a - b\sqrt[4]{2}$$

ניתן לבדוק את כל הדרישות ולראות שזה אכן אוטומורפיזם המקבע את $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$. לכן בחבורת גלואה יש שני איברים בדיוק, ויש רק חבורה אחת (עד כדי איזומורפיזם) בעלת שני איברים והיא $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

כמו שניתן לראות, אפילו בדוגמאות פשוטות לא ממש קל לראות מה היא חבורת גלואה. אנחנו צריכים כלים יותר מתוחכמים. נתחיל ממשוהו שכבר הוכחנו: לפי תרגיל 5.12 אם $g(x) \in F[x]$ פולינום אי פריק עם שדה פיצול E ו- a, b הם שני שורשים של $g(x)$, אז יש איזומורפיזם $f: E \rightarrow E$ שמקבע את איברי F ומקיים $f(a) = b$. בשפה עדכנית קיים $\varphi \in \text{Gal}(E/F)$ כך ש- $\varphi(a) = b$.

עם הטענה הזאת אפשר לפשט את הפתרון של השאלה הקודמת, מפני ש- $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$ הוא שדה הפיצול של $x^2 - \sqrt{2}$. היינו יכולים לדעת מייד שקיים φ כך ש- $\varphi(\sqrt[4]{2}) = -\sqrt[4]{2}$ ולא היה צריך להתאמץ בשביל זה.

אזהרה! שימו לב שמשפט זה (ועוד אחרים שנראה) עובדים רק עבור חבורת גלואה של שדה פיצול. בדוגמה בחישוב $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ אין φ כך ש- $\varphi(\sqrt[3]{2}) = \sqrt[3]{2}\rho$, ובאמת $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ אינו שדה הפיצול של $x^3 - 2$ (בהמשך הקורס נוכיח שהוא לא שדה פיצול של שום פולינום). כלי מועיל נוסף הוא המשפט הבא:

תרגיל 7.10. יהי $f(x) \in F[x]$ פולינום עם שדה פיצול E . נניח שהשורשים של f ב- E הם a_1, \dots, a_n . הוכיחו כי $\text{Gal}(E/F)$ משוכנת בתוך S_n .

פתרון (בהרצאה). תהי $\varphi \in \text{Gal}(E/F)$. כבר ראינו שלכל i מתקיים

$$\varphi(a_i) \in \{a_1, \dots, a_n\}$$

ולכן הצמצום של φ ל- $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ הוא פונקציה המוגדרת היטב. מפני ש- φ חד-חד ערכית, גם הצמצום שלה חד-חד ערכי. לכן יש לנו איבר של $S_n \cong S_A$, שנסמן אותו π_φ . כעת נותר להוכיח כי ההתאמה

$$\begin{aligned} \Phi: \text{Gal}(E/F) &\rightarrow S_A \\ \varphi &\mapsto \pi_\varphi \end{aligned}$$

היא שיכון של חבורות. ראשית נשים לב שאם $\Phi(\varphi) = \pi_\varphi = \pi_{\varphi'} = \Phi(\varphi')$ אז φ ו- φ' מסכימים על כל שורשי הפולינום וראינו כבר ש- $\varphi = \varphi'$. כלומר Φ היא אכן חד-חד ערכית. נותר לבדוק שהיא הומומורפיזם, נשים לב כי

$$\Phi(\varphi\varphi') = \Phi(\varphi)\Phi(\varphi') = \pi_\varphi\pi_{\varphi'} = \pi_{\varphi\varphi'}$$

וקל לראות שמתקיים $\pi_\varphi\pi_{\varphi'} = \pi_{\varphi\varphi'}$. לא במקרה זה מזכיר את השיכון ממשפט קיילי. הערה 7.11. את הטענה האחרונה אפשר לנסח גם בצורה הבאה: חבורת גלואה פועלת על קבוצת השורשים של $f(x)$. כל פעולה של חבורה על קבוצה מגדירה הומומורפיזם לחבורה סימטרית. הפעולה נאמנה ולכן מדובר בשיכון.

אם ל- $f(x)$ יש פירוק $f = f_1 f_2 \dots f_r$ ונסמן $K = F[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$ כאשר α_i הם כל השורשים של $f(x)$. כל אוטומורפיזם $\sigma \in \text{Gal}(K/F)$ משרה תמורה על השורשים ויש שיכון

$$\text{Gal}(K/F) \hookrightarrow S_{\deg f_1} \times S_{\deg f_2} \times \dots \times S_{\deg f_r}$$

עכשיו נתחיל להשתמש בכלים שראינו ונפתור מקרה יותר מסובך.

תרגיל 7.12. חשבו את $\text{Gal}(E/\mathbb{Q})$ כאשר E הוא שדה הפיצול של הפולינום $x^3 - 2$.

פתרון (בהרצאה). ראשית נשים לב ששורשי הפולינום הם $\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2}\rho, \sqrt[3]{2}\rho^2$ כאשר ρ שורש יחידה פרימיטיבי מסדר 3. לכן חבורת גלואה היא תת-חבורה של S_3 , וזה מידע משמעותי. קל לזהות שני איברים של חבורת גלואה: ברור שהעתקת הזהות id שם, וכך גם ההצמדה המרוכבת $z \mapsto \bar{z}$ הוא אוטומורפיזם של E (ששונה מ-id) ומקבע את \mathbb{Q} . נתבונן כיצד הצמדה פועלת על השורשים:

$$\sqrt[3]{2} \rightarrow \sqrt[3]{2}, \quad \sqrt[3]{2}\rho \rightarrow \sqrt[3]{2}\rho^2, \quad \sqrt[3]{2}\rho^2 \rightarrow \sqrt[3]{2}\rho$$

לכן היא מתאימה לתמורה $(2\ 3) \in S_3$ כאשר זיהינו את השורשים עם 1, 2, 3. עכשיו נשים לב כי

$$E = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \rho)$$

ולכן איברי החבורה נקבעים לפי התמונה שלהם ב- $\sqrt[3]{2}, \rho$. לפי משפט קודם, קיים אוטומורפיזם $\varphi \in \text{Gal}(E/\mathbb{Q})$ המקיים

$$\varphi(\sqrt[3]{2}) = \sqrt[3]{2}\rho$$

אבל לא ברור כל כך מה עושה לשאר השורשים. נשים לב שהפולינום המינימלי של ρ הוא $x^2 + x + 1$ והשורשים שלו הם ρ, ρ^2 . לכן $\varphi(\rho) \in \{\rho, \rho^2\}$. נבדוק את שתי האפשרויות: אם $\varphi(\rho) = \rho$, אז התמורה ש- φ מבצעת על השורשים היא (1, 2). כך שבחבורת גלואה יש גם את (1 2) וגם את (2 3) אבל שתי התמורות האלה יוצרות את כל S_3 ולכן $\text{Gal}(E/\mathbb{Q}) \cong S_3$.

אם דווקא $\varphi(\rho) = \rho^2$ אז התמורה על השורשים יוצאת (1 2 3). שוב, התמורות (2 3), (1 2 3) יוצרות את כל S_3 ולכן גם באפשרות הזאת $\text{Gal}(E/\mathbb{Q}) \cong S_3$. נעיר שחבורת גלואה באמת מכילה את שתי האפשרויות שבחנו, אבל זה לא כל כך ברור. עצם העובדה ש- ρ, ρ^2 הם שורשים של פולינום לא מכריח שתהיה φ שמקיימת $\varphi(\sqrt[3]{2}) = \sqrt[3]{2}\rho$ וגם $\varphi(\rho) = \rho$ או $\varphi(\rho) = \rho^2$.

8 תרגול שמיני

8.1 הרחבות נורמליות והרחבות גלואה

נמשיך עם תרגילים הנוגעים לחישוב חבורת גלואה. אבל קודם נזכיר כלים נוספים שראיתם בהרצאה.

טענה 8.1. לכל הרחבה סופית K/F מתקיים $|\text{Gal}(K/F)| \leq [K : F]$.

Normal

תזכורת 8.2. הרחבת שדות K/F נקראת **נורמלית** אם K הוא שדה פיצול של פולינום כלשהו ב- F . באופן שקול, לכל $a \in K$ הפולינום המינימלי מעל F מתפצל ב- K (ולכן כל השורשים שלו שייכים ל- K).

דוגמה 8.3. $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ היא דוגמה קלאסית להרחבה ספרבילית ולא נורמלית כי לא כל השורשים של $x^3 - 2$ שייכים ב- $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$. לעומת זאת $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ נורמלית וספרבילית כי $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ הוא שדה הפיצול של $x^2 - 2$.
ההרחבה $\mathbb{F}_p(t)/\mathbb{F}_p(t^p)$ היא נורמלית כי t הוא השורש (היחיד) של $x^p - t^p$ שבמאפיין p שווה ל- $(x - t)^p$. בדוגמה 6.9 ראינו שזו הרחבה לא ספרבילית.

Galois extension

תזכורת 8.4. הרחבת שדות K/F נקראת **הרחבת גלואה** אם היא נורמלית וספרבילית. זה שקול לכך ש- K הוא שדה פיצול של פולינום ספרבילי מעל F . מה שטוב בהרחבות גלואה זה ש- K/F הרחבת גלואה אם ורק אם

$$|\text{Gal}(K/F)| = [K : F]$$

דוגמה 8.5. נחשב שוב את $\text{Gal}(E/\mathbb{Q})$ כאשר E הוא שדה הפיצול של הפולינום $x^3 - 2$. ראשית נשים לב ששורשי הפולינום הם $\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2}\rho, \sqrt[3]{2}\rho^2$ כאשר ρ שורש יחידה פרימיטיבי מסדר 3. לכן חבורת גלואה היא (איזומורפית ל)תת-חבורה של S_3 . בנוסף זאת הרחבת גלואה וקל לבדוק כי $[E : \mathbb{Q}] = 6$. לכן חבורת גלואה היא מסדר 6 ובהכרח היא S_3 .

תרגיל 8.6. יהי $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ פולינום אי פריק ממעלה p ראשוני, עם $p - 2$ שורשים ממשיים ו-2 שורשים מרוכבים שאינם ממשיים (שורשים אלה בהכרח צמודים). יהי E שדה הפיצול שלו. הוכיחו כי

$$\text{Gal}(E/F) \cong S_p$$

פתרון. כבר ראינו שחבורת גלואה משוכנת בתוך S_p . בנוסף ברור כי

$$p \mid [E : \mathbb{Q}] = |\text{Gal}(E/\mathbb{Q})|$$

לפי משפט קושי זה אומר שיש בחבורת גלואה איבר σ מסדר p . איבר כזה חייב להיות מחזור באורך p . כמו כן, הצמדה מרוכבת היא איבר בחבורת גלואה. היא מחליפה בין שני השורשים המרוכבים ומקבעת את השאר. לכן השיכון ל- S_p שולח אותה לחילוף. ניתן להניח, אחרי תמורה על האינדקסים, כי החילוף הוא (1 2). בחזקה מתאימה של המחזור σ נקבל $\sigma^k(1) = 2$. על ידי שינוי שאר האינדקסים אפשר להניח כי המחזור הוא (1 2 ... p). כלומר חילוף ומחזור באורך p יוצרים את כל S_p ולכן $\text{Gal}(E/F) \cong S_p$.

תרגיל 8.7. יהי $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ פולינום אי פריק ויהי E/\mathbb{Q} שדה הפיצול שלו. הוכיחו שאם $\text{Gal}(E/\mathbb{Q}) \cong Q_8$, אז בהכרח $\deg f(x) \geq 8$.

פתרון. אם $\deg f(x) < 8$, אז $\text{Gal}(E/\mathbb{Q})$ משוכנת ב- S_n עבור $n < 8$. בתרגיל בית בתורת החבורות הראנו שאין שיכון כזה של Q_8 בעזרת פעולה של חבורה. נוכיח זאת שוב למקרה הפרטי הנוכחי.

נניח בשלילה כי Q_8 איזומורפית לתת-חבורה של S_7 (זה מכסה גם את המקרים של S_6, \dots, S_2). אזי היא פועלת על הקבוצה $X = \{1, \dots, 7\}$. יהי $x \in X$. אז

$$[Q_8 : \text{stab}(x)] = \frac{|Q_8|}{|\text{stab}(x)|} = |\text{orb}(x)| \leq 7$$

ולכן $|\text{stab}(x)| > 1$. נזכר שכל תת-חבורה לא טריוויאלית של Q_8 מכילה את -1 ולכן $-1 \in \text{stab}(x)$ לכל $x \in X$. כלומר -1 פועל בצורה טריוויאלית על X , וזו סתירה כי הפעולה של S_7 על X היא נאמנה (אין איבר לא טריוויאלי שפועל טריוויאלית). משפט קיילי מספק שיכון של Q_8 -ל- S_8 .

תרגיל 8.8 (לבית). נביט בהרחבה $F \subseteq K \subseteq E$ ונניח כי E/F נורמלית. האם K/F נורמלית? האם E/K נורמלית?

תרגיל 8.9. מצאו הרחבה E/\mathbb{Q} כך שחבורת גלואה שלה היא $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

תרגיל 8.10. שימוש לחבורת גלואה: תהי K/F הרחבת גלואה עם חבורת גלואה G . ויהי $a \in K$ נסמן

$$\text{orb}(a) = \{\varphi(a) \mid \varphi \in G\}$$

שהוא המסלול של a תחת הפעולה של חבורת גלואה (הנקודה היא שזו קבוצה ולכן אין חזרות). הוכיחו כי הפולינום המינימלי של a הוא

$$m_a(x) = \prod_{b \in \text{orb}(a)} (x - b)$$

פתרון. מצד אחד $\varphi(a)$ תמיד שורש של הפולינום המינימלי של a ולכן

$$\prod_{b \in \text{orb}(a)} (x - b) \mid m_a$$

כמו כן נזכר כי m_a ספרבילי ולכן אין לו שורשים כפולים. כעת נשאר להוכיח שאין ל- m_a שורשים נוספים. נשים לב ש- K מפצל את m_a ולכן לכל שורש c של m_a יש $\varphi \in G$ כך ש- $\varphi(a) = c$ (טרנזיטיביות על השורשים של פולינום אי פריק וכו'). לכן כל שורש c של m_a שייך ל- $\text{orb}(a)$.

מסקנה 8.11. מתקיים $[F[a] : F] = \deg m_a = |\text{orb}(a)|$.

תרגיל 8.12. נביט על ההרחבה $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})/\mathbb{Q}$. מצאו את הפולינום המינימלי של $a = \sqrt{2} - 3\sqrt{3} + 2\sqrt{6}$ (לפחות כפירוק לשורשים) ואת $[\mathbb{Q}[a] : \mathbb{Q}]$.

פתרון. נשתמש במשפט הקודם. נזכר שחבורת גלואה של ההרחבה היא $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. נסמן את האיברים שלה $\{\text{id}, \theta, \tau, \theta\tau\}$ כאשר

$$\begin{aligned} \theta(\sqrt{2}) &= -\sqrt{2}, & \theta(\sqrt{3}) &= \sqrt{3} \\ \tau(\sqrt{2}) &= \sqrt{2}, & \tau(\sqrt{3}) &= -\sqrt{3} \end{aligned}$$

נמצא את המסלול של a :

$$\begin{aligned} \text{id}(a) &= \sqrt{2} - 3\sqrt{3} + 2\sqrt{6} \\ \theta(a) &= -\sqrt{2} - 3\sqrt{3} - 2\sqrt{6} \\ \tau(a) &= \sqrt{2} + 3\sqrt{3} - 2\sqrt{6} \\ \theta\tau(a) &= -\sqrt{2} + 3\sqrt{3} + 2\sqrt{6} \end{aligned}$$

הם כולם שונים כי כזכור $1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}$ הוא בסיס עבור המרחב הוקטורי $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ מעל \mathbb{Q} . לכן הפולינום המינימלי הוא

$$(x - a)(x - \theta(a))(x - \tau(a))(x - \theta\tau(a)) = x^4 - 106x^2 + 288x - 191$$

שמעלתו היא כצפוי $[\mathbb{Q}[a] : \mathbb{Q}] = 4$.

הערה 8.13. שווה לציין את הנקודה הבאה: נניח נרצה לדעת מהו הפולינום המינימלי של $\sqrt{6}$ על פי השיטה לעיל. היינו מגלים כי $\text{orb}(\sqrt{6}) = \{\sqrt{6}, -\sqrt{6}\}$, ולכן הפולינום המינימלי הוא $x^2 - 6$ כפי שאנחנו כבר יודעים.

9 תרגול תשיעי

תרגיל 9.1. חשבו במפורש את $\text{Gal}(E/\mathbb{Q})$ כאשר E הוא שדה הפיצול של הפולינום $f(x) = x^4 - 4x^2 - 1$.

פתרון. ראינו בתרגיל 5.1 שהשורשים של $f(x)$ הם $\sqrt{2 + \sqrt{5}}, -\sqrt{2 + \sqrt{5}}, \sqrt{2 - \sqrt{5}}, -\sqrt{2 - \sqrt{5}}$ וכי $E = \mathbb{Q}(\sqrt{2 + \sqrt{5}}, \sqrt{2 - \sqrt{5}})$. ניתן שמות לשורשים

$$1 \leftrightarrow \sqrt{2 + \sqrt{5}}, \quad 2 \leftrightarrow -\sqrt{2 + \sqrt{5}}, \quad 3 \leftrightarrow \sqrt{2 - \sqrt{5}}, \quad 4 \leftrightarrow -\sqrt{2 - \sqrt{5}}$$

כמו כן ראינו כי $[E : \mathbb{Q}] = 8$. כיוון ש- f ספרבילי מעל \mathbb{Q} , בהכרח $|\text{Gal}(E/\mathbb{Q})| = 8$. נחשב את חבורת גלואה באופן מפורש. כל אוטומורפיזם של E/\mathbb{Q} נקבע על סמך התמונות של היוצרים $\sqrt{2 \pm \sqrt{5}}$. נתאר את החבורה בטבלה:

אוטומורפיזם	תמונת $\sqrt{2 + \sqrt{5}}$	תמונת $\sqrt{2 - \sqrt{5}}$	התמורה על השורשים

בעמודה הראשונה ניתן שם לאוטומורפיזם, בשתי העמודות הבאות נכתוב מי התמונה של כל יוצר, ובעמודה האחרונה נכתוב את התיאור של האוטומורפיזם כתמורה על השורשים.

הטבלה שתקבל (הסברים לאחר מכן):

אוטומורפיזם	תמונת $\sqrt{2 + \sqrt{5}}$	תמונת $\sqrt{2 - \sqrt{5}}$	התמורה על השורשים
id	$\sqrt{2 + \sqrt{5}}$	$\sqrt{2 - \sqrt{5}}$	id
σ_1	$\sqrt{2 + \sqrt{5}}$	$-\sqrt{2 - \sqrt{5}}$	(3 4)
σ_2	$-\sqrt{2 + \sqrt{5}}$	$\sqrt{2 - \sqrt{5}}$	(1 2)
$\sigma_3 = \sigma_1\sigma_2$	$-\sqrt{2 + \sqrt{5}}$	$-\sqrt{2 - \sqrt{5}}$	(1 2)(3 4)
σ_4	$\sqrt{2 - \sqrt{5}}$	$\sqrt{2 + \sqrt{5}}$	(1 3)(2 4)
σ_5	$\sqrt{2 - \sqrt{5}}$	$-\sqrt{2 + \sqrt{5}}$	(1 3 2 4)
σ_6	$-\sqrt{2 - \sqrt{5}}$	$\sqrt{2 + \sqrt{5}}$	(1 4 2 3)
σ_7	$-\sqrt{2 - \sqrt{5}}$	$-\sqrt{2 + \sqrt{5}}$	(1 4)(2 3)

כל אוטומורפיזם של E/\mathbb{Q} שולח כל שורש של f לשורש של f . כיוון ש- f אי-פריק, הפעולה הזו טרנזיטיבית; לכן בכל פעם נוכל לשאול מי כל האוטומורפיזמים ששולחים שורש אחד לשורש אחר.

נתחיל מלחפש את האוטומורפיזמים של E/\mathbb{Q} ששולחים את $\sqrt{2+\sqrt{5}}$ לעצמו. אם σ אוטומורפיזם כזה, אז σ הוא המשכה של השיכון $\text{id} : \mathbb{Q}(\sqrt{2+\sqrt{5}}) \rightarrow E$ לאוטומורפיזם $E \rightarrow E$. ראינו הפולינום המינימלי של $\sqrt{2-\sqrt{5}}$ מעל $\mathbb{Q}(\sqrt{2+\sqrt{5}})$ הוא $g(x) = x^2 - (2-\sqrt{5})$, והשורשים שלו הם $\pm\sqrt{2-\sqrt{5}}$; לכן $\sigma(\sqrt{2-\sqrt{5}})$ יכול להיות כל אחד משני השורשים האלו. כלומר יש שתי המשכות של שיכון הזהות, id ו- σ_1 , לאוטומורפיזם של E/\mathbb{Q} . אלו שתי השורות הראשונות בטבלה (σ_1) הוא אוטומורפיזם (ההצמדה).

נחפש אוטומורפיזמים של E/\mathbb{Q} ששולחים $\sqrt{2+\sqrt{5}} \mapsto -\sqrt{2+\sqrt{5}}$. נסמן על ידי $\tau : \mathbb{Q}(\sqrt{2+\sqrt{5}}) \rightarrow E$ את השיכון המקיים זאת. כמות ההמשכות שלו לאוטומורפיזם $E \rightarrow E$ היא לפי כמות השורשים של $\tau(g)$:

$$\begin{aligned}\tau(g(x)) &= \tau(x^2 - (2 - \sqrt{5})) = x^2 - \tau(4 - (\sqrt{2 + \sqrt{5}})^2) = \\ &= x^2 - 4 + \tau(\sqrt{2 + \sqrt{5}})^2 = x^2 - 4 + 2 + \sqrt{5} = g(x)\end{aligned}$$

לכן גם ל- τ יש שתי המשכות לאוטומורפיזם $E \rightarrow E$, כאשר $\sqrt{2-\sqrt{5}}$ יכול להישלח לעצמו או לנגדי שלו. אלו השורות השלישית והרביעית בטבלה. נעבור לחישוב האוטומורפיזמים של E/\mathbb{Q} ששולחים $\sqrt{2+\sqrt{5}} \mapsto \sqrt{2-\sqrt{5}}$. אם τ' אוטומורפיזם כזה, יכול להישלח לשורשים של הפולינום


$$\begin{aligned}\tau'(g(x)) &= \tau'(x^2 - (2 - \sqrt{5})) = x^2 - \tau'(4 - (\sqrt{2 + \sqrt{5}})^2) = \\ &= x^2 - 4 + \tau'(\sqrt{2 + \sqrt{5}})^2 = x^2 - 4 + 2 - \sqrt{5} = x^2 - (2 + \sqrt{5})\end{aligned}$$

לכן יש ל- τ' שתי המשכות גם כן, שמתאימות לשורות החמישית והשישית בטבלה. את שתי השורות האחרונות ניתן להשיג באותו האופן, או כהרכבה של אוטומורפיזמים נתונים.

קעת ניתן לשים לב כי

$$\text{Gal}(E/\mathbb{Q}) = \langle \sigma_1, \sigma_5 \rangle \cong D_4$$

סריג תת-החבורות של D_4 הוא



באמצעות התאמת גלואה, אפשר למצוא באמצעות הסריג הזה את סריג שדות הביניים של ההרחבה E/\mathbb{Q} .

תרגיל 9.2. ידוע כי $i \in E$ כיו $\sqrt{-1} = \sqrt{2 + \sqrt{5}} \cdot \sqrt{2 - \sqrt{5}}$. חשבו את $\text{Gal}(E/\mathbb{Q}(i))$.

פתרון. ראשית, $\text{Gal}(E/\mathbb{Q}(i)) \leq \text{Gal}(E/\mathbb{Q})$, כי כל אוטומורפיזם של E שמקבע את $\mathbb{Q}(i)$ בפרט מקבע גם את \mathbb{Q} . לכן $\text{Gal}(E/\mathbb{Q}(i))$ מכילה את כל האיברים של $\text{Gal}(E/\mathbb{Q})$ שמקבעים את i . אפשר לעבור איבר-איבר ולגלות כי

$$\text{Gal}(E/\mathbb{Q}(i)) = \{id, \sigma_3, \sigma_4, \sigma_7\} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

10 תרגול עשירי

10.1 התאמת גלואה

בהנתן שדה K ותת-שדה שלו F הגדרנו את חבורת גלואה $\text{Gal}(K/F)$. אפשר גם ללכת בכיוון ההפוך:

הגדרה 10.1. יהי K שדה, ותהי G חבורה של אוטומורפיזמים של K . תת-השדה

$$K^G = \{a \in K \mid \forall \sigma \in G : \sigma(a) = a\}$$

נקרא שדה השבת של G .

Fixed field

10.2 הערה. שתי ההעתקות האלו הופכות סדר: אם $F \subseteq L \subseteq K$, אז $\text{Gal}(K/L) \leq \text{Gal}(K/F)$. כמו כן אם $H \leq G$, אז $K^G \subseteq K^H$. בהרצאה תלמדו מה קורה כשממשיכים להפעיל את ההעתקות האלו יותר מפעם אחת.

תרגיל 10.3. תהי E/F הרחבת שדות עם חבורת גלואה $G = \text{Gal}(E/F)$. תהי תת-חבורה $H \leq G$ הנוצרת על ידי $\varphi_1, \dots, \varphi_k$. הוכיחו כי $E^H = E^{\{\varphi_1, \dots, \varphi_k\}}$.

פתרון. ההכלה $E^H \subseteq E^{\{\varphi_1, \dots, \varphi_k\}}$ טריויאלית. מצד שני ברור שאברים המקובעים על ידי $\{\varphi_1, \dots, \varphi_k\}$ מקובעים גם על ידי כל דבר שהם יוצרים, ולכן $E^H = E^{\{\varphi_1, \dots, \varphi_k\}}$, כנדרש.

סעיף 10.4. תהי E/F הרחבת שדות. התנאים הבאים שקולים:

1. E/F הרחבת גלואה (כלומר נורמלית וספרבילית).

2. E/F שדה פיצול של פולינום ספרבילי.

3. $E^{\text{Gal}(E/F)} = F$.

4. $E^H = F$ עבור תת-חבורה $H \leq \text{Aut}(E)$ סופית.

5. $|\text{Gal}(E/F)| = [E : F]$.

Fundamental
theorem of
Galois theory

10.5. הערה. המשפט שהוא כנראה הכי חשוב בקורס, המשפט היסודי של תורת גלואה: תהי E/F הרחבת גלואה. יש אנטי-איזומורפיזם של סריגים בין סריג תת-החבורות של $\text{Gal}(E/F)$ לבין סריג תת-השדות של E/F . בהינתן שדה ביניים L החבורה המתאימה היא $\text{Gal}(E/L)$, ובהינתן תת-חבורה $H \leq G$ תת-שדה המתאים הוא E^H .

Galois
correspondence

התאמת גלואה מגיעה עם לא מעט מסקנות: הסדרים והאינדקסים מתאימים, כלומר $|H| = [E : E^H]$ וגם $[E : L] = |\text{Gal}(E/L)|$. ההרחבה L/F היא גלואה אם ורק אם $\text{Gal}(E/L)$ נורמלית, ובנוסף

$$\text{Gal}(E/F) / \text{Gal}(E/L) \cong \text{Gal}(L/F)$$

ובפרט כל אוטומורפיזם של L/F ניתן להמשיך לאוטומורפיזם של E/F .

10.2 העתקת הצמצום

10.6. תזכורת. אם $F \subseteq K, L \subseteq E$, אז הקומפוזיטוס של K ו- L הוא תת-השדה המינימלי שמכיל את K, L ומסומן בדרך כלל LK או $L \vee K$. אם $K = F[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$, אז $L \vee K = L[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$.

10.7. הגדרה. תהי E/F הרחבת גלואה ו- $F \subseteq K \subseteq E$ שדה ביניים כך שהרחבה K/F גם היא גלואה. אז העתקת הצמצום

Restriction

$$\begin{aligned} \text{res}_K^E: \text{Gal}(E/F) &\rightarrow \text{Gal}(K/F) \\ \sigma &\mapsto \sigma|_K \end{aligned}$$

היא הומומורפיזם של חבורות. החידוש הוא בכך שהצמצום מוגדר היטב (זה שהוא הומומורפיזם זה ברור).

10.8. תרגיל. תהינה K/F ו- L/F הרחבות סופיות, ונניח K/F גלואה. הוכיחו:

1. $L \vee K/L$ הרחבת גלואה.

2. ישנו שיכון $\varphi: \text{Gal}(L \vee K/L) \rightarrow \text{Gal}(K/F)$ לפי $\varphi(\sigma) = \sigma|_K$.

3. $\text{Gal}(L \vee K/L) \cong \text{Gal}(K/F)$ אם $K \cap L = F$, ואם $\text{Im } \varphi = \text{Gal}(K/K \cap L)$.

פתרון. למעשה ראינו חלק מהוכחות תרגיל זה בעבר.

1. בתרגיל בית הוכחתם שאם K/F שדה פיצול של פולינום ספרבילי $f(x)$, אז $L \vee K = L[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$ שדה פיצול של אותו פולינום. בפירוט: אפשר לסמן $K = F[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$. ברור כי $L \subseteq L \vee K$ ובנוסף $L \subseteq L \vee K$ לכל i , ולכן $L[\alpha_1, \dots, \alpha_n] \subseteq L \vee K$. מצד שני $L \vee K = L[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$ לכן $L, K \subseteq L[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$. כלומר $L \vee K$ הוא שדה פיצול של פולינום ספרבילי מעל L , ולכן זו הרחבת גלואה.

2. נתון כי K/F גלואה, ובפרט נורמלית. ראינו כי הצמצום מוגדר היטב במקרה כזה ולכן לכל $\sigma \in \text{Gal}(L \vee K/L)$ נקבל $\sigma|_K \in \text{Gal}(K/F)$. בפרט לכל $\sigma|_K \in \text{Gal}(K/F)$ מתקיים $\sigma \in \text{Gal}(L \vee K/L) \subseteq \text{Gal}(L \vee K/F)$ מוגדר היטב. נבדוק שזהו שיכון.

תחילה נבדוק כי φ הומומורפיזם. לכל $\sigma_1, \sigma_2 \in \text{Gal}(L \vee K/L)$ מתקיים

$$\varphi(\sigma_1 \sigma_2) = (\sigma_1 \sigma_2)|_K \stackrel{(*)}{=} \sigma_1|_K \circ \sigma_2|_K = \varphi(\sigma_1) \varphi(\sigma_2)$$

כאשר המעבר (*) נובע מכך ש- $K = \sigma_2(K)$. כדי לבדוק ש- φ ח"ע נמצא את הגרעין

$$\text{Ker } \varphi = \{\sigma \in \text{Gal}(L \vee K/L) \mid \varphi(\sigma) = \text{id}_K\}$$

כלומר $\sigma \in \text{Ker } \varphi$ אם ורק אם $\varphi(\sigma) = \sigma|_K$ משמר את איברי K ונרצה להראות כי σ משמר את L . אבל σ משמר את K כי $\sigma|_K = \text{id}_K$ ומשמר את L כי $\sigma \in \text{Gal}(L \vee K/L)$. לכן σ משמר את $L \vee K$. מכאן שהגרעין טריוויאלי.

3. נשים לב שמתקיים

$$\begin{aligned} K^{\text{Im } \varphi} &= \{k \in K \mid \forall \sigma \in \text{Gal}(L \vee K/L), (\varphi(\sigma))(k) = k\} \\ &= \{k \in K \mid \forall \sigma \in \text{Gal}(L \vee K/L), \sigma|_K(k) = k\} \end{aligned}$$

ולכן $K^{\text{Im } \varphi} = K \cap (L \vee K)^{\text{Gal}(L \vee K/L)} = K \cap L$ כלומר $\text{Im } \varphi = K \cap L$. בנוסף, אם $K \cap L = F$ נקבל איזומורפיזם $\text{Gal}(L \vee K/L) \cong \text{Gal}(K/F)$.

מסקנה 10.9. מהתאמת גלואה נקבל

$$[L \vee K : F] = \frac{[K : F][L : F]}{[K \cap L : F]}$$

10.3 סגור גלואה

Galois closure

10.10 הגדרה תהי K/F הרחבת שדות ספרבילית סופית. סגור גלואה (זה גם הסגור הנורמלי) שלה הוא הרחבת השדות E/F המינימלית שהיא גלואה ומכילה את K .

10.11 הערה אם K/F גלואה, אז בוודאי שסגור גלואה הוא $E = K$. אחרת, נסמן $K = F[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$ וכדי למצוא את סגור גלואה נספח ל- K את כל שורשי הפולינומים המינימליים של $\alpha_1, \dots, \alpha_n$. מכאן שסגור גלואה קיים, והוא יחיד עד כדי איזומורפיזם.

10.12 תרגיל מצאו את סגור גלואה של $\mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}]/\mathbb{Q}$.

פתרון. ראינו כבר שהרחבה הזו אינה נורמלית. הפולינום המינימלי של $\sqrt[3]{2}$ הוא $x^3 - 2$. אזי סגור גלואה יהיה

$$E = \mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2}\rho, \sqrt[3]{2}\rho^2] = \mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}, \rho]$$

כאשר ρ הוא שורש יחידה פרימיטיבי מסדר 3.

10.13 תרגיל מצאו את סגור גלואה של $\mathbb{Q}[\sqrt[3]{5}, \sqrt[3]{7}]/\mathbb{Q}$.

פתרון. גם ההרחבה הזו אינה נורמלית, בדומה לתרגיל הקודם. הפולינום המינימלי של $\sqrt[3]{5}$ הוא $x^3 - 5$ ושניים משורשיו מרוכבים למרות שההרחבה ממשית. שוב נסמן ב- ρ שורש יחידה פרימיטיבי מסדר 3, ונקבל שסגור גלואה המבוקש הוא

$$E = \mathbb{Q}[\sqrt[3]{5}, \sqrt[3]{5}\rho, \sqrt[3]{5}\rho^2, \sqrt[3]{7}, \sqrt[3]{7}\rho, \sqrt[3]{7}\rho^2] = \mathbb{Q}[\sqrt[3]{5}, \sqrt[3]{7}, \rho]$$

11 תרגול אחד עשר

11.1 פולינומים ציקלוטומיים

Cyclotomic polynomial

11.1 הגדרה הפולינום הציקלוטומי ה- n הוא הפולינום המינימלי של שורש יחידה מסדר n מעל \mathbb{Q} .

שם התואר ציקלוטומי מקורו ביוונית ופירושו "חותך מעגל". משה ירדן מציע במילונו את התרגום פולינום חִשְׁרוּרִי (נגזר מחשור, שהוא מוט המתבר מרכז אופן לחישוקו).

11.2 הערה הפולינומים הציקלוטומיים מקיימים את הנוסחה הרקורסיבית

$$\prod_{d|n} \Phi_d(x) = x^n - 1$$

Cyclotomic field

מעלת הפולינום היא $\deg \Phi_n = \varphi(n)$ כאשר φ היא פונקציית אוילר. יהי ρ_n שורש יחידה פרימיטיבי מסדר n . בהרצאה כבר הגדרתם את השדה הציקלוטומי $\mathbb{Q}(\rho_n)$ והוכחתם כי $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\rho_n)/\mathbb{Q}) \cong U_n$.

דוגמה 11.3. נחשב כמה מהפולינומים הציקלוטומיים הראשונים:

$$\Phi_1(x) = x - 1$$

$$\Phi_2(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1$$

$$\Phi_3(x) = \frac{x^3 - 1}{x - 1} = x^2 + x + 1$$

$$\Phi_4(x) = \frac{x^4 - 1}{\Phi_1(x)\Phi_2(x)} = \frac{x^4 - 1}{(x - 1)(x + 1)} = x^2 + 1$$

דוגמה 11.4. יהי p ראשוני. כבר ראינו בדוגמה 4.6 כי

$$\Phi_p(x) = x^{p-1} + x^{p-2} + \dots + x + 1$$

תרגיל 11.5. חשבו את Φ_{15} .

פתרון.

תרגיל 11.6. חשבו את Φ_{16} .

פתרון.

הערה 11.7. בחוג $\mathbb{Q}[x]$, לכל n מתקיים $\prod_{k=0}^{n-1} (x - \rho_n^k) = x^n - 1$, כי אלו שני פולינומים מתוקנים מאותה מעלה ועם אותם שורשים. השורשים של $\Phi_n(x)$ הם ρ_n^k כאשר $k < n$ טבעי וזר ל- n , ואלו בדיוק כל שורשי היחידה הפרימיטיביים מסדר n . בהרצאה ראינו כי $\Phi_n(x) \in \mathbb{Z}[x]$ ושהוא אי פריק מעל \mathbb{Q} . לכן ניתן להתבונן ב- $\Phi_n(x)$ מעל שדה סופי, שם הוא לעיתים פריק. למשל מעל השדה $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$:

$$\Phi_7(x) = x^6 + \dots + x + 1 = (x^3 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1)$$

תרגיל 11.8. תהי E/\mathbb{Q} הרחבת גלואה סופית, שלא מכילה שדות ביניים שהם הרחבות אבילות (כלומר שחבורות גלואה שלהם הן אבילות). הוכיחו כי

$$\text{Gal}(E[\rho_n]/E) \cong U_n$$

פתרון.

תרגיל 11.9 (ממבחן). יהי $K = \mathbb{Q}(\rho_9)$ השדה הציקלוטומי התשיעי.

1. חשבו את $[K : \mathbb{Q}]$ ומצאו את $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$.

2. חשבו את $[K : \mathbb{Q}(\rho_9 + \rho_9^{-1})]$.

3. מצאו את הפולינום המינימלי של $\rho_9 + \rho_9^{-1}$.

פתרון.

תרגיל 11.10.