

## תרגיל 2

13 במרץ 2018

1. מצאו את הפתרונות הכלליים של המשוואות הבאות:

$$\begin{aligned} \text{(א)} \quad & y' = \frac{y}{x} \\ & \text{פתרון:} \\ & y' - \frac{1}{x}y = 0 \\ & a(x) = -\frac{1}{x} \quad \text{נסמן} \\ & A(x) = \int -\frac{1}{x} dx = -\ln x \quad \text{אי} \\ & y = ce^{\ln x} = ce^{\ln x} = cx \quad \text{והפתרון הוא:} \\ & \text{(ב)} \quad y' = (x+1)y \\ & \text{פתרון:} \\ & y' - (x+1)y = 0 \\ & a(x) = -x-1 \quad \text{נסמן} \\ & A(x) = -\frac{x^2}{2} - x \quad \text{אי} \\ & y = ce^{\frac{x^2}{2} + x} \quad \text{והפתרון הוא:} \end{aligned}$$

2. מצאו את הפתרונות הכלליים של המשוואות הבאות: (שים לב, באחד התרגילים יופיע אינטגרל שלא ניתן לבטאו באמצעות פונקציות אלמנטריות, ולכן עליכם להשאיר את התשובה עם האינטגרל)

$$\begin{aligned} \text{(א)} \quad & y' = \frac{y}{x} + 1 \\ & \text{פתרון:} \\ & y' - \frac{1}{x}y = 1 \\ & a(x) = -\frac{1}{x}, b(x) = 1 \quad \text{נסמן:} \\ & A(x) = -\ln x \quad \text{אי:} \\ & y = e^{\ln x} \left( \int e^{-\ln x} \cdot 1 dx + c \right) = x \left( \int \frac{1}{x} dx + c \right) = x \ln x + cx \quad \text{ונקבל:} \end{aligned}$$

$$(ב) .y' + xy - x^2 = 0$$

פתרונות:

$$y' + xy = x^2$$

$$a(x) = x, b(x) = x^2 \text{ נסמן}$$

$$A(x) = \frac{x^2}{2} \text{ אי}$$

$$y = e^{-\frac{x^2}{2}} \left( \int x^2 e^{\frac{x^2}{2}} dx + c \right)$$

$$x^2$$

$$\text{ולכן: } y = e^{-\frac{x^2}{2}} \left( \int x^2 e^{\frac{x^2}{2}} dx + c \right)$$

את האינטגרל:  $\int x^2 e^{\frac{x^2}{2}} dx$  אנחנו לא יודעים לחשב (לא ניתן לבטא אותו באמצעות פונקציות אלמנטריות), ולכן נשאיר את הפתרון כך.

$$(ג) .y' + \frac{y}{x} = 6x^2$$

פתרונות:

$$a(x) = \frac{1}{x}, b(x) = 6x^2$$

$$A(x) = \ln x$$

$$y = e^{-\ln x} \left( \int e^{\ln x} \cdot 6x^2 dx + c \right) = \frac{1}{x} \left( \int 6x^3 dx + c \right) = \frac{1}{x} \left( \frac{3}{2} x^4 + c \right) = \frac{3}{2} x^3 + \frac{c}{x}$$

3. מצאו את הפתרונות הפרטיים של המשוואות הבאות, המקיימים  $y(0) = 0$ .

$$(א) .y' \cos x - y \sin x = 1$$

פתרונות:

נסדר את המשוואה:

$$y' - (\tan x)y = \frac{1}{\cos x}$$

$$a(x) = -\tan x, b(x) = \frac{1}{\cos x}$$

$$A(x) = \ln \cos x \text{ לכן:}$$

$$y = e^{-\ln \cos x} \left( \int e^{\ln \cos x} \frac{1}{\cos x} dx + c \right) = \frac{1}{\cos x} \left( \int 1 dx + c \right) = \frac{x + c}{\cos x}$$

נזכיר את תנאי התחילה ונקבל:  $c = 0$

$$y = \frac{x}{\cos x} \text{ ככלומר, הפתרונו של בעיית התחילה הוא:}$$

$$(ב) .y' - 2y = e^{3x}$$

פתרונות:

$$a(x) = -2, b(x) = e^{3x}$$

$$A(x) = -2x$$

$$y = e^{2x} \left( \int e^{-2x} e^{3x} dx + c \right) = e^{2x} \left( \int e^x dx + c \right) = e^{2x} (e^x + c) =$$

$$\text{נקבל: } e^{3x} + ce^{2x}$$

נציב את תנאי ההתחלתה ונקבל:

$$0 = y(0) = 1 + c$$

$$\text{לכן } c = -1$$

$$\text{והפתרון הפרטוי הוא: } y = e^{3x} - e^{2x}$$

4. חומר כימי מסוים מיוצר בקצב קבוע, אך מתרפרק בקצב פרופורצионаלי לכמות החומר הקיים. נסמן את כמות החומר בזמן  $t$  ב- (*Camut*)  $C(t)$  באנגלית). כמות החומר מקיימת את המשוואה:

$$C' = a - bC$$

$$\text{כאשר } a, b > 0$$

(א) מצאו את פתרון המשוואה, בתנאי  $C(0) = K$

פתרון:

$$C = \frac{a}{b} - ce^{-bt}$$

$$K = C(0) = \frac{a}{b} - c$$

$$C = \frac{a}{b} - \left(\frac{a}{b} - K\right)e^{-bt} \quad \text{ולכן } \frac{a}{b} - K$$

(ב) הוכיחו שלכל  $K$  מתקיים:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} C(t) = \frac{a}{b}$$

פתרון:

$$C(t) \rightarrow \frac{a}{b} \quad \text{כאשר } t \rightarrow \infty$$