

תרגול מס' 2 - חישוב אינפי 3

הערה. כאשר נדבר על נורמה על \mathbb{R}^n , בלי לציין במדויק באיזו נורמה מדובר, הכוונה היא לנורמה הסטנדרטית המשוררת מהמכפלה הפנימית הסטנדרטית \mathbb{R}^n , דהיינו, נורמת-2.

$$\|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

כמו כן, קבוצות שלא למדו מטריקות יכולים לדלג על החלק הראשוני ולהחליף $d(x, y)$ ב $\|y - x\|$ (כאשר $\|\cdot\|$ היא נורמה שירוטית). כמעט כל ההגדרות והדוגמאות נשארות בלי שינוי.

אתם מוזמנים לשЛОח תיקונים, בקשות להבהרה ושאלות למייל של המתרגל.

מרחבים מטריים

בשיעור הקודם דיברנו על נורמה ועל הקשר שלה למונח "מרחב" שאותו אנחנו צריכים על מנת לעשות חישוב אינפיניטסימלי. מסתבר, שעל מנת להכליל מושג של מרחב לקבוצה כלשהי, לא ממש צריכים את תכונות הקשורות לכפל בסקלר, שכן רוב הקבוצות הן לא מרחבים וקטוריים, וניתן להסתפק באקסיומות הבאות.

הגדרה 1. תהי X קבוצה. פונקציה $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$: נקראת מטריקה אם היא מקיימת את התכונות הבאות.

.1. אי-שליליות: לכל $x, y \in X$ מתקיים $d(x, y) \geq 0$ ואם $x = y$ אז $d(x, y) = 0$.

(מרחב תמיד אי-שלילי ומרחב בין נקודות הוא חיובי).

.2. סימטריות: לכל $x, y \in X$ מתקיים: $d(x, y) = d(y, x)$. (המרחב מ x ל y שווה למרחיק מ y ל x).

.3. אי-שוויון המשולש: לכל $x, y, z \in X$ מתקיים $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ (אם עוברים בנקודות ביןיהם אז המרחק גדול).

הזוג (X, d) נקרא מרחב מטרי.

תרגיל 2. הוכיחו את אי-שוויון המשולש "המעבעץ"

$$|d(x, z) - d(y, z)| \leq d(x, y)$$

עבור מרחבים מטריים.

פתרונות. בה"כ, נניח ש $d(y, z) \leq d(x, z)$. אז, ניתן להוריד את $| \cdot |$ ממחצית השמאלי. נקבל:

$$d(x, z) - d(y, z) \leq d(x, y)$$

נעביר את $d(y, z)$ אמצע ונקבל את שוויון המשולש המקורי, וסיימנו.

נביא מספר דוגמאות:

דוגמה 3. יהי (X, d) מרחב מטרי. יהי $\tilde{d} = d|_{Y \times Y}$. אז \tilde{d} היא מטריקה על Y . במלים אחרות, כל ת"מ של X הוא מרחב מטרי בפני עצמו יחד עם המטריקה של X המצוומצת על Y . במקרה זה, אומרים ש (Y, \tilde{d}) הוא תת-מרחב של (X, d) .

דוגמה 4. אם V הוא מרחב נורמי, הנורמה $\| \cdot \|$ על V משירה מטריקה על V באופן הבא:

$$d(x, y) = \|x - y\|$$

דוגמה 5. יחד עם הפונקציה $d(x, y) = \left| \ln \frac{x}{y} \right|$ הוא מרחב מטרי. נבדוק שהאקסיומות מתקיימות.

1. האי שליליות נובעת מערך מוחלט בהגדלה ו-0 גורר ש $\left| \ln \frac{x}{y} \right| = 0$

2. סימטריות גם בקבילות:

$$d(x, y) = \left| \ln \frac{x}{y} \right| = \left| -\ln \frac{y}{x} \right| = \left| \ln \frac{y}{x} \right| = d(y, x)$$

3. אי-שוויון המשולש

$$\begin{aligned} d(x, z) &= \left| \ln \frac{x}{z} \right| = \left| \ln \frac{x}{y} \frac{y}{z} \right| \leq \left| \ln \frac{x}{y} + \ln \frac{y}{z} \right| \\ &\leq \left| \ln \frac{x}{y} \right| + \left| \ln \frac{y}{z} \right| \leq \left| \ln \frac{x}{y} \right| b + \left| \ln \frac{y}{z} \right| \\ &= d(x, y) + d(y, z) \end{aligned}$$

נתבונן שוב בדוגמה הזאת. נשים לב, שאת $d(x, y)$ ניתן להגיד באופן הבא:

$$d(x, y) = |\ln x - \ln y|$$

נזכר, שלמעשה $(|\cdot|, \mathbb{R})$ הוא מרחב מטרי בפני עצמו ו- $\mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ היא פונקציה הפיכה. באופן טריוויאלי, מקבלים את הכללה הבאה: אם $f : Y \rightarrow X$ הוא מרחב מטרי ו- $f : Y \rightarrow X$ הוא פונקציה הפיכה, אז תמיד ניתן להגיד על Y מטריקה \tilde{d} על ידי

$$\tilde{d}(x, y) = d(f(x), f(y))$$

נראה, כיצד ניתן לבדוק מטריקות חדשות ממטריקות קיימות.

דוגמה 6. תהיינה $d_1, \dots, d_n \in \mathbb{R}$ מטריקות שונות על X . אזי, לכל $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ הפונקציה

$$d(x, y) = \sum_{i=1}^n \alpha_i d_i(x, y)$$

היא מטריקה על X . קל לוודא שכל האקסiomות מתקיימות:

1. אי-שליליות מתכבלת מהעובדת שיש לנו צורך חיובי של ביטויים אי-שליליים, ויכול להתקבל 0 אם ורק אם לכל n $x = y$, $d_i(x, y) = 0, 1 \leq i \leq n$.

2. סימטריות נובעת מהסימטריות של כל גורם בסכום, כאמור:

$$d(x, y) = \sum_{i=1}^n \alpha_i d_i(x, y) = \sum_{i=1}^n \alpha_i d_i(y, x) = d(y, x)$$

3. באותו אופן מקבלים את אי-שוויון המשולש:

$$\begin{aligned} d(x, z) &= \sum_{i=1}^n \alpha_i d_i(x, z) \leq \sum_{i=1}^n \alpha_i (d_i(x, y) + d_i(y, z)) \\ &= \sum_{i=1}^n \alpha_i d_i(x, y) + \sum_{i=1}^n \alpha_i d_i(y, z) = d(x, y) + d(y, z) \end{aligned}$$

דוגמה 7. אם $(X_1, d_1), \dots, (X_n, d_n)$ הם מרחבים מטריים, אזי על $X = X_1 \times \dots \times X_n$ הינו מטריקה ייחד עם המטריקות

$$d((x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n)) = \sum_{i=1}^n d_i(x_i, y_i)$$

הוא מרחב מטרי. בדיקת האקסiomות מותבצעת כמו בדוגמה הקודמת, עם שינוי קטן במקرارה הראשונית:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n d_i(x_i, y_i) = 0 &\implies d_i(x_i, y_i) = 0 \implies x_i = y_i \\ &\implies (x_1, \dots, x_n) = (y_1, \dots, y_n) \end{aligned}$$

דוגמה 8. אם (X, d) הוא מרחב מטרי, אזי הפונקציה

$$\tilde{d}(x, y) = \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)}$$

היא מטריקה על X . שוב, יש לבדוק שהאקסימיות מתקיימות. בדיקת אי-שליליות וסימטריות היא טריומלית, ולכן עליה. נראה את אי-שוויון המשולש:

$$\begin{aligned} \tilde{d}(x, y) + \tilde{d}(y, z) - \tilde{d}(x, z) &= \\ \frac{d(x, y)}{1+d(x, y)} + \frac{d(y, z)}{1+d(y, z)} - \frac{d(x, z)}{1+d(x, z)} &= \\ \frac{d(x, y)(1+d(y, z))(1+d(x, z)) + d(y, z)(1+d(x, y))(1+d(x, z))}{(1+d(x, y))(1+d(y, z))(1+d(x, z))} - \\ \frac{d(x, z)(1+d(x, y))(1+d(y, z))}{(1+d(x, y))(1+d(y, z))(1+d(x, z))} \end{aligned}$$

נשים לב, שהמכנה תמיד חיובי, על כן מספיק להוכיח שהמונה של הביטוי הוא אי שלילי. נפתח ונקבל:

$$\begin{aligned} d(x, y) + d(x, y)d(y, z) + d(x, y)d(x, z) + d(x, y)d(y, z)d(x, z) + \\ d(y, z) + d(x, y)d(y, z) + d(x, z)d(y, z) + d(x, y)d(x, z)d(y, z) - \\ d(x, z) - d(x, y)d(x, z) - d(x, z)d(y, z) - d(x, y)d(y, z)d(x, z) = \\ d(x, y) + d(y, z) - d(x, z) + 2d(x, y)d(y, z) + d(x, y)d(x, z)d(y, z) \geq 0 \end{aligned}$$

כל הדוגמאות בהמשך הקורס למרחב מטרי יהיו תתי-מרחבים של \mathbb{R}^n . אמנם, חשוב לדעת שיש מטריקות שאינן הקשורות לנורמה. נביא דוגמה אחת.

דוגמה 9. המטריקה הדיסקרטית מוגדרת על הקבוצה X באופן הבא:

$$d(x, y) = \begin{cases} 1 & x \neq y \\ 0 & x = y \end{cases}$$

כל האקסימיות של מטריקה מתקיימות שוב: אי-שליליות וסימטריות פשוט נובעות מהגדירה, ואי-שוויון המשולש נובע מבדיקה של כמה מקרים.

קבוצות פתוחות וסגורות במרחבים מטריים

המטרה שלנו, היא להכליל מושג של קטע פתוח וקטע סגור למרחבים מטריים (לאקור שמדוברים בעיקר על \mathbb{R}^n). המושגים הם קבוצות פתוחות וסגורות. מסתבר, שהרבה יותר נכון למסח מושגים ולהוכיח מפשיטים בעזרת המוחים הלו, בלי להזכיר ϵ ו- δ באופן מפורש (למרות שלא תמיד נוכל לברוח מזה...). בנוסף, חשוב לאקור, שלאורף כל הקורס נעסק ב- \mathbb{R}^n ובתתי-קבוצות שלו (תתי-מרחבים המטריים שלו). יחד עם זאת, יותר נכון לשכוח מזה לתקופה קצרה ולנסח את המושגים בצורה כללית יותר. רוב ההוכחות עוברות אחת לאחת, על ידי החלפת $\|\cdot\|$ במטריקה כללית.

הגדרה 10. יהיו (X, d) מרחב נורמי, $a \in X$ ו- $r < 0$.

1. הקבוצה $B(a, r) = \{x \in X, d(x, a) < r\}$ נקראת כדור פתוח ברדיוס r .

.2. הקבוצה $\overline{B}(a, r) = \{x \in X, d(x, a) \leq r\}$ נקראת כדור סגור בردיוֹס r .
נראת כמו דוגמאות.

דוגמה 11. נראה איך נראה כדור היחידה \mathbb{R} . על פי הדרישה

$$\begin{aligned} B(x, r) &= \{y \mid |x - y| < r\} = \\ &= \{y \mid x - r < y < x + r\} = \\ &, (x - r, x + r) \end{aligned}$$

כלומר קטע פתוח. מצד שני, כל קטע פתוח (a, b) ב \mathbb{R} הוא למעשה הerset הפתוח $B(\frac{a+b}{2}, \frac{b-a}{2})$. בדיק באתה האפן מורים שכדורים סגורים ב \mathbb{R} הם הקטעים הסגורים.

הערה. כדור ברדיוֹס 0 סביב 0 במרחב נורמי V נראה לעתים כדור היחידה.

דוגמה 12. נראה כיצד נראה $B(0, 1)$ ו $\overline{B}(0, 1)$ ב \mathbb{R}^2 ביחס לנורמות שונות.

1. ביחס ל $\|\cdot\|_2$, כדור היחידה הפתוח $B(0, 1) = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1\}$ שהוא עיגול ברדיוֹס 1 סביב 0 ללא השפה. כדור היחידה הסגור $\overline{B}(0, 1)$ הוא אותו העיגול עם השפה.

2. ביחס ל $\|\cdot\|_1$, כדור היחידה הפתוח $B(0, 1) = \{(x, y) \mid |x| + |y| < 1\}$. בربיע הראשון, מדובר למעשה בכל הנקודות שנמצאות מתחת לישר $x + y = 1$, שהוא משולש. אם שקף אותו בכל דרך אפשרית (או שפנות נפטר כל משווה בנפרד עבור כל אחד מהרביביים), נקבל שכדור היחידה הוא למעשה החלק הפנימי של הריבוע שקודקודיו הם $(0, 0), (0, 1), (1, 0), (-1, 0)$.

3. ביחס ל $\|\cdot\|_\infty$,

$$\begin{aligned} B(0, 1) &= \{(x, y) \mid |x|, |y| < 1\} \\ &= (-1, 1) \times (-1, 1) \end{aligned}$$

מסתבר, שהריבוע שקודקודיו הם $(-1, -1), (-1, 1), (1, -1), (1, 1)$ בלי השפה. $\overline{B}(0, 1)$ הוא אותו הריבוע עם השפה.

דוגמה 13. עבור $\left(\mathbb{R}^n, \frac{\|\cdot\|}{1+\|\cdot\|}\right)$ כדור היחידה הוא כל \mathbb{R}^n . (הערה - זה נכון עבור כל מרחב).

הגדרה 14. יהיו (X, d) מרחב נורמי.

1. עבור $A \subseteq X$, נאמר ש a היא נקודת פנימית של A , אם קיימים $r < 0$ כך ש $\overline{B}(a, r) \subseteq A$.

2. נקראת $A \subseteq X$ נקודת פנימית של X , אם לכל $a \in A$, a היא נקודת פנימית של X .

3. אם $A \subseteq X$ פתוחה ב X , אז $A^c = X \setminus A$ נקראת קבוצה סגורה.

דוגמה 15. בכל מרחב מטרי (X, d) ו $\emptyset \neq X$, הן קבוצות פתוחות ב X .

דוגמה 16. יהיו (X, d) מרחב מטרי ויהי $B(x, r) = \{y \in X \mid d(x, y) < r\}$. אז כדור פתוח היא קבוצה פתוחה.

הוכחה. יהי $.B(y, q) \subseteq B(x, r)$ נראה $.q = r - d(x, y)$. נסמן $.y \in B(x, r)$ אז $.z \in B(y, q)$

$$\begin{aligned} d(x, z) &\leq \\ d(x, y) + d(y, z) &< \\ d(x, y) + r - d(x, y) &= r \end{aligned}$$

□

דוגמה 17. יהי (X, d) ממרחב מטרי. איי כדור סגור $\overline{B}(x, r)$ הוא קבוצה סגורה. על מנת להוכיח את הטענה, נראה ש $X \setminus B(x, r)$ היא קבוצה פתוחה. שוב, נראה שלכל $y \notin B(x, r)$ קיימים $q < r$ כך ש $.B(y, q) \subseteq X \setminus B(x, r)$. יהי $.z \in B(y, r)$ אז $d(x, y) = r$.

$$\begin{aligned} d(x, z) &\geq \\ |d(x, y) - d(z, y)| &= \\ d(x, y) - d(z, y) &> \\ d(x, y) - q &= \\ d(x, y) - (d(x, y) - r) &= r \end{aligned}$$

כלומר, $.B(y, q) \subseteq X \setminus B(x, r)$, כלומר $.z \notin B(x, r)$.

תרגיל 18. יהי $B(x_1, r_1), \dots, B(x_n, r_n)$ כדורים פתוחים במרחב מטרי (X, d) . הוכחו, שאם $x \in \bigcap_{i=1}^n B(x_i, r_i)$ קיימים $r < 0 < r_i$ כך ש $\bigcap_{i=1}^n B(x_i, r_i) \neq \emptyset$

$$.B(x, r) \subseteq \bigcap_{i=1}^n B(x_i, r_i)$$

פתרו. יהי $r = \min\{r_i - d(x_i, x)\}$. נראה ש $x \in \bigcap_{i=1}^n B(x_i, r_i)$.

$$.B(x, r) \subseteq \bigcap_{i=1}^n B(x_i, r_i)$$

יהי $y \in B(x, r)$. איי לכל i מתקאים

$$\begin{aligned} d(x_i, y) &\leq \\ d(x_i, x) + d(x, y) &> \\ d(x_i, x) + r &\leq \\ d(x_i, x) + r_i - d(x_i, x) &= r_i \end{aligned}$$

ולכן $y \in B(x_i, r_i)$.

דוגמה 19. $\mathbb{R}^3 \setminus \{(1, 2, 3)\}$ היא קבוצה פתוחה. יהי $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{(1, 2, 3)\}$.

$$.r = \|(x, y, z) - (1, 2, 3)\|$$

מהגדרת $\|(x, y, z) - (1, 2, 3)\| \geq r$ כי $(1, 2, 3) \notin B((x, y, z), r)$, $B((x, y, z), r) \subseteq \mathbb{R}^3 \setminus \{(1, 2, 3)\}$

הערה. את הדוגמה הקודמת למרחב מטרי כללי (X, d) עם אותה הוכחה בדיק עד כדי החלפת סימון.

דוגמה 20. יהי (X, d) , איזי לכל $x \in X$, $\{x\}$ היא קבוצה סגורה. זה נובע מהגדרת קבוצה סגורה ומדוגמה הקודמת וההערה אחרת.

תרגיל 21. האם $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ היא קבוצה פתוחה או קבוצה סגורה ב- \mathbb{R} ?
 פתווו. נראה שאף אחת מהאפשרויות אינה מותקינית. תחילת, יהי $q \in \mathbb{Q}$. איזי לכל $r < 0$ קיים x אי-רצionario כך ש $r < q < x < q + r$ ולכן $\mathbb{R} \not\subseteq B(q, r)$.
 דרך קצט יותר מתחכמת: אם כל x שמיים $r < x < q + r$ הוא רצionario, איזי משיקולי סגורות

$$y = x - q$$

הוא רצionario. לכל מתקיים

$$\cdot. (-r, r) = \{x - q | q - r < x < q + r\} \subseteq \mathbb{Q}$$

אבל מתקיים

$$\cdot. \mathbb{Q}(-r, r) = \{qx | -r < x < r\} = \mathbb{R}$$

מצד שני, אם מכיוון שלכל $y \in \mathbb{R}$ קיים רצionario q כך ש $\frac{1}{q}x < y < -r$. מצד שני, אם $Q \subseteq (-r, r)$ איזי $\mathbb{Q} \subseteq Q$ וקיים $q \in \mathbb{R}$, וזה לא נכון. לכן, אף נקודה ב- \mathbb{Q} אינה נקודת פנימית. באותו אופן על ידי השימוש בטענה שבין כל שני מספרים קיימים מספר רצionario, מראים ש $\mathbb{Q} \setminus \mathbb{R}$ אינה פתוחה. ולכן, \mathbb{Q} אינה פתוחה ואינה סגורה ב- \mathbb{R} .

משפט 22. יהי (X, d) מרחב מטרי.

1. יהי $\{X_i\}_{i \in I}$ אוסף כלשהו של קבוצות פתוחות. איזי, מתקיים $X = \bigcup_{i \in I} X_i$ היא קבוצה פתוחה.

2. יהי $\{X_i\}_{i=1}^n$ אוסף סופי של קבוצות פתוחות. איזי $X = \bigcap_{i=1}^n X_i$ היא קבוצה פתוחה.

3. יהי $\{X_i\}_{i \in I}$ אוסף כלשהו של קבוצות סגורות. איזי $X = \bigcap_{i \in I} X_i$ היא קבוצה סגורה.

4. יהי $\{X_i\}_{i=1}^n$ אוסף סופי של קבוצות סגורות. איזי $X = \bigcup_{i=1}^n X_i$ היא קבוצה סגורה.

תרגיל 23. נראה ש 2 ו 4 אינם נכוןים אם לא נדרוש "סופי".

1. נתבונן ב- $\left\{ \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n} \right) \right\}_{n \in \mathbb{N}}$. כל קבוצה באוסף היא קטע פתוח ולכן פתוחה. מצד שני

$$\cdot. \bigcap_{i=1}^n \left(-1 + \frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{n} \right) = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \forall n \in \mathbb{N}, -\frac{1}{n} < x < \frac{1}{n} \right\} = \{0\}$$

ו $\{0\}$ אינה פתוחה.

. $\left\{ \left[-1 + \frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{n} \right] \right\}_{n \in \mathbb{N}}$ בانون דומה, איחוד אינסופי של קבוצות סגורות אינו קבוצה סגורה. נתבונן ב-

$$\begin{aligned} \bigcup_{i=1}^n \left[-1 + \frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{n} \right] &= \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \exists n \in \mathbb{N}, -1 + \frac{1}{n} \leq x \leq 1 - \frac{1}{n} \right\} \\ &= (-1, 1) \end{aligned}$$

שהיא אינה קבוצה פתוחה.

האיפיוון הבא של קבוצות פתוחות הוא טריוויאלי להוכחה (ומן הסטם כבר הוכח בכיתה...), אבל לעתים יותר נוח לעבוד אותו.

משפט 24. יהי (X, d) מרחב מטרי. אז $A \subseteq X$ היא קבוצה פתוחה, אם ורק אם קיים אוסף של צדורים פתוחים $\{B(x_i, r_i)\}_{i \in I}$ כך ש

$$A = \bigcup_{i \in I} B(x_i, r_i)$$

מטריקות ונוורמות שקולות

הגדרה 25. יהי (X, d) מרחב מטרי, ויהי $x \in X$. קבוצה פתוחה N שמקיימת $x \in N$ נקראת סביבה פתוחה של x (לעתים, ובפרט אצלנו, פשוט סביבה).

לפנינו שນמשיך לנסה לשכנע אתכם שלמושגים שעשינו בהם בנתיים, יש שימושים כלשהם (פחות אינפי). נזכיר את המושג הראשון שבד"כ לומדים באינפי.¹

הגדרה 26. תהי $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה ב \mathbb{R} ו $a \in \mathbb{R}$. נאמר, ש a_n מתכנסת ל a ונסמן $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ אם לכל $\epsilon < 0$ קיים m כך שם $n < m$ איזי $|a_n - a| < \epsilon$.

ההגדרה הזאת מוכללת بكلות למרחב מטרי כללי.

הגדרה 27. יהי (X, d) מרחב מטרי. תהי $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרת ב X ו $x \in X$. נאמר x_n מתכנסת ל x אם לכל $\epsilon < 0$ קיים m כך שם $n < m$ איזי $d(x_n, x) < \epsilon$.

תרגיל 28. יהי (X, d) מרחב מטרי, $X \in x$ וסדרה $\{x_n\}_n$ ב X . איזי $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$ וrisk אם לכל סביבה פתוחה N של x קיים m כך $x_n \in N, m < n$ וrisk אם פטורו. (\Leftarrow). נניח ש $x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. תהי N סביבה פתוחה של x . מכיוון ש N פתוחה, קיים כדור פתוח $B(x, r) \subseteq N$ כך ש $B(x, r) \subseteq N$. מצד שני, קיים m כך שלכל $x_n \in N$ $x_n \in B(x, r)$. נניח שלכל סביבה N קיים m כך $x_n \in N, m < n$. בפרט, מכיוון שלכל $x_n \in N$ $x_n \in B(x, r)$. אבל זה בדיק אומר, ש $x_n \in B(x, r)$. כלומר, נניח שלכל סביבה N קיים m כך $x_n \in N, m < n$. בפרט, מכיוון שלכל $x_n \in B(x, r)$ איזי קיים m כך $x_n \in B(x, r)$. מותקמים (\Rightarrow).

נדון בסדרות ובהתכניות שלhn ביתר פירוט בהמשך הקורס.

לאחר שהשתכנענו שיש חשיבות למושג קבוצה פתוחה, ואפשר (פחות בחלק מהגדרות) להתmesh בו במקומות ϵ ו δ , ננסה לענות לשאלת הבאה.

שאלה 29. נניח ש X מרחב מטרי ו d_1 ו d_2 הן מטריות על X . האם d_1 ו d_2 מדדריות את אותו אוסף של קבוצות פתוחות?

הגדה 30. תשובה: מטריות d_1 ו d_2 נקראות שקולות, אם ורק אם לכל קבוצה $U \subseteq X$ U פתוחה ביחס ל d_1 אם ורק אם U פתוחה ביחס ל d_2 .

בהמשך נתעסק בעיקר ב \mathbb{R}^n . הטענה הבאה שנוכית, לעיתים שימושי מאד. טענה 31. יהיו $\|\cdot\|_a$ ו $\|\cdot\|_b$ נורמות על \mathbb{R}^n . אזי הן מושרות מטריות שקולות, אם ורק אם קיימים קבועים חיובים α ו β כך שלכל $v \in \mathbb{R}^n$

$$\alpha \|v\|_a \leq \|v\|_b \leq \beta \|v\|_a$$

הערה. נורמות שמקיימות את האי-שוויון הנ"ל נקראות נורמות שקולות. קל לבדוק שהקילות נורמות היא יחס שקילות.

הוכחה. תחילה, נשים לב שאט האי-שוויון האחרון ניתן לנ Sach באופן הבא: קיימים α ו β כך ש

$$\|v\|_a \leq \alpha \|v\|_b$$

וגם

$$\|v\|_b \leq \|v\|_a$$

בנוסח נסמן כדורי ברדיוס r סביב x על ידי $B_a(x, r)$ ו על ידי $B_b(x, r)$ עבור $\|\cdot\|_a$ ו $\|\cdot\|_b$ בהתאם. נ עבור להוכחה.

(\Leftarrow) אם הנורמות שקולות, אזי עבור כדורי היחידות $B_a(0, 1)$ והו קבוצה פתוחה ביחס ל $\|\cdot\|_b$ ולכן קיים r כך ש $B_b(0, r) \subseteq B_a(0, 1)$. בפרט, לכל $r < \frac{1}{\alpha}$, אם $\|v\|_b = \frac{1}{\alpha} < r$, אז $v \in B_a(0, 1)$, אזי $v \in B_b(0, r)$, כלומר v נמצא בתוך כדור שקול,

$$\|v\|_a = 1$$

נכפיל ב α ונקבל עבור v שמקיים

$$\begin{aligned} \|v\|_a &= \left\| \alpha \frac{v}{\alpha} \right\|_a \\ &= \alpha \left\| \frac{v}{\alpha} \right\|_a \\ &< \alpha. \end{aligned}$$

עכשו, לכל $v \in \mathbb{R}^n$ מתקיים

$$\begin{aligned} \|v\|_a &= \\ \left\| \|v\|_b \frac{v}{\|v\|_b} \right\|_a &= \\ \|v\|_b \left\| \frac{v}{\|v\|_b} \right\|_a &\leq \alpha \|v\|_b \end{aligned}$$

באוטו האופן מראים את האי-שוויון השני.

עכשו, נראה שא-שוויון ה"ל גורר את שיקילות הנורמות המושרות. נניח שהנורמות שקולות. יהיו x, r כדור פתוח ביחס ל $\|\cdot\|_a$. נראה $B_a(x, r) \subseteq B_a(y, q)$. כמו שראינו קודם, קיימים $c > 0$ ו- $s = \frac{1}{c}q$ כך ש $B_b(y, s) \subseteq B_a(x, r)$. נבחר $y \in B_b(y, s)$. אז לכל $v \in B_b(y, s)$, $\|v\|_a \leq c\|v\|_b$.

מתקיים

$$\|y - z\|_a \leq c\|y - z\|_b < c \cdot s = c \frac{q}{c} = q$$

□

הערה 32. בטענה שהוכחנו, ניתן להחליף כל \mathbb{R}^n בכל מרחב נורמי, למעשה.

דוגמה 33. הנורמות $\infty, 1, 2, \infty$ הן נורמות שקולות. נזכיר, שהראינו שמתקיים:

$$\cdot \frac{\|x\|_1}{\sqrt{n}} \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1$$

כמו כן, רأינו שמתקיים:

$$\cdot \|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq n\|x\|$$

דוגמה 34. משפט הבא יוכח בהמשך הקורס.

משפט 35. יהיו $\|\cdot\|_a$ ו- $\|\cdot\|_b$ על \mathbb{R}^n . אז הם שקולות.

המשפט והדוגמה הקודמים נותנים לנו גמישות נוספת בחישובים.

תרגיל 36. הראו שהקבוצה $S = \{(x, y) | x^2 - y > 0\}$ היא קבוצה פתוחה ב \mathbb{R}^2 ביחס לנורמות 2 (כפי שאמרנו קודם, זה לא באמת חשוב, כי כל הנורמות ב \mathbb{R}^n הן שקולות).

פתרו. יהיו $(x, y) \in S$. אז קיימים $a, b > 0$ כך ש $x^2 - y > a$. נקבע $t < x^2 - (\frac{1}{2}(x^2 - y))$ ו- $b < x + b < x + a$. אז $t < y + a < t < x + a$. נקבע $s = \sqrt{t}$.

$$(s, t) \in [x - b, x + b] \times [y - a, y + a]$$

מתקיים $(s, t) \in B_{\|\cdot\|_\infty}((x, y), r) = \min\{a, b\} < r$. ניקח $r = \min\{a, b\}$ ונקבל שלכל $((x, y), r) \in S$, כלומר, סביב כל נקודה ב S קיימים $a, b > 0$ כך ש $x^2 - y > a$ ו- $x + b < x + a$.

הערה 37. בהמשך הקורס, כאשר נדבר על רציפות ועל סדרות, נראה כי מילים חזקים יותר על מנת להוכיח שקבוצה מסוימת היא פתוחה או סגורה.

נקודות הצבירות ונקודות מבוזדות

הגדרה 38. יהיו (X, d) מרחב מטרי וכי $A \subseteq X$. נאמר ש $p \in X$ היא נקודת הצבירות של A אם לכל $r > 0$ קיים $a \in A$ כך ש $0 < d(a, p) < r$.

משפט 39. יהיו (X, d) מetric space ו- $A \subseteq X$. אזי, p היא נקודת היצטבות של A אם ורק אם כל סכינה N של p מתקיימת

$$|N \cap A| = \infty.$$

(כל סכינה של p מכילה אינסוף נקודות של A).

דוגמה 40. 1 היא נקודת היצטבות של $(0, 1)$, מכיוון שכל $0 < x < 1$ קיים $1 - \epsilon < x < 1 + \epsilon$ מתקיים

$$|1 - x| = 1 - x > 1 - (1 - \epsilon) = \epsilon$$

תרגיל 41. הראו, שאוסף כל נקודות היצטבות של \mathbb{Z} הוא \emptyset .

פתרו. יהיו $x \in \mathbb{R}$. אזי הקטע $(x - \frac{1}{2}, x + \frac{1}{2}) = B(x, \frac{1}{2})$ מכיל לכל היותר מספר שלם יחיד, ולכן לא נק' היצטבות של \mathbb{Z} על פי המשפט שציגנו.

תרגיל 42. תהי $S \subseteq \mathbb{R}^n$ ותהי $x \in S$ נקודה פנימית. הראו ש x היא נקודת היצטבות של S .

פתרו. תהי $S \subseteq \mathbb{R}^n$ נקודה פנימית. אזי קיימים r, q כך ש $B(x, r) \subseteq S$. ברור שלכל $r < q$, $B(x, q) \subseteq B(x, r)$ ובנור שכל כדור פתוח ב- \mathbb{R}^n היא קבוצה אינסופית. לכן לכל סביבה N של x , ניתן כדור פתוח ברדיוס $r < q$ שמכיל ב- N , והוא מכיל אינסוף נקודות של S , וזהו ש N מכילה אינסוף נק' של S וסימנו על פי המשפט.

תרגיל 43. מצאו את כל נק' היצטבות של $S = \{(p, q) | p, q \in \mathbb{Q}\}$ ב- \mathbb{R}^2 .

פתרו. נראה, שקבוצה נק' היצטבות של S ב- \mathbb{R}^2 היא כל \mathbb{R}^2 . תהי $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ ויהי $B((x, y), r)$ כדור פתוח ברדיוס r סביב (x, y) . על פי שיקילות של נורמה ∞ וunarmita, קיימים r' כך ש

$$B_\infty((x, y), r') = [x - r', x + r'] \times [y - r', y + r']$$

קיים מספר רצוני $r' < r$ וכן מתקיים

$$0 < \|(x, y) - (p, q)\|_2 < r$$

מן ש $(x, y) \neq (p, q)$ ו- $[x - r', x + r'] \times [y - r', y + r'] \subseteq B((x, y), r)$

תרגיל 44. מצאו את כל נקודות היצטבות של $\overline{B}(x, r)$ ב- \mathbb{R}^n .

פתרו 45. נחbare

ראינו כמה דוגמאות לנק' היצטבות וראיינו, שנק' היצטבות של A היא לא בהכרח איבר של A . נשאלת השאלה: אילו קבוצות מכילות את נק' היצטבות שליה?

משפט 46. יהיו (X, d) מetric space ותהי $S \subseteq X$. אזי S סגורה אם ורק אם S מכילה את כל נק' היצטבות שלה.

דוגמה 47. מצאו את כל נק' היצטבות של $\overline{B}(0, 1)$ ב- \mathbb{R}^n .

פתרו. ראיינו, שכל נקודה פנימית של $(0, 1) \setminus \bar{B}$ היא נקודת הצבירות, על כן, כל נקודה של $B \setminus (0, 1)$ היא נקודת פנימית של $\bar{B} \setminus (0, 1)$ ולכן נק' הצבירות שלה. נראה, שכל נק' שמקיימת $\|x\| = 1$ היא גם נק' הצבירות של $\bar{B} \setminus (0, 1)$. תהי $x \in \bar{B} \setminus (0, 1)$ כך ש $\|x\| = 1$. אז לכל $\epsilon < 0$ מותקיים

$$\left\| x - \left(1 - \frac{\epsilon}{2}\right)x \right\| = \frac{\epsilon}{2} \|x\| = \frac{\epsilon}{2} < \epsilon$$

ומצד שני $\left(1 - \frac{\epsilon}{2}\right)x \in \bar{B} \setminus (0, 1)$ כי

$$\left\| \left(1 - \frac{\epsilon}{2}\right)x \right\| = \left(1 - \frac{\epsilon}{2}\right)\|x\| = \left(1 - \frac{\epsilon}{2}\right) < 1$$

ו $\|x\|$ היא נקודת הצבירות של $\bar{B} \setminus (0, 1)$ על פי הדרדרת נקודות הצבירות.

תרגיל 48. הראו ש \mathbb{Z} היא קבוצה סגורה ב \mathbb{R} .

פתרו. ראיינו, שאוסף כל נק' הצבירות של \mathbb{Z} הוא \emptyset , ולכן \mathbb{Z} סגורה על פי המשפט שהבאונו.

הגדרה 49. יהיו (X, d) מרחב מטרי ו $S \subseteq X$. נאמר ש $s \in S$ נקודת מבודדת, אם קיימים $r < 0$ כך ש $B(s, r) \cap S = \{s\}$.

דוגמה 50. כל נקודה של \mathbb{Z} היא נקודת מבודדת, שכן לכל $m \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{Z} = \{m\}$.

תרגיל 51. יהיו (X, d) מרחב מטרי ו $S \subseteq X$. הראו ש $s \in S$ היא נקודת מבודדת אם ורק אם היא לא נק' הצבירות.

פתרו. נניח ש $s \in S$ נק' מבודדת. אז קיימים $r < 0$ כך שלכל $\{s\} \cap B(s, r) = \{s\}$ ואינה אינסופית, בסתיו למשפט שאומר שכל סביבה של נק' הצבירות מכילה אינסוף איברים. אעכבי נניח ש S איננה נקודת הצבירות. אז קיימת סביבה N של s כך ש $N \cap S \neq \emptyset$. אם $B(s, r) \cap S = \{s\}$ אז סיימנו, מפני שככל כדור (s, r) שטוח ב N מקיים $\{s\} \cap N = \emptyset$. אחרת, נסמן

$$\{s_1, \dots, s_n\} = N \cap S \setminus \{s\}$$

נירח $r = \min \{d(s, s_i) \mid 1 \leq i \leq n\}$. אז ברור ש $B(s, r) \cap S = \{s\}$.

קבוצות פתוחות וסגורות בתתי-מרחבים.

כפי שראינו בקורסים באינפי בسنة הראשונה, אנו לעיתים מעוניינים על פונקציות שימושגרות על תת-קבוצות של \mathbb{R} ולאו דווקא בפונקציות שימושגרות על הישר המשני שלו. המצב לא השתנה, ולהמשך, לעיתים חשוב להבין כיצד נראות תת-קבוצות פתוחות ביחס ל תת-קבוצות של \mathbb{R} או שהם למעשה תת-מרחבים מטריים של \mathbb{R} .

הערה 52. נזכר שאמרנו שקבוצה S פתוחה ב X . נבחר של X יש חשיבות. שייתכן שם $X \subseteq Y$ (עם המetricה המשוררת של Y כמובן), S פתוחה ב X אך אינה פתוחה ב Y .

דוגמה 53. נזהה את הישר המשני \mathbb{R}^2 עם ציר ה x ב \mathbb{R}^2 , כלומר הקבוצה $\{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$. הקבוצה היא פתוחה בתוך עצמה אבל אינה פתוחה ב \mathbb{R}^2 , שכן כל כדור פתוח סביב נקודה מהצורה $(x, 0)$ מכיל נקודה מהצורה (y, x) , כאשר $y \neq 0$.

הטענה נכון גם עבור קבוצות סגורות, שכן הקבוצה $(0, 1) \setminus \bar{B}$ סגורה בתוך עצמה אך אינה סגורה ב \mathbb{R} , מפני ש 1 היא נקודת הצבירות של X ב \mathbb{R} , ו $1 \notin X$ (אבל 1 היא לא נקודת הצבירות של X ב X !!!).

המשפט הבא נותן אפיון לקבוצות פתוחות של תת-מרחבבים.

משפט 54. יהיו (X, d) מרחב מטרי, ויהי $Y \subseteq X$ תת-מרחב של X . אז מתקיים:

1. תת-קבוצה U של Y פתוחה ב Y אם ורק אם קיימת קבוצה פתוחה V ב X כך ש $U = V \cap Y$.

2. תת-קבוצה U של Y סגורה ב Y אם ורק אם קיימת קבוצה סגורה V ב X כך ש $U = V \cap Y$.

הוכחה. נוכיח את החלק הראשון תחילה.
 \Rightarrow ($U = V \cap Y$ נניח ש עבור קבוצה פתוחה V ב X . מכיוון שככל נק' $u \in U$ היא נק' של V , לכל u קיים $r < r'$ (r' מסומן כדורים פתוחים ב X וכדורים פתוחים ב Y על ידי $B_X(u, r)$ ו $B_Y(u, r')$). נשים לב שמתקיים:

$$\begin{aligned} B_X(u, r) \cap Y &= \\ \{x \in X | d(x, u) < r\} \cap Y &= \\ \{x \in X | d(x, u) < r \wedge x \in Y\} &= \\ \{y \in Y | d(y, u) < r\} &= B_Y(u, r). \end{aligned}$$

אבל $B_X(u, r) \subseteq V$ ולכן

$$B_Y(u, r) = B(u, r) \cap Y \subseteq V \cap Y = U$$

כלומר, הראנו שככל נקודה $u \in U$ קיים כדור פתוח U ב Y ולכון U פתוחה ב Y .
 \Leftarrow ($U = V \cap Y$ נניח ש U קבוצה פתוחה ב Y . נראה שקיימת V פתוחה ב X כך ש מכיוון ש U פתוחה, ניתן להציג אותה על ידי האיחוד

$$U = \bigcup_{i \in I} B_Y(u_i, r_i)$$

על פי המשפט שרשמנו קודם. מצד שני

$$V = \bigcup_{i \in I} B_X(u_i, r_i)$$

היא איחוד של קבוצות פתוחות ולכון פתוחה ומתקיים:

$$\begin{aligned} V \cap Y &= \\ \left(\bigcup_{i \in I} B_X(u_i, r_i) \right) \cap Y &= \\ \bigcup_{i \in I} (B_X(u_i, r_i) \cap Y) &= \\ \bigcup_{i \in I} B_Y(u_i, r_i) &= U. \end{aligned}$$

כלומר U הינה חיתוך של קבוצה פתוחה ב X ו Y , כנדרש.

הוכחה. על מנת להוכיח את החלק השני, נשים לב שאם $U \subseteq Y$ היא קבוצה סגורה ב- Y , אז $U \setminus Y$ היא קבוצה פתוחה ב- Y . על פי החלק הראשון, קיימת V פתוחה ב- X כך ש- $Y \cap V = Y \setminus U$.

$$U = Y \cap (X \setminus V)$$

□

והיא ו- $(X \setminus V)$ היא סגורה ב- X .

□

תרגיל 55. הוכיחו את הטענות הבאות:

1. אם Y היא תת-קבוצה פתוחה של X ו- Z היא תת-קבוצה פתוחה של Y אז Z היא תת-קבוצה פתוחה של X .

2. אם Y היא תת-קבוצה סגורה של X ו- Z היא תת-קבוצה סגורה של Y אז Z היא לתת-קבוצה סגורה של X .

פתרון 56.

1. נניח ש- Z היא תת-קבוצה פתוחה של Y . אז על פי המשפט שהבאנו, קיימת V פתוחה ב- X כך ש- $Z \subseteq Y \cap V$. אבל Y פתוחה ב- X ולכן $Y \cap V$ פתוחה ב- X .

2. באותו אופן - פשוט מחליפים כל מקום שימושי סגורה בפתוחה.

פנימ וסגור

הגדרה 57. יהיו (X, d) מרחב מטרי ותהי $X \subseteq U$. אז הסגור של U מוגדר על ידי החיתוך

$$\overline{U} = \bigcap_S S$$

עבור כל הקבוצות הסגורות S שמכילות את U . במילים אחרות קבוצה הקטנה ביותר שמיילה את U . את התנאי של החיתוך ניתן לרשום באופן הבא: \overline{U} היא קבוצה סגורה אשר מקיימת:

1. $U \subseteq \overline{U}$.

2. אם $U \subseteq V \subseteq \overline{U}$, אז V אינה סגורה.

3. אם V סבירה ו- $U \subseteq V$ אז $\overline{U} \subseteq V$.

נשים לב, שני התנאים האחרונים שקולים. בנוסף, מכיוון שהסגור מוגדר על ידי חיתוך של סגורות, הוא קבוצה סגורה. לעיטים נסמן $cl(U)$ במקומ \overline{U} .

דוגמה 58. הסגור של $(0, 1)$ ב- \mathbb{R} הוא הקטע הסגור $[0, 1]$.

הוכחה. נשים לב ש- $[0, 1]$ קבוצה סגורה שמיילה את $(0, 1)$. כמו כן, $[0, 1] \setminus (0, 1) = \{0, 1\}$ אינו סגורות, מכיוון שהוא לא מכילות את נקודות ה接触יות שלhn. □

הגדלה 59. יהיו (X, d) מרחב מטרי ויהי $A \subseteq X$. נסמן על ידי A' את אוסף הנקודות הצטברות של A .

משפט 60. איזי $\bar{A} = A' \cup A$

הערה 61. לעיתים השווין במשפט נלקח כהגדרת הסגור של קבוצה ולא ההגדרה שהבאו. כמובן שכן שקולות.

תרגיל 62. הראו, ש \mathbb{R} ב $\overline{\mathbb{Q}}$ הוא $\mathbb{R}' = \mathbb{R}$. הטענה נובעת מהמשפט.

הגדלה 63. יהיו (X, d) מרחב מטרי ו $A \subseteq X$. הפנים של A שיסומן על ידי A° או על ידי $int(A)$

$$A = \bigcup_S S$$

על פני כל הקבוצות הפתוחות שمولכות ב A . כמובן, A° היא הקבוצה הפתוכה המקסימלית שمولכת ב A . זאת אומרת, A° היא הקבוצה הפתוכה אשר מקיימת:

$$A^\circ \subseteq A . 1$$

.2 אם $A^\circ \subset B$ (הכליה ממש ו $B \subseteq A$ ו $B \subseteq A$) אז B אינה קבוצה פתוחה.

$$.3 \text{ אם } B \subseteq A \text{ ו } B \subseteq A^\circ \text{ פתוחה, אז } A^\circ$$

שוב, 2 ו 3 הם ניסוחים שקולים של אותו התנאי. בנוסף, מכיוון ש A° מוגדר כאיחוד של פتوחות, הוא קבוצה פתוחה.

דוגמה 64. הפנים של $B(0, 1)$ ב \mathbb{R}^n ($0, 1$, מכיוון ש $B(0, 1)$ פתוחה ומצד שני אם $x \in \overline{B}(0, 1)$ אז לכל $\epsilon > 0$ $\|x\| = 1 + \frac{\epsilon}{2}$)

$$\left(1 + \frac{\epsilon}{2}\right) x \in B(x, \epsilon)$$

$$\text{ומצד שני } \left(1 + \frac{\epsilon}{2}\right) x = 1 + \frac{\epsilon}{2} \text{ ולכן}$$

$$\cdot \left(1 + \frac{\epsilon}{2}\right) x \notin \overline{B}(x, \epsilon)$$

תרגיל 65. הראו, ש A° שווה לאוסף הנקודות הפנימיות של A .

פתרו. נניח ש $a \in A$ היא נקודה פנימית של A . איזי קיימת סביבה פתוחה של a של U כך $U \subseteq A$. לכן, $U \subseteq A^\circ$, אם $a \in A^\circ$, איזי a נקודה פנימית של A° , מפני ש A° היא קבוצה פתוחה, ואם היא נקודה פנימית של A° גם נקודה פנימית של A .

תרגיל 66. הוכחו שמתקיים

$$cl(A) = int((A^c))^c$$

כאשר A^c משלם את A משללים במרחב מטרי X .

פתרונות 67. על פי ההגדרה,

$$cl(A) = \bigcap_{A \subseteq S} S$$

על פני כל הקבוצות S שמכילות את A . אם S היא קבוצה סגורה שמכילה את A , S^c היא קבוצה פתוחה שמכילה את A^c . נשתמש בה-מורגן ונקבע

$$cl(A) = \bigcap_{A \subseteq S} S = \left(\bigcup_{S^c \subseteq A^c} S^c \right)^c$$

והסוגרים השניים הם בדיקת ההגדרה של הסגור.

הגדרה. ייְהִי (X, d) מרחב מטרי ותהי $A \subseteq X$. איזה השפה של A , מסומנת על ידי ∂A מוגדרת על ידי

$$\partial A = \overline{A} \setminus A^\circ$$

דוגמה 68. השפה של כדור פתוח $B(0, 1)$ ב \mathbb{R}^n הוא ספרת היחידה

$$, \{x \mid \|x\| = 1\}$$

כפי כמו שראינו, $cl(B(0, 1)) = \overline{B}(0, 1)$ (הסימן מצדיק את עצמו...) ו-

$$. B(0, 1)^\circ = B(0, 1)$$

נפעיל את ההדרגה ונקבל את המבוקש.