

תרגילי הכנה לבחון בחודו"א (אינפ) 1 ופתרונותיהם – ינואר 2024

להלן, 'הופריכו' = 'הוכיחו או הפריכו'.

חלק א'

1. הופריכו: קיימת סדרה a_n כך ש $0 \rightarrow a_n$ וכן $0 \cdot \frac{a_{n+1}}{a_n^2} \rightarrow$.
 2. הופריכו: קיימת סדרה a_n כך ש $0 \rightarrow a_n$ וכן $0 \cdot \frac{a_n^2}{a_{n+1}} \rightarrow$.
 3. תהי סדרה a_n המקיימת כי $0 \rightarrow (a_{n+1}^2 - a_n^2)$ וכן $1 \rightarrow \frac{a_{n+1}}{a_n}$, הופריכו: a_n מתכנסת לגבול סופי.
 4. תהי סדרה $0 > a_n$ המקיימת לכל $n \in \mathbb{N}$ כי $a_n - a_{n+1} \leq \frac{1}{n}$, הופריכו: הסדרה מתכנסת לגבול סופי.
 5. תהי סדרה $0 > a_n$ המקיימת לכל $n \in \mathbb{N}$ כי $a_n - a_{n+1} \leq a_n^2$, הופריכו: לכל n מתקיים כי $a_n < a_{n+1}$, וכן $0 \rightarrow a_n$.
 6. תהינה שלוש סדרות המקיימות לכל $n \in \mathbb{N}$ כי $a_n \leq c_n \leq b_n$, כך ש $0 \rightarrow a_n - b_n$ וכן $L \rightarrow c_n$, הופריכו: $L = \lim a_n$.
 7. תהי סדרה כך ש $a_1 = 2$ ולכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים כי $\frac{2a_{n-1}}{a_{n+4}} = a_{n+1}$, הוכיחו כי הסדרה מתכנסת וחשבו את גבוללה.
 8. יהיו $0 > a_1, b_1$ ונайдיר זוג סדרות ע"י $b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}$, $a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}$. הוכיחו כי שתי הסדרות מתכנסות לגבול סופי.
- בנוסף, הופריכו: $\lim a_n = \lim b_n$.
9. תהי $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$: פונקציה רציפה, הופריכו: קיימת נקודה $c \in [a, b]$ עבורה $f(c) = c$.
 10. **תהי $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$: פונקציה עולה (לאו דזוקא רציפה), הופריכו: קיימת נקודה $c \in [a, b]$ עבורה $f(c) = c$.
 11. ***תהי $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$: פונקציה עולה (לאו דזוקא רציפה), הופריכו: קיימת נקודה $c \in [a, b]$ עבורה $f(f(c)) = c$.
- כך ש f רציפה בנקודה c (אם c בקצה, אז ברציפות אנחנו מתחווים שהגובה בנקודה שווה לגבול החד צדי בנקודה).
12. **תהי f המקיימת כי $0 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ וכן $0 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x) - f(x)}{x}$, הופריכו: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$.
 13. תהי $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$: פונקציה רציפה ויהי $m \in \mathbb{R}$ כך שכל $x \in [a, b]$ מתקיים כי $m < f(x)$, הופריכו: קיימ $\epsilon > 0$ כך שכל $x \in [a, b]$ מתקיים כי $\epsilon + m > f(x)$.
 14. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$: רציפה בכל הממשיים, כך שאין לה קיצון מקומי, הופריכו: f מונוטונית (עליה או יורדת).
 15. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$: רציפה בכל הממשיים, כך שהיא מונוטונית (עליה או יורדת), הופריכו: אין ל f מקסימום.
 16. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$: מונוטונית עולה וחסומה, הופריכו: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ קיימ וסופי.
 17. יהי $K \in \mathbb{R}$ ותהי f המקיימת לכל $[a, b] \ni x_1, x_2$ כי $|f(x_1) - f(x_2)| \leq K|x_1 - x_2|$, הופריכו: f רציפה בכל $[a, b]$.
 18. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$: רציפה בכל הממשיים, ותהינה סדרות a_n, b_n כך ש $0 \rightarrow b_n - a_n$, הופריכו: $0 \rightarrow f(b_n) - f(a_n)$.
 19. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$: רציפה בכל הממשיים, הוכיחו כי קיימ פתרון למשוואת $f(x) = x$ אם ורק אם קיימ פתרון למשוואת $f(f(x)) = x$.
 20. הופריכו: לכל פולינום מדרגה אי-זוגית יש שורש ממשי.

21. תהינה $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה בכל הממשיים כך שלכל $\mathbb{Q} \in x$ מתקיים כי $f(x) = g(x)$, הופריכו: $f = g$.

22. תה $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה לכל $1 \neq x$ כך שלכל $\mathbb{Z} \in q$, x כך ש $q \neq 0, q \neq 1$ מתקיים כי $f\left(\frac{p}{q}\right) = \frac{q}{q-p}$

$$\text{הופריכו: } f(x) = \frac{1}{1-x} \text{ לכל } x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}.$$

23. תה $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ הרציפה בכל $\mathbb{Q} \in x$ הופריכו: קיימת $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$: g רציפה בכל הממשיים כך $g(x) = f(x)$ לכל $\mathbb{Q} \in x$.

24. תה $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה בכל הממשיים ויהי $\mathbb{R} \in T < 0$ כך שלכל $\mathbb{R} \in x$ מתקיים כי $f(x+T) = f(x)$.

$$\text{הופריכו: קיימת נקודה } \mathbb{R} \in c \text{ כך ש } f(c) = f\left(c + \frac{T}{2}\right)$$

25. תה f רציפה ב $[0,1]$ כך ש $f(0) = f(1)$, הופריכו: לכל $\mathbb{N} \in n$ קיימת נקודה $\mathbb{R} \in [0,1]$ כך ש $f\left(\frac{1}{n}\right) = f\left(\frac{1}{n+1}\right)$

26. תה f מונוטונית עולה המוגדרת בכל הממשיים, הופריכו: כל נקודת אי רציפות שלה היא ממין ראשון (קפיצית).

27. תה $[a, b] \rightarrow [a, b]$: f מונוטונית ועל, הופריכו: f רציפה ב $[a, b]$.

28. הופריכו: קיימת $[a, b] \rightarrow [c, d]$ רציפה, כך שלכל $\mathbb{R} \in [c, d]$ קיימים בדיקות שני מקורות $[b, a] \neq x_1 \neq x_2$ כך ש

$$f(x_1) = f(x_2) = y$$

29. תה $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה בכל הממשיים כך שלכל $\mathbb{R} \in x$ מתקיים כי $\mathbb{Q} \in f(x)$. הופריכו: f פונקציה קבועה.

30. תה $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה בכל הממשיים. הופריכו: f רציפה בכל הממשיים.

31. תה $[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$: f רציפה וחח"ע. הופריכו: f מונוטונית (עליה או יורדת).

32. תה $\mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$: רציפה המקיימת לכל $\mathbb{R} \in x \in [-1, 1]$ כי $1 = f(x) \geq x^2 + f^2(x) = 1$

$$\text{הופריכו: } f(x) = \sqrt{1 - x^2} \text{ לכל } x \in [-1, 1].$$

33. תה $A \rightarrow f: \mathbb{R}$ כך שלכל שתי סדרות המקיימות $a_n - b_n \rightarrow 0$ מתקיים $f(a_n) - f(b_n) \rightarrow 0$.

הופריכו: לכל $0 > \varepsilon > \delta$ כך שלכל $\delta < |x_1 - x_2|$ מתקיים כי $|\varepsilon| < |f(x_1) - f(x_2)|$.

34. * תה $\mathbb{R} \rightarrow (1, \infty)$: המקיימת לכל שתי סדרות $a_n - b_n \rightarrow 0$ כי $f(a_n) - f(b_n) \rightarrow 0$, הופריכו: $\frac{f(x)}{x}$ חסומה.

35. תה $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה בכל הממשיים כך ש $1 = f(1)$, הופריכו: קיימת $\mathbb{R} \in c$ כך ש $f(c) = -\ln(c)$.

36. תה f רציפה בקטע $[a, b]$, הופריכו: f חסומה מלעיל או שהיא חסומה מלרע.

37. תה $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$: רציפה וחובייה בכל הממשיים כך ש $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 0$, קיימת נקודה c עבורה $f(c) = 0$.

38. מצאו את המקסימום והמינימום של הפונקציה $f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} - (\sqrt{x+1} - \sqrt{x})$ בקטע $(\infty, 1]$, או שהוכחו שאינם קיימים.

39. תה f כך ש $1 > f'(x) \text{ לכל } x \in a, \text{ יהי } a_1 \in a \text{ ונגיד רצירה ע"י } a_{n+1} = f(a_n) \text{ לכל } \mathbb{N} \in n$. הופריכו: $\infty \rightarrow |a_n|$.

40. תה f המקיימת $1 = f(0), f'(0) > 1$, יהי $m > 1$ וכן לכל $\mathbb{R} \in x$ מתקיים כי $0 \leq f''(x) \leq mx$. חשבו את $f''(x)$.

41. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ הגזירה בכל הממשיים כך שלכל $\mathbb{R} \in x$ מתקאים $x < f'(x) < 0$ וכן $f(0) = 0$.

$$\text{הופריכו: לכל } 0 > x \text{ מתקיים כי } \frac{x^2}{2} < f(x).$$

42. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ הגזירה בכל הממשיים כך שלכל $\mathbb{R} \in x$ מתקאים $x < f'(x) < 0$ וכן $f(0) = 0$.

$$\text{חשבו את } \lim_{x \rightarrow (-\infty)} f(x).$$

43. תהי f עבורה $0 \geq f'(x) \geq f''(x)$ לכל $\mathbb{R} \in x$, הופריכו: לכל $\mathbb{R} \in x$ מתקיים כי $0 \geq f(x) \geq f'(x)$.

44. תהי f עבורה $0 \geq f'(x) \geq f''(x)$ לכל $\mathbb{R} \in x$, וכן $f(0) = 0$. הופריכו: לכל $0 < x$ מתקיים כי $0 = f(x)$.

45. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ הגזירה בכל הממשיים כך ש($f(x) = f''(x)$) לכל $\mathbb{R} \in x$. הופריכו: קיימת נקודה $\mathbb{R} \in c$ כך ש

$$(f'(c))^2 - f''(c) = 0.$$

*46. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ הגזירה בכל הממשיים כך ש($f(x) = f(f(x))$ לכל $\mathbb{R} \in x$). הופריכו: f הינה פונקציה קבועה או שנייה פונקציה זהות.

47. תהי f המקיימת $0 > f'(x)$ וכן $0 < f''(x)$ לכל $\mathbb{R} \in x < 0$. הופריכו: בהכרח לא מתקיים כי $1 = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$.

48. הופריכו: קיימת פונקציה f המקיימת $0 > f'(x)$ וכן $0 < f''(x)$ לכל $\mathbb{R} \in x$.

49. תהי f המקיימת $0 > f'(x)$ וכן $0 < f''(x)$ לכל $\mathbb{R} \in x < 0$. הופריכו: בהכרח לא מתקיים כי $0 = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$.

50. תהי f המקיימת $0 < f'(x)$ לכל $(0, 1) \in x$, הופריכו: בהכרח לא מתקיים כי $\infty = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.

51. תהי f המקיימת $0 < f'(x)$ לכל $(1, \infty) \in x$, הופריכו: בהכרח לא מתקיים כי $\infty = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$.

52. תהי f המקיימת $0 < f''(x)$ וכן $0 < f'(x) < 0$. הופריכו: בהכרח לא מתקיים כי $\infty = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$.

53. תהי f רציפה ב- $[a, b]$ וגזירה ב- (a, b) , הופריכו: f' חסומה בקטע (a, b) .

54. תהי תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ הגזירה בכל הממשיים כך ש- $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \infty$, הופריכו: קיימת נקודה c עבורה $0 = f'(c)$.

55. תהי f כך ש- $0 > f''(x)$ לכל $\mathbb{R} \in x$, הופריכו: $\infty = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$.

56. תהי f בעלת נגזרת מונוטונית עולה כך ש- $0 > f'(x)$ לכל $\mathbb{R} \in x$, הופריכו: $\infty = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$.

57. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ גזירה בכל הממשיים, הופריכו: f' רציפה בכל הממשיים.

58. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ גזירה בכל הממשיים, הופריכו: f' חסומה בכל קטע סופי ווגור $[a, b]$.

59. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ גזירה בכל הממשיים כך ש- $0 > f'(0)$, הופריכו: קיימת סביבה של $0 = x$ בה $0 > f'$.

60. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ כך ש- $0 > f'(0)$, וכן $0 = f(0)$. הופריכו: קיימת סביבה ימנית של $0 = x$ בה $0 > f$.

61. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה בכל הממשיים, הופריכו: קיימת נקודה $\mathbb{R} \in c$ כך ש- $f(f(c)) \neq -c$.

62. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ גזירה בכל הממשיים, כך ש- $0 \neq f'$ בכל הממשיים וכן $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 0$, הופריכו: $0 = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$.

63. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ גזירה בכל הממשיים, כך ש- $0 = f'$ בכל הממשיים, וכן $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 0$, הופריכו: $0 = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$.

64. הופריכו: הפתרונות היחדים למשוואת $3^x + 5^x = 4^x + 6^x$ הם $x = 0, 1$.

חלק ב' - תרגילים הכללים תת-סדרות וסדרות קושי:

65. תהי f רציפה וחסומה ב- $[a, b]$, גזירה ב- (a, b) , כך שהגבול $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ אינו קיים, הופריכו: f אינה חסומה ב- (a, b) .

66. תהי סדרה חסומה a_n המקיימת לכל $N \in \mathbb{N}$ כי $a_n - \frac{1}{2^n} \geq a_{n+1}$, הופריכו: a_n מתכנסת לגבול סופי.

67. יהי $1 < K < 0$ ותהי f המקיימת לכל $\mathbb{R} \ni x_2, x_1$ כי $|f(x_2) - f(x_1)| \leq K|x_2 - x_1|$.

תהי סדרה המקיימת $a_{n+1} = f(a_n)$ לכל $N \in \mathbb{N}$. הוכחו כי הסדרה מתכנסת $\mathbb{R} \ni c \rightarrow a$ וכן כי $c = f(c)$.

68. תהי סדרה a_n כך שקיימים $0 > \varepsilon > N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $K > n > m$ מתקיים כי $\varepsilon \geq |a_m - a_n|$, הופריכו: $\rightarrow |a_n|$.

69. תהי סדרה כך ש- $a_1 = 0$ ולכל $N \in \mathbb{N}$ מתקיים כי $\frac{a_{n+1}}{1+a_n} = a_n$. הוכחו כי הסדרה מתכנסת וחשבו את גבולה.

70. תהינה שלוש סדרות כך שלכל $N \in \mathbb{N}$ מתקיים כי $L \leq c_n \leq b_n \leq a_n$. עוד נניח כי $a_n \rightarrow b_n$. הופריכו: $L \rightarrow b_n$.

71. תהי $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$: רציפה בכל המשיים, כך שהגבולות $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ קיימים וסופיים. הופריכו: f חסומה.

פתרונות

1. הופריכו: קיימת סדרה a כך ש $0 \rightarrow a_n$ וכן 0 .

$$\text{הוכחה: נגיד סדרה } a_1 = 1 . a_{n+1} = \frac{a_n^2}{n}$$

$$\text{ברור ש } 0 \rightarrow \frac{a_{n+1}}{a_n^2} = \frac{1}{n} \text{ יותר להוכיח כי } 0 \rightarrow a_n .$$

קל להוכיח באינדוקציה כי לכל n מתקיים כי $0 \leq a_n \leq 1$ ולפי חצי סנדוויץ' על הרצפה מתקיים כי

$$a_n \rightarrow 0 \text{ וכן } a_{n+1} \rightarrow 0$$

2. הופריכו: קיימת סדרה a כך ש $0 \rightarrow a_n$ וכן 0 .

$$\text{הוכחה: הסדרה } a_n = \frac{1}{n} \text{ שואפת לאפס ומתקיים כי}$$

$$\frac{a_n^2}{a_{n+1}} = \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n+1}} = \frac{n+1}{n^2} = \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \rightarrow 0$$

3. תהי סדרה a המקיימת כי $0 \rightarrow \frac{a_{n+1}}{a_n}$, הופריכו: a_n מתכנסת לגבול סופי.

הפרכה: נביט בסדרה (n) ששואית לאינסוף.

$$a_{n+1}^2 - a_n^2 = (a_{n+1} - a_n)(a_{n+1} + a_n) = (\ln(n+1) - \ln(n))(\ln(n+1) + \ln(n)) = \ln\left(\frac{n+1}{n}\right)\ln((n+1)n) =$$

$$= \ln\left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{\ln(n^2+n)}\right)$$

כעת נחשב את הגבול בתחוםelog לפי כלל הe:

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{\ln(n^2+n)} \rightarrow e^{\lim\left(\ln(n^2+n)\left(1 + \frac{1}{n} - 1\right)\right)} = e^0 = 1$$

כיוון ש

$$\ln(n^2+n)\left(1 + \frac{1}{n} - 1\right) = \frac{\ln(n) + \ln(n+1)}{n} \rightarrow 0$$

ולכן

$$a_{n+1}^2 - a_n^2 \rightarrow \ln(1) = 0$$

icut

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\ln(n+1)}{\ln(n)} = \frac{\ln\left(n\left(1 + \frac{1}{n}\right)\right)}{\ln(n)} = \frac{\ln(n) + \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\ln(n)} = 1 + \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\ln(n)} \rightarrow 1$$

4. תהי סדרה $a_n > 0$ המקיים לכל $N \in \mathbb{N}$ כי $a_n - a_{n+1} \leq \frac{1}{n^2}$, הופריכו: הסדרה מתכנסת לגבול סופי.

הוכחה:

$$a_{n+1} - a_n \leq -\frac{1}{n^2} \leq 0$$

לכן מדובר בסדרה מונוטונית יורדת, וכיון שהיא חסומה מלרע ע"י אףו ולכן מתכנסת למספר סופי.

5. תהי סדרה $a_n > 0$ המקיים לכל $N \in \mathbb{N}$ כי $a_n - a_{n+1} \leq \frac{1}{n^2}$, הופריכו: לכל n מקיימים כי $\frac{1}{n} < a_n$, וכן $0 \rightarrow a_n$.

הוכחה: נוכיח באינדוקציה.

$$\text{ראשית, עבור } 1 = n \text{ צ"ל כי } 1 < a_1$$

נב"ש (נניח בשלילה) כי $1 \geq a_1$. נעביר אגף בנתון $a_1 - a_2 < 0$ ונקבל:

$$a_1^2 - a_1 \leq -a_2$$

אבל

$$a_1^2 - a_1 = a_1(a_1 - 1) \geq 0 > -a_2$$

בסתירה.

$$\text{בנתון } a \text{ עבורו } \frac{1}{n} < a_n \text{ נוכיח כי } \frac{1}{n+1} < a_{n+1}$$

מןנתון ע"י העברת אגפים קיבל כי

$$a_{n+1} \leq a_n - \frac{1}{n^2}$$

המקסימום של הפרבולה הבוצה $y = x^2 - x$ הוא בקודקood $x = \frac{1}{2}$ והוא שווה ל

$$\text{לכן עבור } 1 = n \text{ מקבלים כי } \frac{1}{2} < a_2$$

עבור $2 \geq n$ המיקסימום של הפרבולה הבוכה $x^2 - x$ בקטע $[0, \frac{1}{n}]$ הוא בנקודת

(הרי קודקוד הפרבולה ב- $x = \frac{1}{2}$ והוא חותכת את הציר ב- $0, 1 = x$)

לכן כיוון ש $\frac{1}{n} < 0$ נובע כי

$$a_n - a_n^2 < \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} = \frac{n-1}{n^2} = \frac{(n-1)(n+1)}{n^2(n+1)} = \frac{n^2-1}{n^2(n+1)} < \frac{n^2}{n^2(n+1)} = \frac{1}{n+1}$$

. 6. תהינה שלוש סדרות המקייםות לכל $\mathbb{N} \in n$ כי $b_n \leq a_n \leq c_n$ ו- $c_n - a_n \rightarrow 0$, הופריכו: L .

הוכחה: ראשית נחשיר a משלושת אגפי אי השוויון ונקבל כי

$$0 \leq b_n - a_n \leq c_n - a_n$$

ולכן לפि כלל הסנדוויץ' נקבל כי

$$b_n - a_n \rightarrow 0$$

ולכן גם

$$b_n - c_n = (b_n - a_n) + (a_n - c_n) \rightarrow 0$$

ולכן

$$a_n - L = a_n - b_n + b_n - L \rightarrow 0$$

ומכאן $L \rightarrow a$ ובאופן דומה אפשר להראות כי $L \rightarrow c_n$.

. 7. תהי סדרה כך ש $2 = a_1$ ולכל $\mathbb{N} \in n$ מתקיים כי $\frac{2a_{n-1}}{a_{n+4}}$

פתרונות –

ראשית נחקרו מה ניתן לומר אם שהסדרה מתכנסת. זה יעזר לנו להחליט מה אנחנו מעוניינים להוכיח, ולאחר מכן נעשו זאת.

אם הסדרה מתכנסת, נסמן $L \rightarrow a$ וכן $a_{n+1} \rightarrow a$ ונחשב את הגבול של שני צידי נוסחת הנסיגה:

$$\lim a_{n+1} = \lim \frac{2a_n - 1}{a_n + 4}$$

ונקבל כי

$$L = \frac{2L - 1}{L + 4}$$

$$L^2 + 4L = 2L - 1$$

$$(L + 1)^2 = 0$$

כלומר עד כה הוכחנו בלבד **שאם** יש גבול, אז הוא $-L$.

עתה נבדוק האם הסדרה מונוטונית וחסומה, אם כן זה **יוכיח** שיש לה גבול סופי, ולפ"י מה שראינו עד עכשוו אנו נדע מהו.

$$a_{n+1} - a_n = \frac{2a_n - 1}{a_n + 4} - a_n = \frac{2a_n - 1 - a_n^2 - 4a_n}{a_n + 4} = -\frac{(a_n + 1)^2}{a_n + 4}$$

אם לכל $N \in \mathbb{N}$ מתקיים כי $-1 < a_1 < a_2 < \dots < a_N < 4$, נובע כי $a_n + 4 > 3$ ולקן ההפרש שלילי והסדרה מונוטונית יורדת.

נוכח זאת באינדוקציה.

$$\text{עבור } 1 = a_1 \text{ מתקיים כי } -1 < 2 < a_1$$

בהתאם a_1 עבורו $-1 < a_1 < 2$ מתקיים כי

$$a_1 + 4 > 3$$

$$a_{n+1} = \frac{2a_n - 1}{a_n + 4} = \frac{2a_n + 8 - 8 - 1}{a_n + 4} = 2 - \frac{9}{a_n + 4} > 2 - \frac{9}{3} = -1$$

הוכחנו ש $-1 < a_n$ מכאן נובע באופן ישיר שהיא חסומה מלרע, ובאופן עdire' שהיא מונוטונית יורדת לפ"י החישובים לעיל. לכן הסדרה מונוטונית וחסומה ומוגנשת לגבול סופי. הראנו שגם היא מוגנשת לגבול סופי הגבול הוא מינוס אחד.

$$\text{לכן סה"כ } -1 \rightarrow a_n$$

8. יהיו $0 < a_1, b_1$ ונגדיר זוג סדרות ע"י $a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}$, $b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}$. הוכחו כי שתי הסדרות מתכנסות לגבול סופי.

בנוסף, הופריכו: $\lim a_n = \lim b_n$.

הוכחה:

ראשית קל להוכיח כי איברי שתי הסדרות חיוביים. כעת לפיה שיוויון הממצאים לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים:

$$b_{n+1} \leq a_{n+1}$$

הרי הממוצע הגאומטרי תמיד קטן או שווה לאלגברי.

מכאן ניתן להסיק כי לכל $n > n$ מתקיים $a_n \leq b_n$ וכן

$$b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n} \geq \sqrt{b_n b_n} = \sqrt{b_n^2} = b_n$$

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \leq \frac{a_n + a_n}{2} = \frac{2a_n}{2} = a_n$$

כלומר החל מהאיבר השני b_2 עולה, a_n יורדת.

סה"כ לכל $n \geq 2$

$$b_2 \leq b_n \leq a_n \leq a_2$$

לכן שתי הסדרות מונוטונית וחסומות וכן מתכנסות לגבול סופי.

מעבר לכך נסמן כי $L \rightarrow a_n$ וכן $M \rightarrow b_n$ על ידי השאפת שני צידי נסחאת הנסיגה a_n קיבל

$$L = \frac{L + M}{2}$$

וא"י פישוט nocih כי $M = L$ ולמעשה שתי הסדרות מתכנסות לאותו גבול.

9. תהא $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$ פונקציה רציפה, הופריכו: קיימת נקודה $c \in [a, b]$ עבור $c = f(c)$.

הוכחה: נعتبر אגף ונבנה פונקציה $x - f(x) = h(x)$, כך שקיימת נקודה $c \in [a, b]$ עבור $0 = h(c)$.

הפונקציה h רציפה כצירוף של רציפות בקטע $[a, b]$, אך לפי משפט ערך הביניים מספיק למצוא נקודה מעל הציר ונקודה מתחת לציר על מנת להוכיח שהן חיתוך עם הציר.

$$h(a) = f(a) - a \geq 0$$

זה נכון כיון ש $f(a) \in [a, b]$ לפי הטענה, ולכן $a \geq f(a)$

באופן דומה

$$h(b) = f(b) - b \leq 0$$

וains.

10. תהי $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$ פונקציה עולה (לאו דווקא רציפה), הופריכו: קיימת נקודה $c \in [a, b]$ עבורה $f(c) = c$

הוכחה:

כיון ש $f(a) \in [a, b]$ נובע כי $f(a) \geq a$.

נביט בקבוצה

$$A = \{x \in [a, b] | x \leq f(x)\}$$

הרגע הוכחנו שהיא אינה ריקה, ומוגן שהיא חסומה ולכן קיימים לה חסם עליון

$$M = \sup A \in [a, b]$$

לכל $x \in A$ מתקיים כי $M \leq x$ ולכן $f(M) \leq f(x)$ (כי הפונקציה עולה).

אבל כיון ש $A \subseteq [a, M]$ נובע כי

$$x \leq f(x) \leq f(M)$$

כלומר $f(M)$ היא חסם מלעיל של הקבוצה A , ומכיון ש M הוא החסם העליון הוא חסם המלעיל הקטן ביותר ונובע כי:

$$M \leq f(M)$$

לכן, שוב כיון שהפונקציה עולה,

$$f(M) \leq f(f(M))$$

כלומר בעצם $f(f(M)) \leq f(M)$, ולכן $f(f(M)) = f(M)$ וביחד סה"כ $f(M) = M$.

נבחר $M = c$ וקיבלנו בדיקת מה שרצינו.

11. **תהי $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$ פונקציה עולה (לא דזוקא רציפה), הופריכו: קיימת נקודה $c \in (a, b)$ עבורה $f(c) = c$.

כך ש f רציפה בנקודת c (אם c בקצתה, אז ברצייפות אנחנו מתחווים שהגובה בנקודת c שווה לגבול החד צדי בנקודת c).

הוכחה: כיון שהפונקציה עולה וחסומה בכל נקודה קיימים גבולות חד צדדיים סופיים.

נגידיר סדרת קטעים באופן הבא:

$$\text{הקטע הראשון הוא } [a_1, b_1] = [a, b]$$

אם $a = a_1$ אז כיון שהפונקציה מונוטונית וחסומה מלמטה ע"י $a = a_1$ נובע כי $a_1 = f(a_1)$ ולכן הפונקציה רציפה

. $\lim_{x \rightarrow a_1^+} f(x) = a_1$ כלומר $c = a_1$ וויימנו. אחרת, מתקיים כי $a_1 > c$

. $\lim_{x \rightarrow b_1^-} f(x) < b_1$ באופן דומה, אם לא סימנו אז $b_1 < f(x)$

נשمر על התכונה של הקטעים בה הגבול של הקצה השמאלי גדול מערך ציר האיקס של הקצה השמאלי, והגבול של הקצה הימני קטן מערך ציר האיקס של הקצה הימני.

$$\text{נביט באמצעות הקטע } d_1 = \frac{a_1 + b_1}{2}.$$

אם $\lim_{x \rightarrow d_1^-} f(x) < d_1$ אז נגידיר את הקטע הבא להיות

$$[a_2, b_2] = [a_1, d_1]$$

אם $\lim_{x \rightarrow d_1^+} f(x) > d_1$ אז נגידיר את הקטע הבא להיות

$$[a_2, b_2] = [d_1, b_1]$$

אחרת, $\lim_{x \rightarrow d_1^+} f(x) \leq d_1$ ו $\lim_{x \rightarrow d_1^-} f(x) \geq d_1$ וכיון שהפונקציה מונוטונית עולה נובע כי

$$\lim_{x \rightarrow d_1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow d_1^+} f(x) = d_1$$

וכיוון שבהכרח

$$\lim_{x \rightarrow d_1^-} f(x) \leq f(d_1) \leq \lim_{x \rightarrow d_1^+} f(x)$$

נובע כי $d_1 = f(d_1)$ והפונקציה רציפה בנקודת זו, ונבחר $c = d_1$ וויימנו.

כך אם לא נסויים אחר מספר סופי של צעדים, נבנה סדרת קטעים אינסופית. (בדומה להוכחת משפט ערך הביניים) ה策דים השמאליים של הקטעים מהווים סדרה מונוטונית עולה, ה策דים הימניים של הקטעים מהווים סדרה מונוטונית יורדת, שתי הסדרות חסומות ב- $[a, b]$, ואורך הקטעים שואף לאפס.

לכן קיימת נקודה $c \in [a, b] \rightarrow c$ כך ש $a_n, b_n \rightarrow c$

לכל a מתקיים כי

$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) \geq \lim_{x \rightarrow a_n^+} f(x) > a_n$$

$$\text{וכיוון ש } a_n \rightarrow c \text{ נובע כי } \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) \geq c$$

באופן דומה לכל b מתקיים כי

$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow b_n^-} f(x) < b_n$$

$$\text{וכיוון ש } b_n \rightarrow c \text{ נובע כי } \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) \leq c$$

סיה"כ כיוון שהפונקציה עולה נקבע כי

$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = c$$

ולכן

$$f(c) = c$$

והפונקציה רציפה בנקודה זו.

12. **תהי f המקיים כי $0 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ והפריכו: $0 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x) - f(x)}{x}$.

הוכחה:

יהי $\varepsilon > 0$

$$\text{כיוון ש } 0 \rightarrow \frac{f(2x) - f(x)}{x} \text{ קיימ } 0 > \delta \text{ כך שלכל } \delta < |x| \text{ מתקיים כי } \frac{|f(2x) - f(x)|}{x} < \frac{\varepsilon}{2}$$

עתה, לכל $0 < n$ נקבע בבירור הבא:

$$\left| \frac{f(x)}{x} \right| = \left| \frac{f(x) - f\left(\frac{2^{n-1}}{2^n}x\right) + f\left(\frac{2^{n-1}}{2^n}x\right) - f\left(\frac{2^{n-2}}{2^n}x\right) + f\left(\frac{2^{n-2}}{2^n}x\right) - \dots - f\left(\frac{1}{2^n}x\right) + f\left(\frac{1}{2^n}x\right)}{x} \right| \leq$$

$$\leq \frac{2^{n-1}}{2^n} \left| \frac{f(x) - f\left(\frac{2^{n-1}}{2^n}x\right)}{\frac{2^{n-1}}{2^n}x} \right| + \frac{2^{n-2}}{2^n} \left| \frac{f\left(\frac{2^{n-1}}{2^n}x\right) - f\left(\frac{2^{n-2}}{2^n}x\right)}{\frac{x}{2^n}} \right| + \dots + \frac{1}{2^n} \left| \frac{f\left(\frac{2}{2^n}x\right) - f\left(\frac{1}{2^n}x\right)}{\frac{x}{2^n}} \right| + \left| \frac{f\left(\frac{1}{2^n}x\right)}{x} \right|$$

אם $|x| < \delta_1$ אז לכל $n \leq k$ מתקיים כי

$$\frac{2^{k-1}}{2^n} \left| \frac{f\left(\frac{2^k}{2^n}x\right) - f\left(\frac{2^{k-1}}{2^n}x\right)}{\frac{2^{k-1}}{2^n}x} \right| = \frac{2^{k-1}}{2^n} \left| \frac{f\left(2 \cdot \frac{2^{k-1}}{2^n}x\right) - f\left(\frac{2^{k-1}}{2^n}x\right)}{\frac{2^{k-1}}{2^n}x} \right| \leq \frac{2^{k-1}}{2^n} \cdot \frac{\varepsilon}{2} = \frac{1}{2^{n-k+1}} \cdot \frac{\varepsilon}{2}$$

ולכן

$$\frac{2^{n-1}}{2^n} \left| \frac{f(x) - f\left(\frac{2^{n-1}}{2^n}x\right)}{\frac{2^{n-1}}{2^n}x} \right| + \frac{2^{n-2}}{2^n} \left| \frac{f\left(\frac{2^{n-1}}{2^n}x\right) - f\left(\frac{2^{n-2}}{2^n}x\right)}{\frac{x}{2^n}} \right| + \dots + \frac{1}{2^n} \left| \frac{f\left(\frac{2}{2^n}x\right) - f\left(\frac{1}{2^n}x\right)}{\frac{x}{2^n}} \right| \leq$$

$$\leq \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^n} \right) \frac{\varepsilon}{2} < \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^n} + \dots \right) \frac{\varepsilon}{2} = 1 \cdot \frac{\varepsilon}{2}$$

(המעבר האחרון הוא סכום סדרה הנדסית אינסופית.)

כעת, יהי x_0 המקיים $\delta_1 < |x_0|$.

כיוון ש $0 \rightarrow (x) f$ קיימים $0 > \delta_2$ כך שלכל $\delta < |x|$ מתקיים כי $\frac{\varepsilon}{2}$

נבחר a כך ש $\left| \frac{x_0}{2^n} \right| < \delta_2$ ולכן

$$\left| \frac{f\left(\frac{1}{2^n}x_0\right)}{x_0} \right| < \frac{\varepsilon}{2}$$

ביחד, לכל x המקיים כי $\delta_1 < |x|$ מתקיים כי

$$\left| \frac{f(x)}{x} \right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

כפי שרצינו.

13. תהי $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$: פונקציה רציפה ויהי $\varepsilon \in \mathbb{R}$ כך שלכל $m > (x) f$, הופריכו: קיימים $0 > \varepsilon$ כך

שלכל $x \in [a, b]$ מתקיים כי $\varepsilon + m > f(x)$.

הוכחה: לפי משפט וירשטראוס II הפונקציה f מקבלת מינימום כיוון שהיא רציפה בקטע הסגור $[a, b]$, במקרה $[a, b]$, $c \in [a, b]$.

כלומר לכל $x \in [a, b]$ מתקיים כי $f(c) \leq f(x)$.

כעת, לפי הנטוּן

$$m < f(c)$$

נימיך את חצי המרחק

$$\varepsilon = \frac{f(c) - m}{2}$$

ולכן

$$m + \varepsilon = m + \frac{f(c) - m}{2} = \frac{f(c) + m}{2}$$

הוא בדיק אמצע הקטע בין $(c) < f(c) < m + \varepsilon$

ולכן אכן לכל $x \in [a, b]$ מתקיים כי

$$m + \varepsilon < f(x)$$

14. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$: רציפה בכל הממשיים, אך שאי לה קיצון מקומי, הופריכו: f מונוטונית (עליה או יורדת).

הוכחה: נב"ש כי הפונקציה אינה עולה ואין לה יורדת, לכן קיימים שני זוגות של נקודות

$$x_1 < x_2, \quad x_3 < x_4$$

כך ש

$$f(x_1) < f(x_2), \quad f(x_3) > f(x_4)$$

נביט בקטע $[b, a]$ כך ש $x_1, x_2, x_3, x_4 \in (a, b)$.

לפי משפט וירשטראוס II הפונקציה מקבלת מינימום ומקסימום בקטע $[b, a]$ וכיון שאינו קיצון מקומי המקסימום והמינימום מתקבלים בקצות.

אם $f(b) = f(a)$ הפונקציה קבועה בקטע (כי המקסימום שווה למינימום) ולכן כל הנקודות בקטע הפתוח הן קיצון מקומי בסתירה. לכן $f(b) > f(a)$ או $f(a) > f(b)$.

נניח כי $f(b) > f(a)$ (ההוכחה עבור המקרה השני דומה).

נביט בקטע $[x_2, a]$. שוב לפי וירשטראוס הפונקציה מקבלת מקסימום ומינימום בקטע.

כיון ש $f(x_2) < f(x_1)$ המינימום לא מתקיים בקטע הימני.

כמו כן, כיון ש $f(a) < f(x_1)$ היא המקסימום בקטע $[b, a]$ נובע כי $f(x_1) > f(a)$.

לכן המינימום בקטע $[x_2, a]$ לא מתקבל בקצוות, אלא בפנים הקטע (בנוקודה בה הערך קטן או שווה ל $f(x_1)$), ולכן יש מינימום מקומי, בסתירה.

15. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה בכל המשיים, כך שהיא מונוטונית (עליה או יורדת), הופריכו: אין f מקסימום.

הפרכה: פונקציה קבועה הינה מונוטונית ומקבלת את המקסימום (והמינימום) בכל נוקודה.

16. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$: מונוטונית עולה וחסומה, הופריכו: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ קיים וסופי.

הוכחה: ההוכחה דומה לסדרות מונוטוניות וחסומות.

נסמן את החסם העליון של הפונקציה ב M .

לכל $0 < \varepsilon < f(K) - M$ קיים $K \in \mathbb{R}$ כך ש $M \leq f(K) \leq M + \varepsilon$ מתקיים כי

$$M - \varepsilon < f(K) \leq f(x) \leq M < M + \varepsilon$$

והוכחנו כי

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = M$$

אפשר להוכיח באופן דומה כי אם הפונקציה אינה חסומה מלעיל היא שואפת לאינסוף באינסוף.

17. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ותהי f המקיים לכל $|f(x_1) - f(x_2)| \leq K|x_1 - x_2|$, הופריכו: f רציפה ב $[a, b]$.

הוכחה:

תהי $x_n \in [a, b]$ כך ש $x_0 \rightarrow x_n$ צ"ל כי (x_0) רציפה ב $[a, b]$.

זה שקול לכך ש $0 \rightarrow f(x_n) - f(x_0)$ אכן

$$|f(x_n) - f(x_0)| \leq K|x_n - x_0| \rightarrow 0$$

ולפי חצי סנדוויץ' על הרצפה סיימנו.

18. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה בכל המשיים, ותהינה סדרות a_n, b_n כך ש $a_n - b_n \rightarrow 0$, הופריכו: $f(a_n) - f(b_n) \rightarrow 0$.

הפרכה:

נביט בפונקציה $x^2 = f(x)$ שהינה רציפה בכל המשיים, ונביט בזוג הסדרות

$$a_n = n + \frac{1}{n}$$

$$b_n = n$$

cut:

$$a_n - b_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0$$

אך

$$f(a_n) - f(b_n) = \left(n + \frac{1}{n}\right)^2 - n^2 = 2 - \frac{1}{n^2} \rightarrow 2 \neq 0$$

19. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה בכל הממשיים, הוכחו כי קיימם פתרון למשוואה $x = f(x)$ אם ורק אם קיימם פתרון למשוואה

$$f(f(x)) = x$$

הוכחה:

$$\text{בכיוון ראשון, נניח כי קיימת נקודה } c \text{ עבורה } f(c) = c$$

לכן

$$f(f(c)) = f(c) = c$$

ואותה נקודה הינה פתרון למשוואה השנייה.

$$\text{בכיוון השני, נניח כי קיימת נקודה } c \text{ עבורה } f(f(c)) = c$$

עת לעילנו להוכיח כי קיימם פתרון למשוואה $x = f(x)$. נעביר אגב וنبנה פונקציה

$$h(x) = f(x) - x$$

עלינו להוכיח שליה יש חיתוך עם ציר האיקס.

ה רציפה כזירה של רציפות, ולכן משפט ערך הביניים מספיק למצוא נקודה מעל הציר ונקודה מתחת לציר.

נציב בפונקציה את $(c, f(c))$

$$h(c) = f(c) - c$$

$$h(f(c)) = f(f(c)) - f(c) = c - f(c) = -h(c)$$

כיוון שמצאנו שני ערכים של הפונקציה $(c)f(c), h(c)$ עם סימנים מנוגדים, סימנו.

20. הופריכו: לכל פולינום מדרגה אי-זוגית יש שורש ממשי.

הוכחה: היא פולינום

$$p(x) = a_{2n+1}x^{2n+1} + \dots + a_0$$

כך ש $a_{2n+1} > 0$ (ההוכחה עבר מקדם שלילי דומה).

מה עושים במקרה "א" שלא יודעים להציב? מחשבים גבול!

$$\lim_{x \rightarrow \infty} p(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} x^{2n+1} \left(a_{2n+1} + \frac{a_{2n}}{x} + \dots + \frac{a_0}{x^{2n+1}} \right) = \{\infty \cdot a_{2n+1}\} = \infty$$

באופן דומה

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} p(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^{2n+1} \left(a_{2n+1} + \frac{a_{2n}}{x} + \dots + \frac{a_0}{x^{2n+1}} \right) = \{-\infty \cdot a_{2n+1}\} = -\infty$$

לכן קיימות נקודות כך ש

$$p(x_1) > 0 \quad p(x_2) < 0$$

וכיוון שפולינום הוא פונקציה רציפה לפי משפט ערך הביניים הוא חייב לחתוך את הציר.

21. תהינה $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$: f, g רציפות בכל הממשיים כך שלכל $\mathbb{Q} \in x$ מתקיים כי (f, g , הופריכו): $f = g$.

הוכחה:

תהי נקודה $\mathbb{R} \in x$ נבחר סדרה $x \rightarrow_n x$ כך שלכל n מתקיים כי $\mathbb{Q} \in x_n$

כיוון שהפונקציות רציפות מתקיים

$$f(x_n) \rightarrow f(x), \quad f(x_n) \rightarrow g(x)$$

אר לפי הנตอน (x_n) $f(x) = g(x)$ ולכן $f(x) = g(x)$.

22. תהי $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$: רציפה לכל $1 \neq x$ כך שלכל $\mathbb{Z} \in q, d$ כך ש $d \neq 0, q \neq 0$ מתקיים כי $\frac{q}{q-p}$

$$\text{הופריכו: } f(x) = \frac{1}{1-x} \text{ לכל } x \neq 1.$$

הוכחה:

תהי $x \in \mathbb{Q}$. קיימים $\mathbb{Z} \in q, d$ כך ש $d \neq 0, q \neq 0$ וכך $x = \frac{p}{q}$. לכן

$$\frac{1}{1-x} = \frac{1}{1-\frac{p}{q}} = \frac{q}{q-p} = f\left(\frac{p}{q}\right)$$

כיוון שהפונקציות $(x) f = \frac{1}{1-x}$ רציפות לכל $1 \neq x$ ושווי על הרציונליים שונים מ-1 הן שוות לכל $1 \neq x$ (בדומה לתרגיל קודם).

23. תהי $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$: רציפה בכל $\mathbb{Q} \in x$ הופריכו: קיימת $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$: רציפה בכל הממשיים כך $g(x) = f(x)$ לכל $\mathbb{Q} \in x$.

הפרכה:

הפונקציה $f(x) = \frac{1}{x-\sqrt{2}}$ רציפה בכל הרציונליים. תהי g השווה ל- f בכל הרציונליים.

תהי $x_n \rightarrow \sqrt{2}$ כך שלכל n מתקיים כי $\mathbb{Q} \in x_n$ אזי

$$g(x_n) = f(x_n) = \frac{1}{x_n - \sqrt{2}} = \left\{ \frac{1}{0^+} \right\} = \infty$$

לכן לפונקציה g אין גבול סופי בנקודה $\sqrt{2}$ ולכן אינה רציפה שם.

24. תהי $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$: רציפה בכל הממשיים ויהי $\mathbb{R} \in T < 0$ כך שלכל $\mathbb{R} \in x$ מתקיים כי $f(x+T) = f(x)$

$$\text{הופריכו: קיימת נקודה } \mathbb{R} \in c \text{ כך ש } f(c) = f\left(c + \frac{T}{2}\right)$$

הוכחה: נעביר אגד וنبנה פונקציה

$$h(x) = f(x) - f\left(x + \frac{T}{2}\right)$$

עלינו להוכיח שהפונקציה h חותכת את ציר האיקס.

הפונקציה h רציפה כצירוף רציפות, ולכן משפט ערך הביניים מספיק למצוא נקודה מעל הציר ונקודה מתחתלו.

נציב את הנקודות $\frac{T}{2}, 0$ ונזכיר שלפי הנתון

$$f(T) = f(0+T) = f(0)$$

$$h(0) = f(0) - f\left(\frac{T}{2}\right)$$

$$h\left(\frac{T}{2}\right) = f\left(\frac{T}{2}\right) - f(T) = f\left(\frac{T}{2}\right) - f(0) = -h(0)$$

מצאו שני נקודות עליהן הפונקציה מקבלת סימנים מנוגדים ולכון סימנו.

25. תה' f רציפה ב- $[0,1]$ כך ש $f(0) = f(1)$, הופריכו: לכל $n \in \mathbb{N}$ קיימת נקודה $c \in [0,1]$ כך ש

הוכחה: יהי $n \in \mathbb{N}$ נבחר אגף וنبנה פונקציה

$$h(x) = f(x) - f\left(x + \frac{1}{n}\right)$$

צריך להוכיח שקיימת נקודה c עבורה $h(c) = 0$.

הfonקציה h רציפה בתחום $\left[0, 1 - \frac{1}{n}\right]$ כצירוף של רציפות, ולכן לפי משפט ערך הביניים מספיק למצוא בתחום זה נקודה מעל

הציר ונקודה מתחתתי על מנת לסיים את ההוכחה.

נציב בה את הנקודות $0, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, \frac{n-1}{n} \in \left[0, 1 - \frac{1}{n}\right]$

$$h(0) = f(0) - f\left(\frac{1}{n}\right)$$

$$h\left(\frac{1}{n}\right) = f\left(\frac{1}{n}\right) - f\left(\frac{2}{n}\right)$$

⋮

$$h\left(\frac{n-1}{n}\right) = f\left(\frac{n-1}{n}\right) - f(1)$$

כעת נסכם את כל הערכים שמצאנו:

$$h(0) + h\left(\frac{1}{n}\right) + \dots + h\left(\frac{n-1}{n}\right) = f(0) - f\left(\frac{1}{n}\right) + f\left(\frac{1}{n}\right) - f\left(\frac{2}{n}\right) + \dots + f\left(\frac{n-1}{n}\right) - f(1)$$

מרבית האיברים מצטמצמים ונשארים נותרים עם $f(1) - f(0) = f(1) - f(0)$, אך לפי הנتوן $f(1) - f(0) = f(1) - f(0)$ ולכן סה"כ נמצא כי

$$h(0) + h\left(\frac{1}{n}\right) + \dots + h\left(\frac{n-1}{n}\right) = 0$$

כעת חייבים להיות שני איברים בעלי סימנים מנוגדים, או שיכולים מתאפסים.

כך או כך הוכחנו שהפונקציה f מתאפסת, כפי שרצינו.

26. תהי f מונוטונית עולה המוגדרת בכל הממשיים, הופריכו: כל נקודת אי רציפות שלה היא ממין ראשון (קפיותית).

הוכחה: ראשית נוכח כי לא תתקן נקודת אי רציפות סליקה.

תה x_0 כך ש $L = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ קיימosoфи, נוכח כי $f(x_0) = L$ ולכן הפונקציה רציפה בנקודת זו (ולכן לא תתקן נקודת אי רציפות סליקה).

כיוון שהפונקציה עולה, לכל $x < x_0$ מתקיים כי $f(x) \leq f(x_0)$ ולכן

$$L = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \leq f(x_0)$$

באופן דומה

$$L = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \geq f(x_0)$$

ושה"כ קיבלנו כי $f(x_0) \leq L$ וכן $f(x_0) \geq L$ ולכן $f(x_0) = L$ כפי שרצינו.

תהי x_0 כלשהו אז כיוון שהפונקציה מונוטונית עולה.

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \sup_{x \in (-\infty, x_0)} f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \inf_{x \in (x_0, \infty)} f(x)$$

שימו לב שבקטע (x_0, ∞) הפונקציה חסומה מלעיל ע"י $f(x_0)$ ובקטע $(-\infty, x_0)$ הפונקציה חסומה מלרע ע"י $f(x_0)$.

(הוכחה דומה לכך בתרגיל קודם, ובהוכחה שסדרות מונוטוניות וחסומות מתכנסות)

כיוון שני הגבולות החד צדדיים קיימיםosoфи, אם הם שוויים מדובר בנקודת רציפות, ואם הם שונים מדובר בנקודת אי רציפות ממין ראשון (קפיותית).

27. תהי $[a, b] \rightarrow [a, b]$: f מונוטונית ועל, הופריכו: f רציפה ב- $[a, b]$.

הוכחה: תה $x_0 \in (a, b)$. בדומה לתרגיל קודם, כיוון שהפונקציה מונוטונית מתקיים כי הגבולות החד צדדיים קיימיםosoфи.

אם הם שוויים, אז כמו בתרגיל קודם, הפונקציה רציפה ב- x_0 .

אחרת, אם

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) < \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \leq f(x_0) \leq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$$

נובע שאחד הצדדים לפחות אינו שווה, נטפל באחד המקרים והשני דומה.

נניח $f(x_0) < y < \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ נבחר נקודה $[a, b] \in y$ כך ש $f(x_0) < y < \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ (למשל אמצע הקטע) ונוכיח שלא יכול להיות לה מקור.

כיוון שהפונקציה עולה, לכל $x \leq x_0$ מתקיים כי $y < f(x) \leq f(x_0)$.

עת, נתון שהפונקציה על ולכן קיימים מוקורי x_1 כך ש $y = f(x_1)$, ולפי מה שראינו הרגע $x_1 < x_0$ ולכן בקטע $[x_1, x_0]$ המוקסימום הוא $f(x_1) = y$ כיוון שהפונקציה עולה.

ולכן $y \leq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ בסותירה.

באופן דומה אם $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) < f(b)$ או $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) > f(a)$ סה"כ הפונקציה רציפה בקטע הסגור $[a, b]$.

28. הופריכו: קיימת $f: [a, b] \rightarrow [c, d]$ רציפה, כך שלכל $[c, d] \in y$ קיימים בדיק שני מקורות $[a, b]$ כך ש

$$f(x_1) = f(x_2) = y$$

הפרכה: נב"ש כי קיימת פונקציה כזו.

נסמן את המקורות של c ב- $a_1 < a_2$ ואת המקורות של d ב- $b_1 < b_2$.

נחלק למקורים שונים של הסדר בין ארבעת הנקודות ונראה שכולם מובילים לסתירה.

$$a_1 < a_2 < b_1 < b_2$$

נניח נקודת כלשהי x בקטע הפתוח (a_1, a_2) , כיוון שלכל איבר יש בדיק שני מקורות ולא יותר

$$c < f(x) < d \quad \text{וכיוון ש} \quad x \in (c, d) \quad \text{nובע כי}$$

$$c < m < f(x) < d$$

לפי משפט ערך הביניים, כיוון שהפונקציה רציפה, חייבים להיות לפחות 2^m מקורות בשלושת הקטעים $(a_1, x), (x, a_2), (a_2, b_1)$ בסתירה.

$$\text{מקרה שני: } b_2 < a_2 < a_1$$

עבור $\frac{c+d}{2} = m$ חייבים להיות לפחות 2^m מקורות בשלושת הקטעים $(b_1, a_2), (a_2, b_2), (a_1, b_1)$ בסתירה.

$$\text{מקרה שלישי: } a_1 < b_1 < b_2 < a_2$$

תהי נקודה $(b_1, b_2) \in x$ אזי $f(x) \in f(b_1), (b_2, a_2), (a_2, a_1), (a_1, b_1)$ בסתירה.

מקרה רביעי: $a_2 < b_1 < a_1 < b_2 < a_1 < b_1 < a_2$ דומה לראשון.

29. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$: רציפה בכל הממשיים כך שלכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים כי $\mathbb{Q} \in f(x)$. הופריכו: f פונקציה קבועה.

הוכחה: נב"ש כי הפונקציה אינה קבועה, לכן קיימות שתי נקודות כך $f(x_1) \neq f(x_2)$

בין $f(x_1), f(x_2)$ קיימים מספר אי רציוני, ולפי משפט ערך הביניים חייב להיות לו מקור כי הפונקציה רציפה, בסתירה לכך $\mathbb{Q} \in f(x)$ לכל $x \in \mathbb{R}$.

30. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ כך ש $f(f(x)) = x$ רציפה בכל הממשיים. הופריכו: f רציפה בכל הממשיים.

הפרכה:

נביט בפונקציית דיריללה שאינה רציפה באף נקודה

$$D(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

כיוון ש $D(0) = D(1) = 1$ מתקיים לכל $x \in \mathbb{R}$ כי

$$D(D(x)) = 1$$

כלומר $D(D(x)) = 1$ היא הפונקציה הקבועה שהינה רציפה בכל הממשיים.

31. תהי $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$: רציפה וחח"ע. הופריכו: f מונוטונית (עליה או יורדת).

הוכחה: כיוון שהפונקציה חח"ע $f(a) \neq f(b)$, נניח כי $f(a) > f(b)$ וnochich כי הפונקציה עולה בקטע (a, b) (אם $f(b) > f(a)$ ניתן להוכיח באופן דומה כי הפונקציה מונוטונית יורדת).

נב"ש שהפונקציה אינה עולה, لكن קיימות $[a, b] \ni x_1 < x_2 \in [a, b]$ כך ש $f(x_1) > f(x_2)$.

אם $x_1 < a$ נבחר גובה m כך ש $f(a) < m < f(x_1)$ ולפי משפט ערך הביניים כיוון שהפונקציה רציפה קיימים מקורות ל m בקטעים $(x_1, a), (x_1, x_2)$ בסתירה לחת"ע.

אחרת, $f(b) > f(a) > f(x_1) \text{ וכאן } f(b) > f(x_1)$ בסתירה לחת"ע.

נבחר גובה m כך ש $f(x_2) < m < f(x_1), f(b) < m$ בקטעים $(x_1, x_2), (x_2, b)$ בסתירה לחת"ע.

32. תהי $\mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$: f רציפה המקיים לכל $x \in [-1, 1]$ כי $1 = f(0) = x^2 + f^2(x)$ וכי $1 = f(1) = \sqrt{1 - x^2}$.

הופריכו: $x \in [-1, 1] \Rightarrow f(x) = \sqrt{1 - x^2}$

הוכחה:

כיוון ש $x^2 - 1 = 1 - x^2$ נובע כי לכל $x \in [-1, 1]$ מתקיים כי $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$ או $f(x) = -\sqrt{1 - x^2}$

נשים לב כי c או $-c$ נובע כי $f(-1) = f(1) = 0$.

נב"ש כי קיים $x \in (-1, 1)$ כך ש $f(x) \neq \sqrt{1 - x^2}$ וכאן $f(x) = -\sqrt{1 - x^2}$.

כיוון ש $0 < f(c) < f(0) = 0$ וכן הפונקציה רציפה, לפי משפט ערך הביניים קיימת נקודה c בין 0 לבין c עבורה $0 = f(c)$.

כיוון ש $0 < f(-c) < f(0) = 0$ נובע כי $f(-c) = 0$.

נציב בנתון $1 = c^2 + f^2(c) = c^2 + f^2(-c)$ בסתירה.

33. תהי $A \rightarrow \mathbb{R}$: f כך שלכל שתי סדרות המקיים $a_n - b_n \rightarrow 0$ מתקיים $f(a_n) - f(b_n) \rightarrow 0$.

הופריכו: לכל $\epsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שלכל $|x_1 - x_2| < \delta$ מתקיים כי $|f(x_1) - f(x_2)| < \epsilon$.

הוכחה:

נב"ש כי קיים $\epsilon > 0$ כך שלכל $\delta > 0$ קיימ זוג נקודות x_1, x_2 כך ש $|x_1 - x_2| < \delta$ ו $|f(x_1) - f(x_2)| \geq \epsilon$.

לכן, לכל $\Delta \in A$ קיימ זוג נקודות a_n, b_n כך ש $|a_n - b_n| < \frac{1}{n}$ ו $|f(a_n) - f(b_n)| \geq \epsilon$.

לכן לפי חצי סנדוויץ' על הרצפה $0 \rightarrow |a_n - b_n| \rightarrow |f(a_n) - f(b_n)|$ בסתירה לנחתון.

34. תהי $\mathbb{R} \rightarrow (\infty, \infty]$: f המקיים לכל שתי סדרות $a_n - b_n \rightarrow 0$ כך ש $f(a_n) - f(b_n) \rightarrow 0$, הופריכו: $\frac{f(x)}{x}$ חסומה.

הוכחה: לפי תרגיל קודם, לכל $\epsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שלכל $|x_1 - x_2| < \delta$ מתקיים כי $|f(x_1) - f(x_2)| < \epsilon$.

לכן בפרט עבור $1 = \epsilon$ (יכלנו לבחור כל גודל חיובי כאנו), קיים $\delta > 0$ כך שלכל $|x_1 - x_2| < \delta$ מתקיים $|f(x_1) - f(x_2)| < 1$.

כיוון ש $\delta < \frac{\delta}{2}$ נובע כי אם $|x_1 - x_2| \leq \frac{\delta}{2}$ אז $|f(x_1) - f(x_2)| < 1$.

יה' $x \in [1, \infty)$, ונבטא בסדרת הנקודות:

$$1, 1 + \frac{\delta}{2}, 1 + 2 \cdot \frac{\delta}{2}, \dots, 1 + k \cdot \frac{\delta}{2}$$

כך ש

$$1 + (k-1) \cdot \frac{\delta}{2} < x \leq 1 + k \cdot \frac{\delta}{2}$$

(כלומר המשיכנו את סדרת הנקודות עד שהגענו ל x , זה אפשרי כיוון ש $\infty \rightarrow \infty$).

icut, לפי א' השוויון השמאלי,

$$(k-1) \cdot \frac{\delta}{2} < 1 + (k-1) \cdot \frac{\delta}{2} < x$$

לכן

$$k-1 < \frac{2x}{\delta}$$

ולכן

$$k < 1 + \frac{2x}{\delta}$$

icut,

$$|f(x) - f(1)| =$$

$$\begin{aligned} &= \left| f(x) - f\left(1 + (k-1) \cdot \frac{\delta}{2}\right) + f\left(1 + (k-1) \cdot \frac{\delta}{2}\right) - \dots + f\left(1 + 2 \cdot \frac{\delta}{2}\right) - f\left(1 + \frac{\delta}{2}\right) + f\left(1 + \frac{\delta}{2}\right) - f(1) \right| \leq \\ &\leq \left| f(x) - f\left(1 + (k-1) \cdot \frac{\delta}{2}\right) \right| + \dots + \left| f\left(1 + 2 \cdot \frac{\delta}{2}\right) - f\left(1 + \frac{\delta}{2}\right) \right| + \left| f\left(1 + \frac{\delta}{2}\right) - f(1) \right| \end{aligned}$$

כיוון שההפרש בין כל שתי נקודות בציר האיקס שווה $\frac{\delta}{2}$ (פרט לזוג הראשון בו ההפרש קטן מ- $\frac{\delta}{2}$), נובע כי ההפרש בציר ה y קטן מ-1.

ומכיוון שיש нам k זוגות, סה"כ אנו מקבלים כי

$$|f(x) - f(1)| < k < 1 + \frac{2x}{\delta}$$

$$f(1) - \left(1 + \frac{2x}{\delta}\right) < f(x) < f(1) + 1 + \frac{2x}{\delta}$$

נחלק את כל צידי אי השוויון בקבוע x החובי ונקבל כי

$$\frac{f(1) - 1}{x} - \frac{2}{\delta} < \frac{f(x)}{x} < \frac{f(1) + 1}{x} + \frac{2}{\delta}$$

לבסוף נותר להוכיח שהביטויים $\frac{f(1) \pm 1}{x}$ חסומים בתחום $(\infty, 1]$ ללא תלות בא, זה נובע למשל מכך ש $0 = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(1) \pm 1}{x}$, אך

אפשר להוכיח את זה ישירות בקלות על ידי חלוקה למקרים בהם הביטוי במונה שלילי או חיובי.

זה"כ הוכחנו שיש קבועים M, m שלא תלויים בנקודה x כך ש $m \leq f(x) \leq M$ לכל $x \in (\infty, 1]$ כפי שרצינו.

35. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה בכל הממשיים כך ש $1 = f(1)$, הופריכו: קיימת $c \in \mathbb{R}$ כך ש $f(c) = -\ln(c)$.

הוכחה: נعتبر אגף ונבנה פונקציה $h(x) = f(x) + \ln(x)$ הרציפה ב $(\infty, 0)$.

לפי משפט ערך הביניים, מספיק למצוא נקודה מעל הציר ונקודה מתחתיתו.

$$h(1) = f(1) + \ln(1) = 1 + 0 = 1 > 0$$

כעת, מה עושים בחזרה? שאי אפשר להציב? מחשבים גבול!

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = \{f(0) - \infty\} = -\infty$$

לכן קיימת נקודה $d > 0$ בה $h(d) < 0$.

הפונקציה h רציפה בקטע הסגור שבין $1, d$ ולכן לפי משפט ערך הביניים קיימת בקטע נקודה c עבורה $0 = h(c)$.

36. תהי f רציפה בקטע $[a, b]$, הופריכו: f חסומה מלעיל או שהיא חסומה מלרע.

הפרכה: נביט בפונקציה

$$f(x) = \frac{\sin(\frac{1}{x})}{x}$$

הרציפה בקטע $[0, 1]$.

نبיט בסדרות הבאות הנמצאות בקטע

$$0 < a_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2\pi n} \rightarrow 0, \quad 0 < b_n = \frac{1}{-\frac{\pi}{2} + 2\pi n} \rightarrow 0$$

$$f(a_n) = \frac{\pi}{2} + 2\pi n \rightarrow \infty$$

$$f(b_n) = -\left(-\frac{\pi}{2} + 2\pi n\right) \rightarrow -\infty$$

ולכן הפונקציה אינה חסומה מלעיל וaina חסומה מלרע בקטע.

37. תהי $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$: רציפה וחובית בכל הממשיים כר ש $0 = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$, קיימת נקודה c עבורה $c = f(c)$.

הוכחה: נعتبر אגף ונבנה פונקציה $x - (x) = h(x)$ הרציפה בכל הממשיים כצירוף רציפות, נמצא נקודה מעל הציר ומתחת לציר וכך לפי ערך הביניים נוכיח כי h חותכת את הציר כפי שרצינו.

$$h(0) = f(0) - 0 = f(0) > 0$$

עת, מה עושים בחדו"א כשאי אפשר להציב? מחשבים גבoli!

$$\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} x \left(\frac{f(x)}{x} - 1 \right) = \{ \infty \cdot (0 - 1) \} = -\infty$$

לכן קיימת נקודה $d > 0$ בה $0 < h(d)$.

ולכן לפי ערך הביניים הפונקציה חותכת את הציר בקטע בין $d, 0$, כפי שרצינו.

38. מצאו את המקסימום והמינימום של הפונקציה $f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} - (\sqrt{x+1} - \sqrt{x})$ בקטע $(\infty, 1]$, או שהוכחו שאינם קיימים.

פתרונות –

ראשית, זה מפתחה לגזרת הפונקציה על מנת לחשב את תחומי העליה והירידה, אך במקרה הזה הנגזרת תוביל אותנו לביטוי מורכב במיוחד.

לכן, במקום 'לגזר כmo חמור', נפשט את הביטוי המקורי קודם כל.

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2\sqrt{x}} - (\sqrt{x+1} - \sqrt{x}) = \frac{1}{2\sqrt{x}} - (\sqrt{x+1} - \sqrt{x}) \cdot \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} = \\ &= \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} = \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x} - 2\sqrt{x}}{2\sqrt{x}(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})} = \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x}}{2\sqrt{x}(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})} = \\ &= \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x}}{2\sqrt{x}(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})} \cdot \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})^2} \end{aligned}$$

הפלא ופלא! קיבלנו אחד חלקי ביטוי חיובי מונוטונית עולה בקטע, ולכן הפונקציה מונוטונית יורדת בתחום.

מכאן, הפונקציה מקבלת את המקסימום שלה בקצה השמאלי של הקטע $(-\infty, 1]$ כלומר המקסימום הוא

$$f(1) = \frac{1}{2(\sqrt{2} + 1)^2}$$

כעת מה לגבי מינימום? לא ניתן להציב את הקצה הימני, אז מה עושים במקרה כזה? מחשבים גבוי!

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{2\sqrt{x}(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})^2} = \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{\infty} \\ 0 \end{array} \right\} = 0$$

לכן אם יש מינימום הוא חייב להיות אפס. הר' הפונקציה תהא נמוכה מכל גודל שגדול ממנו, ואם מתייחסו הייתה מקבלת ערך שקטן מzero, כיוון שהיא יורדת הגבול היה צריך להיות קטן מzero.

וכמובן שהפונקציה לא יכולה להתאפס כיוון שההמונה הוא 1, וכך אין מינימום.

39. תה' f כך $f'(x) > 1$ לכל $x \in \mathbb{R}$, יהי $a_1 \in \mathbb{R}$ ונגיד רצורה ע"י $a_{n+1} = f(a_n)$ לכל $n \in \mathbb{N}$. חoperico: $\infty \rightarrow |a_n|$.

הפרנה:

נביט בפונקציה $x = f(x)$ שנגזרתה היא $1 < f'(x) = 2$.

נציב את האיבר הראשון $0 = a_1$ ונקבל את הסדרה הקבועה $0 \rightarrow a_n$.

40. תה' f המקיים $f'(0) = 1 > m$ ו $f''(x) \leq 0$ מתקיים כי $f''(x) \leq 0$. חשבו את $f''(x)$.

פתרון –

כיוון ש $0 \leq f''(x)$ הנגזרת הראשונה מונוטונית יורדת.

לכן לכל $0 \geq x$ מתקיים כי $1 \leq f'(x)$.

נעביר אגף $0 \leq -1 \leq f'(x) - 1$, ונביט בפונקציה הקודומה

$$h(x) = f(x) - x$$

כלומר ראיינו כי $0 \leq h'(x) \leq f'(x) - 1 \leq 0$ לכל $x \geq 0$ ולכן הפונקציה יורדת בתחום ו $h(0) \geq h(x)$.

במילים אחרות, $0 \leq x \leq h(x)$

$$f(x) - x \leq f(0) - 0$$

$$f(x) \leq x + f(0)$$

נחוור לשאלה,

$$f(x) - mx \leq x + f(0) - mx = (1-m)x + f(0) \rightarrow -\infty$$

הגבול הוא מינוס אינסוף כיון ש $0 < m - 1$

ולכן לפי חצי סנדוויץ'

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) - mx = -\infty$$

41. תהי $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$: הגדרה בכל הממשיים כך שלכל $\mathbb{R} \in x$ מתקיים $x < f'(x)$ וכן $f(0) = 0$.

הופריכו: לכל $0 > x$ מתקיים כי $\frac{x^2}{2} < f(x)$.

הוכחה: נעביר אגד וنبנה פונקציה

$$h(x) = f(x) - \frac{x^2}{2}$$

שאנו צריכים להוכיח שהיא שלילית לכל $0 > x$.

כיון ש $0 = 0 - (0)h$, מספיק להוכיח כי הפונקציה מונוטונית יורדת בתחום $0 \geq x$

אכן, אף לכל הממשיים,

$$h'(x) = f'(x) - x < 0$$

כפי שרצינו.

42. תהי $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$: הגדרה בכל הממשיים כך שלכל $\mathbb{R} \in x$ מתקיים $x < f'(x)$ וכן $f(0) = 0$.

חשבו את $\lim_{x \rightarrow (-\infty)} f(x)$.

פתרונות –

נעביר אגד $0 < x - f(x)$ ונביט בפונקציה הקדומה

$$h(x) = f(x) - \frac{x^2}{2}$$

לכל $\mathbb{R} \in x$ מתקיים כי $0 < h'(x) = f'(x) - x$ ולכן הפונקציה h יורדת בכל הממשיים.

כעת, נציב $0 = x$ ונקבל כי $0 = 0 = f(0) - 0$

לכן לכל $0 < x$ כיוון שהיורדת מתקיים כי $0 = h(0) > h(x)$

לכן לכל $0 < x$ מתקיים כי

$$h(x) = f(x) - \frac{x^2}{2} > 0$$

$$\text{ולכן } f(x) > \frac{x^2}{2}$$

לפי חצי סנדוויץ' נקבל כי

$$\lim_{x \rightarrow (-\infty)} f(x) = \infty$$

43. תהי f עבורה $0 \geq f'(x) \geq f''(x)$ לכל $x \in \mathbb{R}$, הופריכו: לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים כי $0 \geq f(x)$.

הפרכה: כל פונקציה שלילית וירדת תהווה דוגמא נגדית, למשל $f(x) = -e^x$

$$f(x) = (-e^x)^2 \geq 0$$

44. תהי f עבורה $0 \geq f'(x) \geq f''(x)$ לכל $x \in \mathbb{R}$, וכי $f(0) = 0$ הופריכו: לכל $0 < x$ מתקיים כי $0 = f(x)$.

הוכחה: נשים לב כי

$$\left(\frac{f^2(x)}{2}\right)' = \frac{1}{2} \cdot 2f(x)f'(x) \geq 0$$

לכן הפונקציה $(x)^2 f$ מונוטונית עולה בכל הממשיים.

כיוון שנתנו כי $0 = f(0)$ נובע כי $0 = f^2(0)$.

ביחד, לכל $0 < x$

$$0 \leq f^2(x) \leq f^2(0) = 0$$

(כיוון ש $(x)^2 f$ עולה וכמו כן אי שלילית.)

כלומר $0 = f^2(0)$ ולכן $0 = f(0)$, כפי שרצינו.

45. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ הגזירה בכל הממשיים כך ש($f(x) = f(f(x))$ לכל $x \in \mathbb{R}$). הופריכו: קיימת נקודה $c \in \mathbb{R}$ כך ש

$$(f'(c))^2 - f'(c) = 0$$

הוכחה: נגזר את שני צידי השוויון ($f(x) = f(f(x))$ ונקבל כי

$$f'(f(x))f'(x) = f'(x)$$

נעביר אגף וונציא גורם משותף

$$f'(x)(f'(f(x)) - 1) = 0$$

יה $x \in \mathbb{R}$. אם $f'(x) = 0$ נבחר $x = c$ וסימנו.

אחרת, $f'(f(x)) - 1 = 0$, נבחר $x = c$ וסימנו.

(הרי ה $f'(c) = 0$ זה מפסות את $f'(c) = 1$)

46. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ הגזירה בכל הממשיים כך ש($f(x) = f(f(x))$ לכל $x \in \mathbb{R}$). הופריכו: f הינה פונקציה קבועה או שהיא

פונקציית הזהות.

הוכחה: נניח ש f אינה פונקציה קבועה, ונוכיח שלכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים כי $x = f(x)$.

ראשית, לכל איבר בתמונה ($Im(f) \subseteq \mathbb{R}$) מתקיים כי $f(t) = x$ ולכן

$$f(x) = f(f(t)) = f(t) = x$$

כלומר הפונקציה חיבת לשלוח כל איבר בתמונה לעצמו, אנחנו רוצים להוכיח כי $Im(f) = \mathbb{R}$ וילך מדובר בפונקציית הזהות,

הרי לכל $x \in \mathbb{R}$ יתקיים $x \in Im(f)$ ולכן $x = f(x)$.

כיוון שהפונקציה גזירה היא רציפה, וילך לכל שתי נקודות $a, b \in Im(f)$ מתקיים כי $[a, b] \subseteq Im(f)$ לפי משפט ערך הביניים.

מכאן נובע די בקלות כי אם $Im(f) \neq \mathbb{R}$ אינה חסומה מלעיל ומלרע אז בהכרח $Im(f) = \mathbb{R}$, הרי לכל נקודה יש איבר גדול ממנו בתמונה (כי אינה חסומה מלעיל) ואיבר קטן ממנו בתמונה (כי אינה חסומה מלרע) ולכן כל הקטע ביןן מוכל בתמונה וכך גם הנקודה שלנו.

נב"ש כי התמונה חסומה מלרע (הוכחה עברו חסם מלעיל דומה), ונסמן את החסם התיכון שלו ב

$$m = \inf(f(x))$$

ונכיח ראשית כי $m = f(m)$.

אחרת, $(Im(f) \notin m)$, ולכן ניתן לנקוט סדרת נקודות $a_n \in Im(f)$ כך ש $a_n \rightarrow m$.

כיון שהפונקציה רציפה,

$$f(a_n) \rightarrow f(m)$$

אך כיוון ש($Im(f)$) מתקיים כי $a_n = f(a_n) = a_n$ וביחד עם העובדה ש $a_n \rightarrow m$.

נובע כי $m = f(m)$ בסתירה.

כיון שהנחנו שהפונקציה אינה קבועה, קיימן ערך נוסף בתמונה $m < b \in Im(f)$.

לכל $x \in [m, b]$ מתקיים כי $x = f(x)$ וביחד עם הנחתנו שהפונקציה גזירה אנו מקבלים כי

$$f'(m) = \lim_{x \rightarrow m} \frac{f(x) - f(m)}{x - m} = \lim_{x \rightarrow m^+} \frac{x - m}{x - m} = 1$$

אבל, כיוון ש*m* הוא המינימום של התמונה, לכל $\mathbb{R} \in x$ מתקיים כי $m \geq f(x)$, ולכן:

$$f'(m) = \lim_{x \rightarrow m} \frac{f(x) - f(m)}{x - m} = \lim_{x \rightarrow m^-} \frac{f(x) - f(m)}{x - m} = \lim_{x \rightarrow m^-} \frac{f(x) - m}{x - m} \leq 0$$

(אי השיוויון האחרון הוא כיוון שהמונה אי שלילי והמכנה שלילי.)

וקיבלנו כי $0 \leq f'(m) = 1$, בסתירה.

47. תהי f המקיימת $0 > f(x)$ וכן $0 < f''(x)$ לכל $\mathbb{R} \in x > 0$. הופריכו: בהכרח לא מתקיים כי $1 = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$.

הפרכה: עלינו למצוא פונקציה חיובית וボכה בעלת אסימפטוטה אופקית $1 = x$ מימין.

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \arctan(x) + \frac{1}{2}$$

קל לוודא שהיא מקיימת את כל הדרושים.

48. הופריכו: קיימת פונקציה f המקיימת $0 > f(x)$ וכן $0 < f''(x)$ לכל $\mathbb{R} \in x$.

הפרכה: נב"ש כי קיימת פונקציה כזו. כיוון שהנגזרת השנייה שלילית, הנגזרת הראשונה יורדת.

ראשית, נניח כי קיימת נקודה a בה $0 < f'(a)$.

כיוון שהפונקציה יורדת מתקיים כי לכל $a \geq x$ מתקיים כי $(a)'f(x) \leq f'(x)$.

נעביר אגף וنبיט בפונקציה הקודומה

$$h(x) = f(x) - f'(a)x$$

מהנתונים נובע כי

$$h'(x) = f'(x) - f'(a) \leq 0$$

ולכן $(x)h$ יורדת ולכל $a \geq x$ מתקיים כי

$$h(x) \leq h(a)$$

כלומר

$$f(x) - f'(a)x \leq f(a) - f'(a)a$$

ולכן לכל $a \geq x$

$$f(x) \leq f'(a)x + f(a) - f'(a)a$$

כיוון ש $0 < (a)'f$ הצד הימני שואף למינוס אינסוף כאשר $\infty \rightarrow x$ ולכן לפי חצי סנדוויץ' גם $\infty - = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ בסתירה לכך

שהפונקציה חיובית בכל הממשיים.

עת, נניח כי קיימת נקודה a עבורה $0 > (a)'f$.

כיוון ש f' יורדת, נובע כי לכל $a \leq x$ מתקיים $f'(x) \geq f'(a)$.

נעביר אגף וنبיט בפונקציה הקודומה

$$h(x) = f(x) - f'(a)x$$

לכל $a \leq x$ מתקיים כי $0 \geq h'(x)$

לכן לכל $a \leq x$ מתקיים כי

$$h(x) \leq h(a)$$

כלומר

$$f(x) - f'(a)x \leq f(a) - f'(a)a$$

ומכאן לכל $a \leq x$ מתקיים

$$f(x) \leq f'(a)x + f(a) - f'(a)a$$

כיון ש $0 > (a)' f$ נובע כי

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(a)x + f(a) - f'(a)a = -\infty$$

ולכן לפי חץ סנדוויץ' נובע כי $\infty = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ בסתירה לכך שהפונקציה חיובית בכל הממשיים.

לבסוף, נותרנו עם המצב לפיו הנגזרת קבועה אפס, ומכאן גם הנגזרת השנייה קבועה אפס בסתירה.

49. תהי f המקיימת $0 > (x)f$ וכן $0 < (x)''f$ לכל $\mathbb{R} \in x < 0$. הופריכו: בהכרח לא מתקיים כי $0 = x$ מימין, אלא בתנאי

הוכחה: מדובר בפונקציה חיובית ובוכה, נוכיח שלא יתכן שהוא יורדת לכיוון אסימפטוטה אופקית $0 = x$ מימין, אלא בתנאי השאלה נוכיח שהפונקציה חייבת לעלות (אחרת מתישתו היא תחתור את ציר איקס).

נב"ש כי קיימת נקודה a בה $0 < f'(a) = m$.

כיון ש $0 < ''f$ נובע כי הנגזרת הראשונה יורדת ולכן $\forall a \geq x$ מתקיים כי $m \leq f'(x)$.

נעביר אגף $0 \leq m - f(x)$ וنبיט בפונקציה הקדומה

$$h(x) = f(x) - mx$$

כלומר h יורדת בתחום $(-\infty, a]$ ולכן $\forall a \geq x$ מתקיים כי $h(a) \leq h(x)$

ובמילים אחרות $\forall a \geq x$

$$f(x) - mx \leq f(a) - ma$$

$$f(x) \leq mx + f(a) - ma$$

כיון שמיינן יש לנו ישר עם שיפוע שלילי, הוא שואף למינוס אינסופי:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} mx + f(a) - ma = -\infty$$

ולכן לפי חץ סנדוויץ' גם

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$$

בסתירה לכך שמדובר בפונקציה חיובית.

לכן סה"כ הפונקציה עולה בתחום, ולכן הגבול שלה באינסוף גדול או שווה מכל ערך שהוא מקבלת.

כיוון ש $0 < f(x) < \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ בכל נקודה, נציב נקודה כלשהי ונקבל שהגבול באינסוף חייב להיות גדול או שווה לערך בנקודה זו, ולכן בפרט הגבול לא יכול להיות אפס.

. 50. תהי f המקיימת $0 < f(x) < f(0,1) \in x$, הופריכו: בהכרח לא מתקיים כי $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \infty$.

הוכחה: למעשה זו נראה כי לא ניתן שלפונקציה יש אסימפטוטה אנכית בתחום בו היא בוכה.

תהי $a \in (0,1)$ נקודה כלשהי בקטע.

כיוון ש $0 < f'(x) > f'(a) > 0$ מתקיים כי $x < a < 0$ הנגזרת הראשונה יורדת, ולכן לכל $a < x < 0$ מתקיים כי

נעביר אגף $0 > f'(a) - f'(x) > f(a) - f(x)$ וنبנה את הפונקציה הקדומה

$$h(x) = f(x) - f'(a)x$$

כלומר ראיינו כי $0 > h(x) > h(a)$ בקטע $(a,0)$ ולכן h עולה ולכן לכל $a < x < 0$ מתקיים כי

$$h(x) < h(a)$$

כלומר

$$f(x) - f'(a)x < f(a) - f'(a)a$$

ולכן

$$f(x) < f'(a)x + f(a) - f'(a)a$$

הביטוי מימין הוא ישר וగבויו באפס הוא גובה החיתוך עם ציר ה- x :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(a)x + f(a) - f'(a)a = f(a) - f'(a)a$$

ולכן אם הגבול של הפונקציה קיים הוא מקיים:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \leq f(a) - f'(a)a$$

ולכן הגבול אינו יכול להיות אינסוף.

. 51. תהי f המקיימת $0 < f(x) < f(\infty) \in x$, הופריכו: בהכרח לא מתקיים כי $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$.

הפרכה: פונקציה וודאי יכולה להיות בוכה ולשאוף לאינסוף. דוגמאות - $(x) \ln x$, \sqrt{x} .

. $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ המקיימת $0 < f'(x) < f''(x)$ וכן $f'(0) > x$. הופריכו: בהכרח לא מתקיים כי $\infty = -\infty$.

הפרכה: פונקציה יכולה לבכות ולרדת למינוס אינסוף בקלות, למשל e^x .

. f רציפה ב- $[a, b]$ וגירה ב- (a, b) , הופריכו: f חסומה בקטע (a, b) .

הפרכה: וירשטרואס מבטיח כי פונקציה רציפה בקטע סגור חסומה בו, ולכן אנו מוחפשים נגזרת שאינה רציפה בקטע הסגור.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

קל לוודא כי הפונקציה רציפה ב- $[0, 1]$ ואף גירה בכל הממשיים (כasher הנקודה עליה צריך לשימד גש היא כמובן אף).

כמו כן, לא קשה לחשב כי

$$f'(x) = \begin{cases} 2x \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) - \frac{2 \cos\left(\frac{1}{x^2}\right)}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

נבטא בסדרה $a_n \rightarrow 0$ עליה $\cos\left(\frac{1}{a_n^2}\right) = 1$. יוצא ש

$$\lim f'(a_n) = \lim 2a_n \sin\left(\frac{1}{a_n^2}\right) - \frac{2}{a_n} = 0 - \infty = -\infty$$

כאשר הביטוי השמאלי בסכום הוא מהצורה של אפיסה כפול חסומה, והביטוי הימני מהצורה $\frac{2}{0^+}$.

בכך הוכחנו כי הנגזרת אינה חסומה, וכל שנותר הוא למצאו סדרה a_n כפי שהבטחנו.

cut $= 1 \cos(x)$ אם ורק אם $2\pi k = x$ עבור $k \in \mathbb{Z}$.

לכן נבחר סדרה a_n כך ש

$$\frac{1}{a_n^2} = 2\pi n$$

$$0 < a_n = \frac{1}{\sqrt{2\pi n}} \rightarrow 0$$

כפי שרצינו.

. $f'(c) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \infty$, הופריכו: קיימת נקודה c עבורה $f'(c) = 0$.

הוכחה:

נביט בנקודה כלשהי, נניח $0 = x$. כיוון שפונקציה שואפת לאינסוף מימין ומשמאלו קיימות נקודות

$$x_2 > 0, \quad x_1 < 0$$

כך ש

$$f(x_1), f(x_2) > f(0)$$

נבחר גובה m כך ש

$$f(0) < m < f(x_1), f(x_2)$$

לפי משפט ערך הביניים קיימות נקודות $(x_1, 0), c_1 \in (0, x_1), c_2 \in (x_2, 0), c_2 \in (0, x_2)$ כך ש $c_1 < c_2$ ו $f(c_1) = f(c_2) = m$.

כיוון שהפונקציה גזירה בכל הממשיים היא בודא רציפה, ולכן לפי משפט רול קיימת נקודה $c \in (c_1, c_2)$ בה $0 = f'(c)$.

55. תהי f כך ש $0 > f'(x) \forall x \in \mathbb{R}$, הופריכו: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$.

הפרכה: בעצם שואלים אותנו אם פונקציה מחייבת חיבת לשאוף לאינסוף. זה הגיוני, אם אנחנו טועים לחשב שהיא חייבת להיות עליה.

הפונקציה x^{-e} יורדת לאפס ומחייכת.

56. תהי f בעלת נגזרת מונוטונית עולה כך ש $0 > f'(x) \forall x \in \mathbb{R}$, הופריכו: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$.

הוכחה: הפעם בעצם הפונקציה מחייבת (כי הנגזרת עולה) והגבול הוא אכן אינסוף כמו שציפינו בתרגיל הקודם.

נציב נקודה כלשהי, למשל $0 = x$ ונסמן

$$m = f'(0) > 0$$

כיוון שהנגזרת עולה, לכל $0 \leq x$ מתקיים כי

$$f'(x) \geq f'(0) = m$$

נעביר אגף $0 \geq -m \geq f'(x) - f'(0)$ ונבנה את הפונקציה הקדומה

$$h(x) = f(x) - mx$$

כיוון שנגזרתה של h אי שלילית, הפונקציה h עולה, לכל $0 \geq x$. ולכן לפחות $0 \geq x$ מתקיים כי

$$h(x) \geq h(0)$$

כלומר

$$f(x) - mx \geq f(0) - m \cdot 0$$

ולכן

$$f(x) \geq mx + f(0)$$

כיוון ש $0 > m$ נובע כי $\infty = (0) + mx \lim_{x \rightarrow \infty}$ ולכן לפי חצי סנדוויץ' :

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$$

כפי שרצינו.

57. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$: גזירה בכל הממשיים, הופריכו: 'резיפה בכל הממשיים'.

הפרכה: נביט בפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

ברור שהוא גזירה לכל $x \neq 0$ נבדוק את הגזירות ב $x = 0$ לפי ההגדרה, כלומר נחשב את גבול שיפועי המיתרים.

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$$

המעבר האחרון הוא כיוון שמדובר באפיסה כפול חסומה.

לכן הפונקציה אכן גזירה בכל הממשיים.

נחשב את הנגזרת

$$f'(x) = \begin{cases} 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

כעת $0 = \lim_{x \rightarrow 0} 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ אך הגבול $\lim_{x \rightarrow 0} \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ אינו קיים ולכן סה"כ $f'(x)$ אינו קיים, ובוואדי הנגזרת אינה רזיפה

ב $x = 0$.

58. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$: גזירה בכל הממשיים, הופריכו: 'חסומה בכל קטע סופי ווגור $[a, b]$ '.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

ניתן להוכיח כי היא גזירה בכל הממשיים בדומה לתרגיל קודם, וכי מתקיים שהנגזרת הינה

$$f'(x) = \begin{cases} 2x \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) - \frac{2 \cos\left(\frac{1}{x^2}\right)}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

$$\text{כעת } 0 = \lim_{x \rightarrow 0} 2x \sin\left(\frac{1}{x^2}\right)$$

כמו כן, עבור הסדרה $0 = \frac{1}{\sqrt{2\pi n}} \rightarrow a_n$ מתקיים כי

$$\frac{2 \cos\left(\frac{1}{a_n^2}\right)}{a_n} \rightarrow \infty$$

ולכן סה"כ $f'(x)$ אינה חסומה בקטע $[-1, 1]$

(כל קטע שמכיל את אפס, בעצם).

.59. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ גזירה בכל הממשיים כך ש $0 > f(0)$, הופריכו: קיימת סביבה של $0 = x$ בה $f'(x) > 1$.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) + x & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

נחשב את הנגזרת באפס:

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) + x - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) + 1 = 1$$

ולכן f' גזירה בכל הממשיים וכן $0 > f'(0) = 1$.

$$f'(x) = \begin{cases} 2x \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) - \frac{2 \cos\left(\frac{1}{x^2}\right)}{x} + 1 & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

בדומה לתרגיל קודם, בעזרת סדרת הנקודות $a_n = \frac{1}{\sqrt{2\pi n}}$ ניתן להסביר כי בכל סביבה של אפס הנגזרת אינה חסומה מליירע,

ובודאי לא ניתן להבטיח שהיא חיובית.

60. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ כך ש $0 > f'(0)$, וכך $0 = f(0)$ הופריכו: קיימת סביבה ימנית של $0 = x$ בה $0 > f(x)$.

הוכחה: לפי הגדרת הנגזרת

$$0 < f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$$

לכן קיימת סביבה של אפסו בה $\frac{f(x)}{x} > \frac{f'(0)}{2}$ ומכאן אם $0 > x$ בסביבה זו נובע כי $0 > f(x)$ כפי שרצינו.

61. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה בכל הממשיים, הופריכו: קיימת נקודה $c \in \mathbb{R}$ כך ש $c < -f(f(c))$.

הוכחה:

$$\text{נב"ש כי לכל } \mathbb{R} \in x \text{ מתקיים כי } x = -f(f(x)).$$

תהי נקודה a כלשהי אזי נובע כי

$$f(f(a)) = -a$$

ולכן

$$f(-a) = f(f(f(a))) = -f(a)$$

בפרט עבור $0 = a$ נקבל כי $0 = -f(f(0))$ ולכן $0 = f(0)$.

כמו כן, אם עבור נקודה כלשהי a מתקיים כי $0 = f(a)$ אזי

$$0 = f(0) = f(f(a)) = -a$$

כלומר סה"כ $0 = f(x)$ אם ורק אם $x = 0$.

עתה, ניקח נקודה חיובית כלשהי $0 > a$, ונסמן $b = f(a)$. נובע כי

$$f(b) = f(f(a)) = -a$$

אם $0 > b$, כיוון שהפונקציה רציפה, וכיון ש $0 < -a = f(b) = b < 0$, מושפט ערך הביניים הפונקציה חותכת את הציר בנקודה בין b, a . כיוון ש $b, a > 0$ נובע כי הפונקציה חותכת את הציר בנקודה גדולה מzdola מzdola מאשר בסתרה لكن שהיא חותכת את הציר באפס בלבד.

אם $0 < b$, נשים לב כי $-b = -f(a) = f(-a) < 0$, $f(b) = -a > -b = f(-a)$ ולפיכך $0 < f(b) < f(-a)$. שוב מערך הבינאים נסיק כי

הfonקציה חותכת את ציר האיקס בנקודה בין b ו- a – כלומר נקודה שלילית בסתירה.

לבסוף, לא יתכן כי $0 \neq b$ הרי $0 \neq a$ וכן b

זה"כ קיבלנו סתירה, ולכן הוכחנו את הטענה.

62. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ גזירה בכל הממשיים, כך ש $0 \neq f'(x)$ בכל הממשיים וכן $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, הופריכו:

הפרכה:

$$f(x) = 1 + \frac{1}{e^x}$$

$$0 \neq f'(x) = -\frac{1}{e^x} \rightarrow_{x \rightarrow \infty} 0$$

$$f(x) \rightarrow_{x \rightarrow \infty} 1$$

63. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ גזירה בכל הממשיים, כך ש $0 = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$, הופריכו:

הפרכה:

$$f(x) = \frac{\sin(e^x)}{e^x} \rightarrow_{x \rightarrow \infty} 0$$

$$f'(x) = (e^{-x} \sin(e^x))' = -e^{-x} \sin(e^x) + e^{-x} \cos(e^x) e^x = -\frac{\sin(x)}{e^x} + \cos(e^x)$$

עבור

$$a_n = \ln(2\pi n) \rightarrow 0$$

מתקיים כי

$$f'(a_n) = 1$$

$$\text{ולכן } 0 \neq f'(x) \rightarrow_{x \rightarrow \infty} 0$$

64. הופרינו: הפתרונות היחידים למשוואה $3^x + 6^x = 4^x + 5^x$ הם $x = 0, 1$.

הוכחה:

אפתח ואומר שלדעתי פתרון זה קל להבנה, אך מאתגר לעלות עליו לבד. תהנו:

ראשית, קל מאד לראות כי $0 = x$ הוא פתרון למשוואה כיון ש $3^0 + 6^0 = 2 = 4^0 + 5^0$

וכן $1 = x$ הינו פתרון כיון ש $3^1 + 6^1 = 9 = 4^1 + 5^1$.

כעת, נב"ש כי קיימ פתרון נוסף למשוואה $0,1 \neq a$ עבורי מתקיים

$$3^a + 6^a = 4^a + 5^a$$

נעביר אגפים:

$$6^a - 5^a = 4^a - 3^a$$

ונעשה *how* קטן (wouldn't it be nice) שהפוך את הביטויים לשיפוע של מיתרים:

$$\frac{6^a - 5^a}{6 - 5} = \frac{4^a - 3^a}{4 - 3}$$

שים לב: פעולה זו הייתה חוקית מתמטית, שהרי שני המכנים שווים ל-1.

אבל אלה בדיק שיפוע מיתרים של הפונקציה $x^a = f(x)$ בקטעים $[3,4]$, $[4,5]$.

פונקציה זו גזירה תמיד ומקיים את תנאי משפט לגרנץ' ש;if you have a function that is differentiable on an interval, then its derivative is continuous on that interval. שיפוע המיתר מקביל למשיק בנקודת כלשהי בפנים הקטע.

כלומר קיימות נקודות

$$c_1 \in [3,4]$$

$$c_2 \in [4,5]$$

עבורן מתקיים כי

$$f'(c_1) = \frac{4^a - 3^a}{4 - 3}$$

$$f'(c_2) = \frac{6^a - 5^a}{6 - 5}$$

וכיוון ש $f'(x) = ax^{a-1}$ נובע מה"כ כי

$$ac_1^{a-1} = ac_2^{a-1}$$

כיון ש $0 \neq a$ ניתן לחלק בו ונותרנו עם

$$c_1^{a-1} = c_2^{a-1}$$

מכאן נובע כי $1 = a$ או $c_1 = c_2$.

אם $c_1 < 4 < 5 < c_2$ והרי נתן כי $1 \neq a$, בסותירה.

חלק ב' - תרגילים הכלליים תת-סדרות וסדרות קושי:

65. תהי f רציפה וחסומה ב $[a, b]$, גזירה ב (a, b) , כך שהגבול $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ אינו קיים, הופריכו: f' אינה חסומה ב (a, b) .

הוכחה: כיוון שהגבול $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ לא קיים, ישנן שתי סדרות $a < a_n, b_n \rightarrow a$ כך ש

$$\lim f(a_n) \neq \lim f(b_n)$$

ניקח גבולות חלקיים שונים $M \neq K$

$$f(a_{k_n}) \rightarrow K$$

$$f(b_{m_n}) \rightarrow M$$

וכיוון שהפונקציה חסומה בקטע הגבולות הם סופיים $M, K \in \mathbb{R}$.

ברור שהחלה משלב מסוים $a_{k_n} \neq b_{m_n}$ אחריה הגבולות היו שווים.

נביט בקטעים הסגורים שבין a_{k_n}, b_{m_n} בהם מתקיים תנאי משפט לגראנץ' כיוון שהפונקציה גזירה בכל $[a, b]$.

נפעיל את משפט לגראנץ' על כל קטע ונקבל סדרת נקודות:

$$f'(c_n) = \frac{f(a_{k_n}) - f(b_{m_n})}{a_{k_n} - b_{m_n}}$$

כעת

$$|f'(c_n)| = \left| \frac{f(a_{k_n}) - f(b_{m_n})}{a_{k_n} - b_{m_n}} \right| = \left\{ \frac{|K - M|}{0^+} \right\} \rightarrow \infty$$

ואכן הוכחנו שהנגזרת אינה חסומה.

66. תהי סדרה חסומה a_n המקיימת לכל $n \in \mathbb{N}$ כי $a_n - \frac{1}{2^n} \geq a_{n+1}$, הופריכו: a_n מתכנסת לגבול סופי.

הוכחה: כיוון שהסדרה חסומה יש לה גבול עליון וגבול תחתון סופיים. נב"ש שהם שונים.

זהו $n > m$ אז

$$a_m - a_n = a_m - a_{m-1} + a_{m-1} + \dots + a_{n+1} - a_n \geq -\frac{1}{2^{m-1}} - \frac{1}{2^{m-2}} - \dots - \frac{1}{2^n} = -\frac{1}{2^n} \left(\frac{1}{2^{m-1-n}} + \dots + 1 \right)$$

icut סכום סדרה הנדסית חיובית סופית קטן מסכום הסדרה האינסופית:

$$\frac{1}{2^{m-1-n}} + \dots + 1 < \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2$$

לכן

$$a_m - a_n > -\frac{2}{2^n} = -\frac{1}{2^{n-1}}$$

נומר

$$\varepsilon = \overline{\lim} a_n - \underline{\lim} a_n > 0$$

$$\text{icut כיוון ש } 0 \rightarrow \frac{1}{2^{n-1}} \text{ קיימ מקומ } K_1 \text{ אחריו לכל } K_1 > n \text{ מתקיים כי } < \frac{\varepsilon}{3}$$

$$\text{ולכן לכל } 1 < K < n > m > m \text{ מתקיים } \frac{\varepsilon}{3} < a_m - a_n > -\frac{\varepsilon}{3} \text{ וכאן}$$

$$\text{יש תת סדרה השואפת לגבול העליון, ולכן קיימ } K_2 \text{ אחריו איברי תת סדרה גדולים מ-} \frac{\varepsilon}{3}$$

$$\underline{\lim} a_n + \frac{\varepsilon}{3} > a_m > \underline{\lim} a_n > \frac{\varepsilon}{3} \text{ בօפן דומה יש תת סדרה השואפת לגבול התחתון ולכן קיימ } K_3 \text{ אחריו איברי תת הסדרה קטנים מ-} \frac{\varepsilon}{3}$$

$$\text{נומר } K = \max \{K_1, K_2, K_3\} \text{ כך ש } K > n.$$

$$\text{ניקח איבר } a_m > n \text{ מהת סדרה השואפת לגבול התחתון כך ש } n > m.$$

סה"כ

$$\overline{\lim} a_n - \frac{\varepsilon}{3} < a_n$$

$$a_m < \underline{\lim} a_n + \frac{\varepsilon}{3}$$

ולכן

$$a_n - a_m > \overline{\lim} a_n - \frac{\varepsilon}{3} - \left(\underline{\lim} a_n + \frac{\varepsilon}{3} \right) = \overline{\lim} a_n - \underline{\lim} a_n - \frac{2\varepsilon}{3} = \varepsilon - \frac{2\varepsilon}{3} = \frac{\varepsilon}{3}$$

בסתירה לכך ש

$$a_n - a_m < \frac{\varepsilon}{3}$$

. $|f(x_1) - f(x_2)| \leq K|x_1 - x_2|$ ותהי f המקיים לכל $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ כי $|f(x_1) - f(x_2)| \leq K|x_1 - x_2|$.

תהי סדרה המקיימת $a_n = f(a_{n+1})$ לכל $n \in \mathbb{N}$. הוכיחו כי הסדרה מתכנסת $\rightarrow c \in \mathbb{R}$ וכן כי $c = f(c)$.

הוכחה: נראה כי מדובר בסדרת קושי ולכן היא מתכנסת.

$$|a_3 - a_2| = |f(a_2) - f(a_1)| \leq K|a_2 - a_1|$$

$$|a_4 - a_3| = |f(a_3) - f(a_2)| \leq K|a_3 - a_2| \leq K^2|a_2 - a_1|$$

ניתן להוכיח באינדוקציה כי לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים כי

$$|a_{n+1} - a_n| < K^{n-1}|a_2 - a_1|$$

עת, יהיו $n > m$ מתקיים כי

$$\begin{aligned} |a_m - a_n| &= |a_m - a_{m-1} + a_{m-1} - a_{m-2} + \dots + a_{n+1} - a_n| \leq |a_m - a_{m-1}| + \dots + |a_{n+1} - a_n| \\ &\leq K^{m-2}|a_2 - a_1| + \dots + K^{n-1}|a_2 - a_1| = K^{n-1}|a_2 - a_1|(K^{m-n-1} + \dots + 1) \end{aligned}$$

cut סכום סדרה הנדסית חיובית סופית קטן מסכום הסדרה האינסופי

$$K^{m-n-1} + \dots + 1 < \sum_{k=0}^{\infty} K^k = \frac{1}{1-K}$$

הטור הנדסי מתכנס הרי $1 < K < 0$. לכן סה"כ

$$|a_m - a_n| \leq \frac{K^{n-1}}{1-K}|a_2 - a_1| \rightarrow 0$$

הגבול שואף לאפס, שוב כיוון ש $1 < K < 0$.

לכן קיימים מקום N אחריו לכל $N > n$ מתקיים כי $\epsilon < |a_2 - a_1| \frac{K^{n-1}}{1-K}$

ובפרט לכל $N > n > m$ מתקיים כי $\epsilon < |a_m - a_n|$

כלומר הוכחנו כי a היא סדרת קושי, ולכן מתכנסת לגבול סופי שנסמנו $c \in \mathbb{R}$

cut נשאיף את שני צידי נוסחת הנסיגה

$$c = \lim a_{n+1} = \lim f(a_n)$$

נביט בהפרש

$$|f(c) - f(a_n)| < K|c - a_n| \rightarrow 0$$

ולכן

$$f(c) - f(a_n) \rightarrow 0$$

מצד שני

$$f(c) - f(a_n) = f(c) - a_{n+1} \rightarrow f(c) - c$$

לפי יחידות הגבול נובע כי

$$f(c) - c = 0$$

כפי שרצינו.

68. תהי סדרה a_n כך שקיים $0 > \varepsilon$ ו $\exists n \in K$ שלכל $K > n > m$ מתקיים כי $\varepsilon \geq |a_m - a_n|$, הופריכו: $\infty \rightarrow |a_n|$.

הוכחה: כיוון ש $0 \geq |a_n|$ הגבולות החלקיים שלה אינם שליליים, ובוודאי ∞ – אינם גבול חלקיים.

לכן אם $\infty \rightarrow |a_n|$ אז יש לה גבול חלקי סופי, נב"ש שזה המצב.

תהי תת סדרה המתכנסת לגבול סופי

$$a_{k_n} \rightarrow L \in \mathbb{R}$$

קיים מקום N שאחריו לכל $N > n$ מתקיים כי

$$|a_{k_n} - L| < \frac{\varepsilon}{2}$$

ניקח $\max\{N, K\} > n$ ולכ

$$|a_{k_n} - L| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$|a_{k_{n+1}} - L| < \frac{\varepsilon}{2}$$

וכיוון ש $a_{k_n}, a_{k_{n+1}} \in \left(L - \frac{\varepsilon}{2}, L + \frac{\varepsilon}{2}\right)$. נובע כי

$$|a_{k_{n+1}} - a_{k_n}| < \varepsilon$$

בסתירה לנחתון, הרי $K > k_n > n > k_{n+1}$.

69. תהי סדרה כך ש $a_0 = 1$ ו לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים כי $a_{n+1} = \frac{2}{1+a_n}$. הוכיחו כי הסדרה מתכנסת וחשבו את גבולה.

מבט זריז באיברי הסדרה הראשונים $\dots, \frac{2}{5}, \frac{6}{11}, 0, 2, \frac{2}{3}$ מעלה את הרעיון לחלק את הסדרה לשתי תת-סדרות מונוטוניות.

ראשית, נביע איבר בסדרה בעזרת הקודם-קודם לו.

לכל $n > 1$ מתקיים כי:

$$a_{n+1} = \frac{2}{1+a_n} = \frac{2}{1 + \frac{2}{1+a_{n-1}}} = \frac{2}{\left(\frac{1+a_{n-1}+2}{1+a_{n-1}}\right)} = \frac{2+2a_{n-1}}{3+a_{n-1}}$$

icut נבחן את הפרש בין איבר הקודם לקודם לו:

$$a_{n+1} - a_{n-1} = \frac{2+2a_{n-1}}{3+a_{n-1}} - a_{n-1} = \frac{2+2a_{n-1}-3a_{n-1}-a_{n-1}^2}{3+a_{n-1}} = \frac{-a_{n-1}^2-a_{n-1}+2}{3+a_{n-1}} = \frac{-(a_{n-1}+2)(a_{n-1}-1)}{3+a_{n-1}}$$

קל להוכיח באינדוקציה כל כי איברי הסדרה אי שליליים, וכן איבר גדול מהקודם קודם לו אם ורק אם הוא קטן מ-1, וקטן מהקודם קודם לו אם ורק אם הוא גדול מ-1.

nocich כי לכל n מתקיים כי $1 < a_{2n-1}$ וכן מדובר בתת סדרה מונוטונית עולה (וחסומה מלעיל ע"י 1) וכן מתכנסת לאבול סופי (שנחשב בהמשך).

כמו כן nocich כי לכל n מתקיים כי $1 < a_{2n}$ וכן מדובר בתת סדרה מונוטונית יורדת (וחסומה מלרע ע"י 1) וכן מתכנסת גם היא לאבול סופי (שנחשב בהמשך).

נעדר באינדוקציה:

$$a_1 = 0 < 1$$

יהי a עבורו $1 < a_{2n-1}$ nocich כי $1 < a_{2n+1}$

$$a_{2n+1} = \frac{2+2a_{2n-1}}{3+a_{2n-1}}$$

נפתרו את אי השוויון

$$\frac{2+2a_{2n-1}}{3+a_{2n-1}} < 1$$

$$2 + 2a_{2n-1} < 3 + a_{2n-1}$$

זה נכון אם ורק אם

$$a_{2n-1} < 1$$

וזו בדיקת הנחת האינדוקציה.

באופן דומה ניתן להוכיח באינדוקציה כי $1 > a_{2n} \text{ לכל } n$.

icut שת' תתי הסדרות מונוטוניות וחסומות ולכן מתכנסות לגבולות סופיים.

נסמן $L \rightarrow a_{2n+1}$ חשב את גבול שני צידי נוסחת הנסיגה

$$a_{2n+1} = \frac{2 + 2a_{2n-1}}{3 + a_{2n-1}}$$

ונקבל כי

$$L = \frac{2 + 2L}{3 + L}$$

(כיוון שהסדרה אי שלילית הגבול אינו שלילי ואין סכונה של חלוקה באפס)

$$3L + L^2 = 2 + 2L$$

$$L^2 + L - 2 = 0$$

$$(L + 2)(L - 1) = 0$$

כאמור, הגבול אינו שלילי ולכן בהכרח $1 = L$.

באופן דומה לחלווטין נובע כי $1 \rightarrow a_{2n}$

לכן תתי הסדרה במקומות הזוגיים והן תתי הסדרה במקומות הזוגיים שואפות ל-1. כיוון שמדובר במספר סופי של תתי סדרות המכילות את כל איברי הסדרה ושוואפות לאותו גבול נובע כי זה גבול הסדרה.

כלומר הוכחנו ש $1 \rightarrow a_n$.

. $\liminf a_n = \limsup c_n$ נניח כי L מתקיים $a_n \leq b_n \leq c_n$.

הופריכו: $b_n \rightarrow L$.

הוכחה: יהי $\varepsilon > 0$

$$\text{כיון ש } L = \underline{\lim} \text{ קיימarker מקום } K_1 \text{ שאחריו לכל } K_1 < n \text{ מתקיים כי } \varepsilon - L > a_n$$

(אחרת היו אינסוף איברים סדרה שקטנים מ- L ומתחם היה מתקבל גבול חלק שקטן מהגבול התיכון בסותירה).

$$\text{באופן דומה,כיון ש } L = \overline{\lim} \text{ קיימarker מקום } K_2 \text{ שאחריו לכל } K_2 > n \text{ מתקיים כי } \varepsilon + L < c_n$$

נבחר $K = \max\{K_1, K_2\}$ ואחריו לכל $K > n$ מתקיים כי

$$L - \varepsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < L + \varepsilon$$

ולכן הוכחנו כי $L \rightarrow a$ לפי ההגדרה.

71. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה בכל המשיים, כך שהגבולות $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ קיימים וסופיים. הופריכו: f חסומה.

הוכחה:

נב"ש שהפונקציה אינה חסומה מלעיל (הוכחה עבור חסם מלרע דומה).

לכן לכל $N \in \mathbb{N}$ קיימת נקודה $x \in \mathbb{R}$ כך ש

$$f(x_n) > n$$

לכן לפי חיצי סנדוויץ' מתקיים כי

$$\lim f(x_n) = \infty$$

ניקח תת סדרה של x_n המתכנסת ב�ובן הרחב לגבול סופי או אינסוף

$$x_{k_n} \rightarrow L$$

אם L סופי אז ניתן להוכיח רציפה ב- $L = x$ מתקיים כי

$$f(x_{k_n}) \rightarrow f(L)$$

בסתירה לכך ש

$$f(x_{k_n}) \rightarrow \infty$$

כמו כן, אם $\infty = L$

כיוון שנתנו שהגבול $(x) f_{k_n}(x)$ קיימosoף, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ שואפת אליו ולא לאינסוף בסותירה.

כמובן שם $\infty = L$ אנחנו מקבלים סטירה באופן דומה, הרי גם שם הגבול סופי.

Yeet.