

מבוא לאנליזה מתقدמת מבחן לדוגמא

מרצה: תמר בר-און.

משך הבדיקה: שעתיים וחצי.

הזראות: יש לענות על כל השאלות. בכל שאלה יש להראות דרך, ותשובה סופית. תשובה סופית בלי דרך לא תקבל ניקוד!

משקל שאלות 4:1= 23 נקודות כל אחת.

משקל שאלה 5: 18 נקודות.

כל ציון מעל 100 יעוגל ל-100.

חומר עזר: מחשבון פשוט.

בצלחה!

1. מצאו פתרון לביעית ההתחלה הבאה:

$$xy' - 8y = x^3\sqrt{y}$$

$$y(1) = 8$$

והוכיחו שהוא ייחיד.

פתרון:

$$y' = \frac{8}{x}y + x^2\sqrt{y}$$

נסדר את המשוואה באופן הבא: $y' = f(x, y)$. רציפה f_y מוגדרת ורציפה f_x במלבד הפתוח $\{(x, y) : 0 < x < \infty, 0 < y < \infty\}$. הטענה היא שקיימת ייחידה שעובר בנקודה $(1, 8)$ וכאן לפי משפט הקיום והיחידות קיימים פתרון ייחיד שמעבר לכך אין פתרון אחר.

כעת נמצא אותו.

נציג את המשוואה כך:

$$y' - \frac{8}{x}y = x^2\sqrt{y}$$

זהו משוואת ברנולי עם $m = \frac{1}{2}$. היא נפתרת באמצעות הצבה הבאה:

$$z = y^{1-m} = \sqrt{y}$$

נקבל את המשוואה:

$$2z' - \frac{8}{x}z = x^2$$

$$\begin{aligned} a(x) &= -\frac{4}{x}, b(x) = \frac{1}{2}x^2 \\ A(x) &= \int a(x)dx = -3 \ln x \\ y = e^{-A(x)}(\int e^{A(x)}b(x)+c) &= e^{4 \ln x}(\int x^2 e^{-4 \ln x} dx + c) = x^4 (\int x^{-2} dx + c) = \\ &= cx^4 - x^3 \end{aligned}$$

cutat נציג את הנקודה הנתונה:

$$8 = c - 1$$

$$c = 9$$

2. מצאו פתרון כללי למד"ר הבאה:

$$5x - y^2 + (2x + 3)yy' = 0$$

נכתוב את המד"ר בצורה הבאה: $(5x - y^2)dx + (2xy + 3y)dy = 0$
 נסמן: $\frac{X_y - Y_x}{Y} = \frac{5}{2x}$ תליי ב x בלבד,
 וכן אפשר למצוא גורם אינטגרציה שתלו依 ב x . נסמן μ ב (x) . על מנת למצוא אותו,
 נפתר את המשוואה הבאה:

$$\begin{aligned} (\mu X)_y &= (\mu Y)_x \\ -2y\mu &= \mu'(2xy + 3y) + 2y\mu \\ \text{כלומר, } -2y\mu &= \mu'(2xy + 3y) + 2y\mu \\ \text{נמצא ב } y \text{ ונסדר את המשוואה: } \frac{d\mu}{dx}(2x + 3) &= -4\mu \\ \cdot \frac{d\mu}{-4\mu} &= \frac{dx}{2x + 3} \\ \cdot -\frac{1}{4} \frac{d\mu}{\mu} &= \frac{1}{2} \frac{dx}{x + 1.5} \\ -\frac{1}{2} \frac{d\mu}{\mu} &= \frac{dx}{x + 1.5} \\ -\frac{1}{2} \ln |\mu| &= \ln |x + 1.5| + c \\ \ln \frac{1}{\sqrt{\mu}} &= \ln |x + 1.5| + c \\ \mu &= \frac{1}{(x + 1.5)^2} \end{aligned}$$

עכשו יש לנו את המשוואה הבאה:

$$\frac{5x - y^2}{(x + 1.5)^2} dx + \frac{2xy + 3y}{(x + 1.5)^2} dy = 0$$

שהיא בעצם:

$$\frac{5x - y^2}{(x + 1.5)^2} dx + \frac{2y}{x + 1.5} dy = 0$$

$$\begin{aligned} \int \frac{2y}{x + 1.5} dy &= \frac{y^2}{x + 1.5} + c(x) \\ \text{נגור לפיה ומשווה ל } &\frac{5x - y^2}{(x + 1.5)^2} \\ \frac{-y^2}{(x + 1.5)^2} + c' &= \frac{5x - y^2}{(x + 1.5)^2} \\ c' &= \frac{5x}{(x + 1.5)^2} \\ c &= \int \frac{5x}{(x + 1.5)^2} dx \end{aligned}$$

על מנת לחשב את האינטגרל נשתמש בדרך כלל:

$$\begin{aligned} \frac{5x}{(x + 1.5)^2} &= \frac{5x + 7.5}{(x + 1.5)^2} - \frac{7.5}{(x + 1.5)^2} = \frac{5}{x + 1.5} - \frac{7.5}{(x + 1.5)^2} \\ \int \frac{5x}{(x + 1.5)^2} dx &= 5 \int \frac{1}{x + 1.5} - 7.5 \int \frac{1}{(x + 1.5)^2} = 5 \ln|x + 1.5| + \frac{1}{7.5 \frac{x + 1.5}{x + 1.5}} \end{aligned}$$

לסיכום, הפתרון הכללי של המד"ר הוא:

$$\frac{y^2 + 7.5}{x + 1.5} + 5 \ln|x + 1.5| = c$$

3. פתרו את המד"ר הבא:

$$y \cdot y'' - 3(y')^3 = 0$$

בתחום $y > 0$.

הערה: שימוש לב גם לפתרונות סינגולריים.

פתרון:

נציב $z = y'$. נקבל:

$$\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy} \frac{dy}{dx}$$

כלומר

$$y'' = \frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy} z$$

נציב במשוואה:

$$y \frac{dz}{dy} z - 3z^3 = 0$$

$$\frac{dy}{y} = \frac{z}{3z^3} dz$$

יש פתרון סינגולרי $0 = z$. כולם, $y = c$.

עבור הפתרונות הלא סינגולריים:

$$\frac{dy}{y} = \frac{dz}{3z^2}$$

$$\int \frac{dy}{y} = \int \frac{dz}{3z^2}$$

$$\ln y + c = \frac{-1}{3z}$$

$$z = y' = \frac{dz}{dx}$$

ושוב קיבלנו משואה פרידה:

$$(3 \ln y + c) dy = -dx$$

$$\int (3 \ln y + c) dy = - \int dx$$

$$3y \ln y - 3y + cy + c' = -x$$

לא ניתן לחוץ את y .

4. מצאו את הפתרון הכללי למד"ר הבאה:

$$y'' - 3y' + 2y = x^2 + 2x + 4$$

פתרון:

ראשית, נמצא פתרון כללי למערכת ההומוגנית: $y'' - 3y' + 2y = 0$

$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -3\lambda + 2 = 0$. יש לה שני שורשים שונים: 2. לכן הפתרון הכללי למערכת ההומוגנית הוא:

כעת, נמצא פתרון פרטי למערכת הלא הומוגנית.

מאחר שהחלק הלא הומוגני שווה $e^{0x}(4(x^2 + 2x + 4))$ ו 0 אינו שורש של המשוואה האופיינית, אז ניתן לנחש פתרון מהצורה

$$y_p = ax^2 + bx + c$$

כעת נציב בMdR.

$$2a - 3(2ax + b) + 2(ax^2 + bx + c) = x^2 + 2x + 4$$

נשווה מקדמים ונקבל 3 משוואות ב 3 געלמים:

$$\begin{cases} 2a = 1 \\ -6a + 2b = 2 \\ 2a - 3b + 2c = 4 \end{cases}$$

$$y_p = \frac{1}{2}x^2 + 2\frac{1}{2}x + 5\frac{1}{4}$$

ומכאן שהפתרון הכללי של המערכת הלא הומוגנית הוא:

$$y = c_1e^x + c_2e^{2x} + \frac{1}{2}x^2 + 2\frac{1}{2}x + 5\frac{1}{4}$$

5. יהיו f, g שתי פונקציות גזירות ברציפות בקטע I . הוכיחו/הפריכו:

(א) אם f, g בת"ל בקטע I אז גם f', g' בת"ל בקטע I .
הפרכה:

נקח x נקי $f(x) = 1$ ו $f'(x) = x$. אז f, g בת"ל על כל הישר, כי הוורונסקיין שלהם הוא:

$$W(x) = \det \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 \neq 0$$

אולם f', g' תלויים, כי $0 = f'g - g'f$, וכל קבוצה שמכילה את 0 תלואה.

(ב) אם f', g' בת"ל בקטע I , אז גם f, g בת"ל בקטע I .
הוכחה:

נניח בשיליה f, g תלויים. אז קיימים $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ לא שניהם 0 כך $\alpha f + \beta g \equiv 0$ על הקטע I . אזי $\alpha f' + \beta g' = (\alpha f + \beta g)' = 0$. כלומר, f', g' תלויים לינארית. סתירה.