

1.

א. תהיו הקבוצה $B_k = \{n^k \mid n \in \mathbb{N}\}$, כאשר $k \in \mathbb{N}$. הוכח ש- $|\mathbb{N}| = |B_k|$, $\forall k \in \mathbb{N}$ (בשאלה זו קבוצה \mathbb{N} אינה מכילה את 0).

ב. הוכח שאם $|A \setminus B| = |B \setminus A|$ אז $|A| = |B|$.

פתרון:

א. צריך להוכיח שקיימת פונקציה $f: \mathbb{N} \rightarrow B_k$ חח"ע ועל. נגדיר את הפונקציה להיות $f(n) = n^k$.

חח"ע: חהיו $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ כך ש- $f(n_1) = f(n_2)$, זאת אומרת $n_1^k = n_2^k$.

$$n_1^k = n_2^k \Leftrightarrow n_1^k - n_2^k = 0 \Leftrightarrow (n_1 - n_2)(n_1^{k-1} + n_1^{k-2}n_2 + n_1^{k-3}n_2^2 + \dots + n_1n_2^{k-2} + n_2^{k-1}) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (n_1 - n_2) \cdot \sum_{i=0}^{k-1} (n_1^{k-1-i} \cdot n_2^i) = 0 \Leftrightarrow n_1 = n_2$$

(כיוון שהסכום תמיד חיובי, ו- $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ לא ייתכן פתרון אחר).

על: יהי $b \in B_k$, זאת אומרת קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש- $b = n^k$ ולכן עבור $n \in \mathbb{N}$ זה מתקיים: $f(n) = b$.

ב. נתון ש- $|A \setminus B| = |B \setminus A|$, זאת אומרת קיימת פונקציה חח"ע ועל $f: A \setminus B \rightarrow B \setminus A$. נגדיר

$$f: A \rightarrow B \text{ ע"י } g(a) = \begin{cases} f(a) & a \notin B \\ a & a \in B \end{cases} \text{ נוכיח ש- } g \text{ חח"ע ועל.}$$

חח"ע – יהיו $a_1, a_2 \in A$ כך ש- $g(a_1) = g(a_2)$, מכיוון שלכל $a \in A$ $f(a) \notin A$ אז או ש-

$a_1, a_2 \in B$ או ש- $a_1, a_2 \notin B$ (כי אם $a_1 \in B \wedge a_2 \notin B$ נקבל $f(a_2) = a_1$ וזה לא ייתכן).

אם $a_1, a_2 \in B$ אז $a_1 = a_2$ ואם $a_1, a_2 \notin B$ אז $f(a_1) = f(a_2)$ ומכיוון ש- f חח"ע נקבל $a_1 = a_2$.

על – יהי $b \in B$. אם $b \in A$ אז $f(b) = b$, אם $b \notin A$ אז $b \in B \setminus A$ ומכיוון ש- f על קיים

$$a \in A \setminus B \text{ כך ש- } f(a) = b \text{ מכיוון ש- } a \notin B \text{ נקבל } g(a) = f(a) = b$$

2.

א. הוכח או הפרך: אם $|A| = |B|$ אז קיימת פונקציה f חח"ע מ- A ל- B שהיא לא על

ב. תהי K קבוצת המספרים הממשיים שאינם רציונאליים. הוכח ש- K אינה בת מניה.

ג. מצא מהי עוצמת הקבוצה: $A = \{x \in \mathbb{R} \mid (x - \pi) \in \mathbb{Q}\}$ (למשל, $\pi, \pi + 0.189 \in A$).

פתרון:

א. לא נכון. דוגמא נגדית: נניח $A = B = \{1\}$. נקבל ש- $|A| = |B|$ אבל לא קיימת פונקציה f מ- A ל- B שהיא לא על.

ב. ידוע כי \mathbb{Q} היא בת מניה. נניח בשלילה כי $K = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ בת מניה. לכן, $K \cup \mathbb{Q}$ היא בת מניה, אבל $K \cup \mathbb{Q} = \mathbb{R}$ ו- \mathbb{R} אינה בת-מניה. לכן קיבלנו סתירה. K אינה בת מניה.

ג. נגדיר פונקציה $f: A \rightarrow \mathbb{Q}$, כך ש- $f(x) = x - \pi$. מהגדרת A זאת אכן פונקציה מ- A ל- \mathbb{Q} . נוכיח ש- f חח"ע ועל \mathbb{Q} .

חח"ע: יהיו $x_1, x_2 \in A$ ונניח $f(x_1) = f(x_2)$. לכן $x_1 - \pi = x_2 - \pi$. נוסיף π בשני האגפים ונקבל $x_1 = x_2$. מש"ל.

על: יהי $q \in \mathbb{Q}$. יהי $x = q + \pi$. אז $x \in A$ כי $x - \pi = q$, כלומר $f(x) = q$. מתאנו מקור ל- q , שהוא איבר כלשהו ב- \mathbb{Q} , לכן f היא על \mathbb{Q} . מש"ל.

לכן, מהגדרת שוויון עוצמות, $|\mathbb{Q}| = |A| = \aleph_0$.

3.

א. תהי A קבוצת עיגולים זרים במישור. הוכח כי $|A| \leq \aleph_0$ (עיגול במישור מוגדר באופן הבא:

$$\{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid (x-a)^2 + (y-b)^2 < r^2\}$$

ב. תהי B קבוצת כל המעגלים זרים במישור. האם בהכרח $|B| \leq \aleph_0$?

פתרון:

א. כיון שהעיגולים זרים, פונקציה המתאימה לכל עיגול ב- A נקודה ב- $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ הנמצאת בתוכו היא

חח"ע (כי בין כל שני מספרים ממשיים יש לפחות מספר רציונאלי אחד). מכאן $|A| \leq |\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}| = \aleph_0$.

ב. לא. תהי B הקבוצה $\{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x^2 + y^2 = r^2\} \mid r \in \mathbb{R}^+\}$. כל המעגלים ב- B זרים.

הפונקציה $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x^2 + y^2 = r^2\}$ שמעבירה את $r \in \mathbb{R}$ לעיגול ברדיוס r היא

פונקצית חח"ע ועל מ- \mathbb{R}^+ ל- B . לכן $|B| = \aleph$.

4. הוכיחו ש- $\mathbb{N} \sim \mathbb{N} \times \{0, 1\}$.

פתרון:

נגדיר $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \{0, 1\}$. נגדיר פונקציה שלמעשה שומרת לכל מספר את תוצאת חלוקתו ב- 2

והשארית. לדוגמא: $f(7) = (3, 0)$ וכו'.

$$f(k) = \begin{cases} (k, 0) & x = 2k \\ (k+1, 1) & x = 2k+1 \end{cases}$$

נגדיר $g: \mathbb{N} \times \{0, 1\} \rightarrow \mathbb{N}$ ע"י $g(x, y) = 2k - y$.

נבצע הרכבה:

$$g \circ f(x) = \begin{cases} g(k, 0) & x = 2k \\ g(k+1, 1) & x = 2k+1 \end{cases} = \begin{cases} 2k-0 & x = 2k \\ 2k+2-1 & x = 2k+1 \end{cases} = x \Rightarrow g \circ f = I_{\mathbb{N}}$$

$$f \circ g(x) = f(2x-y) = \begin{cases} \left(\frac{2x-y}{2}, 0\right) & 2x-y \equiv 0 \pmod{2} \\ \left(\frac{2x-y-1}{2}, 1\right) & 2x-y \equiv 1 \pmod{2} \end{cases} = \begin{cases} (x, 0) & y = 0 \\ (x, 1) & y = 1 \end{cases} = (x, y)$$

$$\Rightarrow f \circ g = I_{\mathbb{N} \times \{0, 1\}}$$

לכן f חח"ע ועל. מש"ל

5. הוכיחו ש- $\{0,1\}^{\mathbb{N}} \times \{0,1\}^{\mathbb{N}} \sim \{0,1,2,3\}^{\mathbb{N}}$.

פתרון:

נגדיר $\Psi: \{0,1\}^{\mathbb{N}} \times \{0,1\}^{\mathbb{N}} \rightarrow \{0,1,2,3\}^{\mathbb{N}}$, $\Psi(f, g)(n) = 2f(n) + g(n)$,
בכיוון שני נגדיר: $\Phi: \{0,1,2,3\}^{\mathbb{N}} \rightarrow \{0,1\}^{\mathbb{N}} \times \{0,1\}^{\mathbb{N}}$, $\Phi(f) = (g, h)$ כאשר:

$$h(n) = f(n) \pmod{2} = \begin{cases} 0 & f(n) = 0, 2 \\ 1 & f(n) = 1, 3 \end{cases}$$

$$g(n) = \lfloor f(n)/2 \rfloor = \begin{cases} 0 & f(n) = 0, 1 \\ 1 & f(n) = 2, 3 \end{cases}$$

(כאשר $\lfloor f(n)/2 \rfloor$ הוא חלק שלם של $f(n)/2$).

כעת:

$$(\Psi \circ \Phi)(f)(n) = (\Psi(g, h))(n) = 2g(n) + h(n) = f(n) \Rightarrow \Psi \circ \Phi = I_{\{0,1,2,3\}^{\mathbb{N}}}$$

בכיוון שני:

$$\Phi \circ \Psi(f, g) = \Phi(2f + g) = (\lfloor (2f + g)/2 \rfloor, (2f + g) \pmod{2}) = (f, g)$$

בהצלחה!