

## תרגיל 10 בפונקציות מרוכבות

1. תהינה  $f_1(z), \dots, f_m(z)$  מספר סופי של פונקציות אנליטיות ב  $A = \{z \mid |z| < 1\}$  ונתון כי לכל  $z \in A$

$$f_1(z) \cdots f_m(z) = 0$$

הוכיחו כי לפחות אחת מהפונקציות האלה היא פונקצית האפס.  
**פתרון:** נגדיר

$$E_i = \{z \mid |z| \leq \frac{1}{2} \text{ and } f_i(z) = 0\}$$

לפי הנתון, ברור ש

$$\bigcup_{i=1}^n E_i = \{z \mid |z| \leq \frac{1}{2}\}$$

ולכן לפחות אחת מבין קבוצות אלו היא אינסופית. בלי הגבלת כלליות  $E_1$  היא אינסופית.  $E_1$  היא קבוצה אינסופית וחסומה, ולכן לפי בולצאנו ווירשטראס יש לה נקודת הצטברות, נניח  $p$ . ברור ש  $p \in A$  (למעשה  $\{z \mid |z| \leq \frac{1}{2}\}$  כי זאת קבוצה סגורה) וגם  $E_1 \subseteq A$  ו  $A$  קבוצה פתוחה. אז בעצם  $f_1$  מתאפסת על  $E_1$  שהיא קבוצה ב  $A$  עם נקודת הצטברות ב  $A$  ולכן לפי משפט היחידות

$$f_1(z) = 0 \quad \forall z \in A$$

2. מצאו את כל הפונקציות השלמות המקימות  $f(f(z)) = f(z)$ .

**פתרון:** ראשית נשים לב שכל הפונקציות הקבועות מקיימות את הדרישה. אם  $f(z)$  שלמה אבל לא קבועה, אז  $f(\mathbb{C})$  היא קבוצה עם נקודת הצטברות ב  $\mathbb{C}$ . (ראינו בתרגול ש  $f(\mathbb{C})$  צפופה ב  $\mathbb{C}$  ולכן כל נקודה היא נקודת הצטברות של  $f(\mathbb{C})$ ) אבל לפי הנתון, לכל  $a \in f(\mathbb{C})$  מתקיים  $f(a) = a$  ולכן לפי משפט היחידות  $f(z) = z$ . כמו כן,  $f(z) = z$  באמת מקיימת את התנאי. לסיכום הפונקציות שמקיימות את התנאי הן  $f(z) = z$  הן בדיוק הפונקציות הקבועות ו  $f(z) = z$ .

3. נניח כי הפונקציות  $f(z), g(z), r(z), h(z)$  אנליטיות בסביבה מנוקבת של  $z_0$ . בנוסף נתון כי ב  $z_0$  יש ל  $f$  קוטב מסדר 2 ל  $g$  יש אפס מסדר 3, ל  $r(z)$  אפס מסדר 2 ול  $h(z)$  אפס מסדר 1. מהו סוג הסינגולריות ב  $z_0$  של:

$$\frac{f(z)g(z)}{r(z)+h(z)} \quad (\text{א})$$

**פתרון:** לפי הנתונים

$$f(z) = \frac{\tilde{f}(z)}{(z-z_0)^2} \quad g(z) = (z-z_0)^3 \tilde{g}(z)$$

$$r(z) = (z-z_0)^2 \tilde{r}(z) \quad h(z) = (z-z_0) \tilde{h}(z)$$

כאשר כל הטילדות אנליטיות ולא מתאפסות ב  $z_0$ . כעת,

$$\frac{f(z)g(z)}{r(z)+h(z)} = \frac{(z-z_0)\tilde{f}(z)\tilde{g}(z)}{(z-z_0)^2\tilde{r}(z)+(z-z_0)\tilde{h}(z)} = \frac{\tilde{f}(z)\tilde{g}(z)}{(z-z_0)\tilde{r}(z)+\tilde{h}(z)}$$

מה שנשאר אנליטי ב  $z_0$  ולכן  $z_0$  סינגולריות סליקה.

$$(ב) \frac{f(z)+g(z)}{r(z)+h(z)}$$

**פתרון:** עם אותם סימונים של הסעיף הקודם

$$\frac{f(z)+g(z)}{r(z)+h(z)} = \frac{\frac{\tilde{f}(z)}{(z-z_0)^2} + (z-z_0)^3\tilde{g}(z)}{(z-z_0)^2\tilde{r}(z)+(z-z_0)\tilde{h}(z)} = \frac{1}{(z-z_0)^3} \frac{\tilde{f}(z) + (z-z_0)^5\tilde{g}(z)}{(z-z_0)\tilde{r}(z)+\tilde{h}(z)}$$

הפונקציה  $\frac{\tilde{f}(z)+(z-z_0)^5\tilde{g}(z)}{(z-z_0)\tilde{r}(z)+\tilde{h}(z)}$  אנליטית ב  $z_0$  ולכן  $z_0$  היא קוטב מסדר 3.

4. הסבירו מדוע  $z_0 = 1$  היא קוטב של הפונקציה

$$f(z) = \frac{\sin^3(z-1)}{(\text{Log } z)^4(1-\cos(z-1))^2}$$

ומצאו את סדר הקוטב.

**פתרון:** 1 הוא אפס מסדר כלשהוא של המונה והמכנה. נבין את הסדר. היות ש  $z_0 = 1$  הוא אפס מסדר 1 של  $\sin z$ , הוא אפס מסדר 3 של  $\sin^3(z-1)$ . 1 הוא אפס מסדר 1 של  $\text{Log } z$  (הוא הרי לא מאפס את הנגזרת  $\frac{1}{z}$ ) ולכן הוא אפס מסדר 4 של  $(\text{Log } z)^4$ . כמו כן 1 הוא אפס מסדר 2 של  $1-\cos(z-1)$ , למשל לפי הפיתוח טיילור

$$1-\cos(z-1) = \frac{(z-1)^2}{2} - \frac{(z-1)^4}{4!} + \dots$$

ולכן הוא אפס מסדר 4 של

$$(1-\cos(z-1))^2$$

לסיכום 1 הוא אפס מסדר 3 של המונה ומסדר 8 של המכנה ולכן הוא קוטב מסדר 5 של הפונקציה לפי משפט שראינו.

5. (א) תהי  $z_0$  קוטב של  $f(z)$ . איזה סינגולריות יש ל  $\frac{1}{f(z)}$  בנקודה  $z_0$ ? היות ש

$$\lim_{z \rightarrow z_0} |f(z)| = \infty$$

וודאי

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{f(z)} = 0$$

ולכן זו סינגולריות סליקה.

(ב) תהי  $z_0$  סינגולריות סליקה של  $f(z)$ . איזה סינגולריות יש ל  $\frac{1}{f(z)}$  בנקודה  $z_0$ ?  
(רמז: יש להפריד למקרים)  
אם

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = L \neq 0$$

אז

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{f(z)} = \frac{1}{L}$$

ולכן זו עדיין סינגולאריות סליקה אבל אם

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = 0$$

אז

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{f(z)} = \infty$$

ולכן זה קוטב.