


תלשון אנתרופוסטופי 3

פונקציה $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ מוגדרת על ידי $f(x) = x^2 \ln(x)$.
 נמצא את הנגזרת $f'(x)$ בנקודה $x=1$.
 נגזרת פונקציה $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ בנקודה $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ היא וקטור (f'_1, \dots, f'_n) שבו $f'_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$.

1. אולם ב- \mathbb{R}^n יש וקטורים שונים.
2. מרחב וקטורי \mathbb{R}^n הוא מרחב.

נבדוק את המרחב \mathbb{R}^n כמרחב וקטורי. נגדיר $\vec{v} = (x_1, \dots, x_n)$ ונבדוק את התכונות.
 3. מרחב וקטורי \mathbb{R}^n הוא מרחב.

"וקטור קטום" הוא אמצע בין שני וקטורים. נגדיר $\vec{v} = \frac{\vec{u} + \vec{w}}{2}$.



נבדוק את המרחב \mathbb{R}^n כמרחב וקטורי. נגדיר $\vec{v} = (x_1, \dots, x_n)$ ונבדוק את התכונות.

נבדוק את המרחב \mathbb{R}^n כמרחב וקטורי. נגדיר $\vec{v} = (x_1, \dots, x_n)$ ונבדוק את התכונות.

נגדיר $\vec{v} = (x_1, \dots, x_n)$ ונבדוק את התכונות.

נגדיר $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$ ונבדוק את התכונות.

$\vec{v} = a\vec{e}_1 + b\vec{e}_2$ - נגדיר $\vec{v} = a\vec{e}_1 + b\vec{e}_2$ ונבדוק את התכונות.

$\vec{v} = a\vec{e}_1 + b\vec{e}_2 + c\vec{e}_3$ - נגדיר $\vec{v} = a\vec{e}_1 + b\vec{e}_2 + c\vec{e}_3$ ונבדוק את התכונות.

$\vec{v} = \vec{v}_1 + x_n \vec{e}_n$ - נגדיר $\vec{v} = \vec{v}_1 + x_n \vec{e}_n$ ונבדוק את התכונות.


$\|\vec{v}\|^2 = \|\vec{v}_1\|^2 + x_n^2$ - נגדיר $\|\vec{v}\|^2 = \|\vec{v}_1\|^2 + x_n^2$ ונבדוק את התכונות.

$\|\vec{v}\|^2 = \sum_{k=1}^n x_k^2$ - נגדיר $\|\vec{v}\|^2 = \sum_{k=1}^n x_k^2$ ונבדוק את התכונות.

תכונות של הנורמה:

1. $\|v\| \geq 0$: א-סליל
2. $\|tv\| = |t| \|v\|$: הומוגניות
3. $\|u+v\| \leq \|u\| + \|v\|$: אי-סליל

$$\|u+v\| \leq \|u\| + \|v\|$$



הוכחה:

כדי להוכיח את האי-סליל, נבנה את המשולש הבא:

המשולש הבא:

אם $v \in V$ אז $\|v\| \in \mathbb{R}$. סוגי $\| \cdot \| : V \rightarrow \mathbb{R}$ נקראים נורמות.

1. $v \in V$ אז $\|v\| \geq 0$, $v=0$ אז $\|v\| = 0$.

2. $t \in \mathbb{R}$ אז $\|tv\| = |t| \|v\|$.

3. $\|u+v\| \leq \|u\| + \|v\|$ (ניסוח גאומטרי)

1. $\|x\|_\infty$

1. $\|x\|_\infty = \max_{1 \leq k \leq n} |x_k|$: נורמת האינסוף

2. $\|x\|_1 = \sum_{k=1}^n |x_k|$: נורמת האוקטדון

3. $f: [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$: פונקציה רציפה על $[a,b]$, \mathbb{R} : שדה

אם $f, g \in C([a,b])$ אז $f+g \in C([a,b])$ ו- $cf \in C([a,b])$ אם $c \in \mathbb{R}$.

אם $f \in C([a,b])$ אז f רציפה על $[a,b]$.

משפט: $\sum_{k=1}^n a_k x^k = p(x) \in C([a,b])$ אם $\{x^k\}_{k=0}^n$ היא בסיס פולינומי.

אם $p(x) \in C([a,b])$ אז $p(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$ עבור n מסוים.

אם $a_k = 0$ לכל $k > n$, אז $p(x) = 0$.


משפט: $\{x^k\}_{k=0}^n$ היא בסיס פולינומי על $[a,b]$ אם $f \in C([a,b])$.

אם $\{x^k\}_{k=0}^n$ היא בסיס פולינומי על $[a,b]$ אז $\{x^k\}_{k=0}^\infty$ היא בסיס פולינומי על $[a,b]$.

אם $\{x^k\}_{k=0}^\infty$ היא בסיס פולינומי על $[a,b]$ אז $C([a,b])$ היא סגורה תחת חיבור וקריאה.



התכונה הבסיסית של המכפלה הסקלרית: $\mathbb{R}^n \rightarrow$

$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$ - נקרא θ הזווית בין \vec{u} ל- \vec{v}



הקשר בין הצדדים של המשולש:

$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta$




הוכחה

מתקיים: $h^2 = b^2 - a_1^2 = c^2 - a_2^2$ - משוואות

$c^2 = b^2 + a_2^2 - a_1^2 = b^2 + (a_2 + a_1)(a_2 - a_1) = b^2 + a(a_2 - a_1 + a_1)$

פולינום: $c^2 = b^2 + a^2 - 2aa_1 = b^2 + a^2 - 2ab \cos \theta$ - פתרון



$\|\vec{v} - \vec{u}\|^2 = \|\vec{v}\|^2 + \|\vec{u}\|^2 - 2\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos \theta$ - משוואה

$\vec{v} - \vec{u} = (v_1 - u_1, \dots, v_n - u_n)$ ו- $\vec{v} = (v_1, \dots, v_n)$ ו- $\vec{u} = (u_1, \dots, u_n)$

$\sum_{k=1}^n (v_k - u_k)^2 = \sum_{k=1}^n v_k^2 + \sum_{k=1}^n u_k^2 - 2\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos \theta$ - משוואה

$\|\vec{v} - \vec{u}\|^2 = \|\vec{v}\|^2 + \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v}$ - משוואה

$\sum (v_k^2 + u_k^2 - 2u_k v_k) = \sum v_k^2 + \sum u_k^2 - 2\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos \theta$ - משוואה

$\|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cos \theta = \sum_{k=1}^n u_k v_k$ - משוואה

$\vec{u} \cdot \vec{v} = \sum u_k v_k$ - משוואה

תכונות של המרחב הריבועי

1. סימטריה: $(v, u) = (u, v)$

2. ליניאריות: $(u, av_1 + bv_2) = a(u, v_1) + b(u, v_2)$

$(au_1 + bu_2, v) = a(u_1, v) + b(u_2, v)$

3. חיוביות: $(u, u) \geq 0$ אם $u \neq 0$ ו-0 אחרת

הפונקציה $(,)$ נקראת מכפלה פנימית ו- $V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ היא פונקציה

ריבועית ו- \mathbb{R} -ליניארית

1. $(f, g) = \int_a^b f(x)g(x) dx$ - מכפלה פנימית על $C([a, b])$

2. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 < \infty$ - $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ היא סדרה ריבועית סוממת

המרחב \mathbb{R}^2 הוא מרחב פנימי

$\langle x, y \rangle = \sum x_n y_n$ - $x = (x_n), y = (y_n)$

כאשר $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ ו- $\|x\|^2 = \langle x, x \rangle$ - נורמה l^2 על V

הנורמה $\|f\|_{C([a, b])} = \max |f(x)|$ היא נורמת המרחב $C([a, b])$ והיא נורמת המרחב $C([a, b])$

המרחב \mathbb{R}^2 הוא מרחב פנימי ו- $\langle x, y \rangle = \sum (x_n - y_n)^2$ היא המכפלה הפנימית

$d(x, y) = \sum (x_n - y_n)^2$ - מרחק l^2 בין x, y

ד.ר. 3 ע. 1

1. סימטריה: $d(x, y) = d(y, x)$

2. חיוביות: $d(x, y) \geq 0$ ו- $d(x, y) = 0$ אם ורק אם $x = y$

3. אי-טריוויאליות: $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$

הערה: 1, 2, 3 מתקיימות

אם $d(x, y) = \|x - y\|$ - אז 3 ע. 1 מתקיימת

$d(x, z) = \|z - x\| = \|z - y + y - x\| \leq \|z - y\| + \|y - x\| = d(y, z) + d(x, y)$

$d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ קרוי מרחק אם x ו- y הם נקודות ב- X

למשל

$d(x,y) = \|y-x\| = \|x-y\|$ - \mathbb{R}^n מרחב וקטורי עם נורמה $\|\cdot\|$


$d(x,y) = \left[\sum_{k=1}^n (x_k - y_k)^2 \right]^{1/2}$ - $X = \mathbb{R}^n$ מרחב וקטורי עם נורמה $\|\cdot\|_2$

קבוצת $B(x,r) = \{y \in X \mid d(x,y) < r\}$ קרויה כדור (במרחב המרחק)

כדור $S \subset X$ נקראת קבוצה פתוחה אם לכל $x \in S$ קיים $r > 0$ (הוא תלוי x)

כדור $S \subset X$ נקראת כדור סגור אם $\overline{S} = S$

למשל



1. $B(x,r)$ הוא קב פתוח
 2. $B(x,r) \subset \overline{B(x,r)}$

כדור $B(x,r)$ הוא פתוח, $\overline{B(x,r)} = \overline{B(x,r-s)} \cup B(x,r-s)$

3. X הוא סגור - הפתרון...

הוכחה: X סגור כי אם $x \in X$ אז $r > 0$ אז $B(x, r) \subset X$

ϕ סגור כי אם $x \in \phi$ אז $B(x, r) \subset \phi$

כיון של $x \in \phi$ סגור אז $x \in \phi^c$ סגור

7. נניח $x = R \cdot \{0\} = R^T U R^{-T}$ (הצגת מטריצה)

R^T סגור כי אם $x \in R^T$ אז $x > 0$ ו- $B(x, r) \subset R^T$

אם R^{-T} סגור אז R סגור

כיון של R^T סגור ו- R^{-T} סגור אז R סגור

8. $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^3 y - 4x^2 y^5 < 6\}$ (זהו סגור כי אם $f(x, y) < 6$)


הוכחה: $f(x, y) = x^3 y - 4x^2 y^5$ אז $(x, y) \in S$ אם $f(x, y) < 6$

אם $(x, y) \in S$ אז $f(x, y) < 6$ ו- $f(x, y) < 6$ סגור

אם $f(x, y) < 6$ אז $(x, y) \in S$ כי f סגור

6. $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^3 y - e^{xy} \leq 8\}$ סגור

הוכחה: $S^c = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^3 y - e^{xy} > 8\}$ סגור



7. $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1\} \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1, x \geq 0\}$

S סגור כי אם $A \in S$ אז A סגור

S^c סגור כי אם $B \in S^c$ אז B סגור

שאלה 1: הוכח כי $S \subseteq X$ הוא קבוצה סגורה.

1. $B(x,r) \cap S \neq \emptyset$ לכל $x \in S$ וכל $r > 0$.

2. $B(x,r) \subseteq S^c$ לכל $x \in S^c$ וכל $r > 0$.

3. $B(x,r) \cap S \neq \emptyset$ לכל $x \in X$ וכל $r > 0$ אם $x \in S$.

4. $B(x,r) \cap S = \emptyset$ לכל $x \in S^c$ וכל $r > 0$.

5. $B(x,r) \cap S \neq \emptyset$ לכל $x \in X$ וכל $r > 0$ אם $x \in S$.

(S היא קבוצה סגורה אם ורק אם S^c היא קבוצה פתוחה)

שאלה 2: הוכח כי $S \subseteq X$ הוא קבוצה סגורה.

1. S היא קבוצה סגורה.

2. S היא קבוצה סגורה.

3. S היא קבוצה סגורה.

הוכחה: S היא קבוצה סגורה $\Leftrightarrow S^c$ היא קבוצה פתוחה.

1. S היא קבוצה סגורה $\Leftrightarrow S^c$ היא קבוצה פתוחה.

2. S היא קבוצה סגורה $\Leftrightarrow S^c$ היא קבוצה פתוחה.

3. S היא קבוצה סגורה $\Leftrightarrow S^c$ היא קבוצה פתוחה.

4. S היא קבוצה סגורה $\Leftrightarrow S^c$ היא קבוצה פתוחה.

5. S היא קבוצה סגורה $\Leftrightarrow S^c$ היא קבוצה פתוחה.

הוכחה: S היא קבוצה סגורה $\Leftrightarrow S^c$ היא קבוצה פתוחה.

הוכחה: $\epsilon > 0$ נבחר. $\exists \delta > 0$ כזה שכל $x \in B(x_0, \delta)$ מתקיים $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$.

נבחר $\delta > 0$ כזה שכל $x \in B(x_0, \delta)$ מתקיים $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$.

כל $x \in B(x_0, \delta)$ מתקיים $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$.

הוכחה:

$$T = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} S_k \text{ שבו } x \mapsto \text{מרחק } x \text{ אל } \{S_k\}_{k \in \mathbb{N}} \text{ קטן}$$

הוכחה: T סגור

$B(x, r) \subset S_k$ עבור $r > 0$ מסוימים S_k , $x \in S_k$ עבור $x \in T$ כל $x \in T$ מתקיים $x \in S_k$ עבור k מסוים.

הוכחה: T סגור $B(x, r) \subset T$ עבור $r > 0$ מסוים.

$$T = \bigcap_{k=1}^{\infty} S_k \text{ שבו } S_1 \supset S_2 \supset S_3 \supset \dots$$

הוכחה: T סגור

$B(x, r_k) \subset S_k$ עבור $r_k > 0$ מסוימים $k=1, \dots, n$ נבחר $r = \min\{r_1, \dots, r_n\}$.

הוכחה: T סגור $B(x, r) \subset T$ עבור $r > 0$ מסוים.

$B(x, r) \subset S$ עבור $r > 0$ מסוים $x \in S$ כל $x \in S$ מתקיים $x \in S$ עבור $r > 0$ מסוים.

$$S = \bigcup_{x \in S} B(x, r_x) \text{ הוכחה}$$

$x_0 \in B(x_0, r_0) \subset \bigcup_{x \in S} B(x, r_x)$ כל $x_0 \in S$ כל $x \in S$ מתקיים $x \in S$ עבור $r > 0$ מסוים.

$\bigcup_{x \in S} B(x, r_x) \subset S$ - הוכחה: $B(x, r_x) \subset S$ עבור $x \in S$.

הוכחה: T סגור $B(x, r) \subset T$ עבור $r > 0$ מסוים.

הוכחה: T סגור $B(x, r) \subset T$ עבור $r > 0$ מסוים. $(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n})$ עבור $R \rightarrow \mathbb{R}$.

בעיה 3: יהי $S \subset X$ קבוצה. הנהוגים המאפיין ϕ .

א. S סגורה.

$\Rightarrow S$ סגורה אם ϕ סגורה.

ב. S סגורה אם ϕ סגורה.

הוכחה: א. \Rightarrow ב. S סגורה $\Rightarrow S^c$ סגורה $\Rightarrow S^c$ סגורה $\Rightarrow S$ סגורה.

ב. \Rightarrow א. S סגורה $\Rightarrow S^c$ סגורה $\Rightarrow S^c$ סגורה $\Rightarrow S$ סגורה.

א. \Rightarrow ב. S סגורה $\Rightarrow S^c$ סגורה $\Rightarrow S^c$ סגורה $\Rightarrow S$ סגורה.

אם $x \in S^c$ אז $x \in S^c$ סגורה. $\Rightarrow S^c$ סגורה $\Rightarrow S$ סגורה.

אם $x \in S$ אז $x \in S$ סגורה.

א. \Rightarrow ב. S סגורה $\Rightarrow S^c$ סגורה $\Rightarrow S^c$ סגורה $\Rightarrow S$ סגורה.

אם $x \in S$ אז $x \in S$ סגורה. $\Rightarrow S$ סגורה $\Rightarrow S^c$ סגורה.

בעיה 4: א. S סגורה $\Rightarrow S^c$ סגורה.

\Rightarrow א. S סגורה $\Rightarrow S^c$ סגורה.

הוכחה: א. S סגורה $\Rightarrow S^c$ סגורה.

הוכחה: א. S סגורה $\Rightarrow S^c$ סגורה.

אם $x \in S$ אז $x \in S$ סגורה.

אם $x \in S^c$ אז $x \in S^c$ סגורה.

בעיה 5: יהי $S \subset X$ קבוצה. ϕ סגורה $\Rightarrow S$ סגורה.

הוכחה: נניח $x \in S$ אז $x \in S$ סגורה $\Rightarrow S$ סגורה.

אם $x \in S^c$ אז $x \in S^c$ סגורה $\Rightarrow S^c$ סגורה $\Rightarrow S$ סגורה.

אם $x \in S$ אז $x \in S$ סגורה.

הוכחה: יהי S סגורה $\Rightarrow S^c$ סגורה.

אם $x \in S$ אז $x \in S$ סגורה $\Rightarrow S$ סגורה.

אם $x \in S^c$ אז $x \in S^c$ סגורה $\Rightarrow S^c$ סגורה $\Rightarrow S$ סגורה.

הקדמה: יהי $S \subset X$ קבוצה. \bar{S} (הקליפה) של S היא קבוצת הנקודות הנצמדות ל- S .

$$\bar{S} = \bigcap_{F \text{ סביבת } S} F$$

הצגה: יהי $S \subset X$ קבוצה. \bar{S} היא קבוצת הנקודות הנצמדות ל- S .

למה: יהי $S \subset X$ קבוצה. \bar{S} היא קבוצת הנקודות הנצמדות ל- S .

$$\bar{S} \cap S = S, \quad S \subset \bar{S}, \quad S \subset S$$

הוכחה: $S \subset \bar{S}$: נניח $x \in S$. F היא סביבת של S .

$$S \subset F$$

לכן $x \in F$ לכל סביבת F של S . מכאן $x \in \bar{S}$.

כל $x \in \bar{S}$ הוא נקודה נצמדת ל- S . לכן $x \in F$ לכל סביבת F של S .

לכן $S \subset \bar{S}$ ו- $S \subset S$.


$$\bar{S} \cap S = S$$

$\bar{S} \subset S$: נניח $x \in \bar{S}$. $x \notin S$. $x \in F$ לכל סביבת F של S .

לכן x הוא נקודה נצמדת ל- S .

לכן $x \in S$ או $x \in F \setminus S$ לכל סביבת F של S .

אם $x \in F \setminus S$ לכל סביבת F של S , אז $\bar{S} \cap B(x, r) = \emptyset$ לכל $r > 0$.



לכן $x \in S$.

רצף גלובלית


הקבוצה $\{O_\alpha\}_{\alpha \in A}$ מכילה את S (כמו S עצמה) היא רצפה גלובלית $S \subseteq X$ אם ובלבד אם $S \subseteq \bigcup_{\alpha \in A} O_\alpha$ - כל נקודה $x \in S$ נמצאת ב- O_α עבור $\alpha \in A$

הקבוצה $S \subseteq X$ רצפה גלובלית (כמו S עצמה) אם ובלבד אם $S = \bigcup_{k=1}^{\infty} O_{\alpha_k}$ - כל נקודה $x \in S$ נמצאת ב- O_{α_k} עבור $k \in \mathbb{N}$

← למה אם רצפה גלובלית $S \subseteq X$ אז יש לכל נקודה $x \in S$ סביבה גלובלית

הקבוצה $S \subseteq X$ רצפה גלובלית אם ובלבד אם $d(x, y) = r > 0$ (כמו S עצמה) אז יש לכל נקודה $x \in S$ סביבה גלובלית $B(x, \frac{r}{2}) \subseteq S$

כל נקודה $y \in S$ נמצאת ב- $B(x, \frac{r}{2})$ ו- $B(y, \frac{r}{2}) \subseteq B(x, r)$. מכאן $B(x, \frac{r}{2}) \subseteq S$.




במקרה $S = \mathbb{R}$, $r = \min(r_1, \dots, r_n)$ ו- $r > 0$ אם S רצפה גלובלית.

אם $k \in \mathbb{N}$ ו- $B(x, \frac{r}{k}) \subseteq S$ אז $B(x, \frac{r}{2}) \subseteq S$ (כי $\frac{r}{2} < \frac{r}{k}$ עבור $k \geq 2$).

אם $S = \emptyset$ אז $B(x, \frac{r}{2}) \cap S = \emptyset$ עבור $x \notin S$. לכן S רצפה גלובלית.

הקבוצה $S \subseteq X$ רצפה גלובלית אם ובלבד אם $k(S) < \infty$ (כמו S עצמה) אז יש לכל נקודה $x \in S$ סביבה גלובלית $B(x, r)$ עבור $r = \frac{1}{k(S)}$

הקבוצה $S \subseteq X$ רצפה גלובלית אם ובלבד אם $k(S) < \infty$ (כמו S עצמה) אז יש לכל נקודה $x \in S$ סביבה גלובלית $B(x, r)$ עבור $r = \frac{1}{k(S)}$



← למה אם רצפה גלובלית $S \subseteq X$ אז יש לכל נקודה $x \in S$ סביבה גלובלית

הקבוצה $S \subseteq X$ רצפה גלובלית אם ובלבד אם $k(S) < \infty$ (כמו S עצמה) אז יש לכל נקודה $x \in S$ סביבה גלובלית $B(x, n)$ עבור $n \in \mathbb{N}$

כל נקודה $y \in S$ נמצאת ב- $B(x, n)$ ו- $B(y, n) \subseteq B(x, 2n)$. מכאן $B(x, n) \subseteq S$.

כל S רצפה גלובלית

← למה אם רצפה גלובלית $S \subseteq X$ אז יש לכל נקודה $x \in S$ סביבה גלובלית

הקבוצה $S \subseteq X$ רצפה גלובלית אם ובלבד אם $k(S) < \infty$ (כמו S עצמה) אז יש לכל נקודה $x \in S$ סביבה גלובלית $B(x, n)$ עבור $n \in \mathbb{N}$

כל נקודה $y \in S$ נמצאת ב- $B(x, n)$ ו- $B(y, n) \subseteq B(x, 2n)$. מכאן $B(x, n) \subseteq S$.

אם $F \subseteq S$ אז $F \cup \{O_\alpha\}_{\alpha \in A} = F \cup \{O_\alpha\}_{\alpha \in A}$ (כמו S עצמה) אז יש לכל נקודה $x \in F$ סביבה גלובלית $B(x, n)$ עבור $n \in \mathbb{N}$

כל F רצפה גלובלית $F \subseteq S$ אם ובלבד אם $k(F) < \infty$ (כמו F עצמה) אז יש לכל נקודה $x \in F$ סביבה גלובלית $B(x, n)$ עבור $n \in \mathbb{N}$

$\mathbb{R} \rightarrow$ קצוות: $\boxed{\text{גובה} = \text{רוחב}}$ והוא משולש ישר זווית $\mathbb{R}^n \rightarrow$ וקטור n -י

$$\{x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid a_k \leq x_k \leq b_k, 1 \leq k \leq n\} - \text{קובץ}$$

ההיקף k -י הוא $[a_k, b_k]$

$\mathbb{R}^n \rightarrow$ קובץ גובה רוחב ←

הגובה $\{T_m\}$ של קובץ \mathbb{R}^n הוא $T_1 \supset T_2 \supset T_3 \supset \dots$ - $\lim_{m \rightarrow \infty} k(T_m) = 0$

כל $T_m = \prod_{k=1}^n [a_k^{(m)}, b_k^{(m)}]$

המספרים $[a_k^{(m)}, b_k^{(m)}]$ הם k -היקף של T_m

אם $[a_k^{(m)}, b_k^{(m)}] \supset [a_k^{(n)}, b_k^{(n)}]$ - אז $T_m \supset T_n$

נראה שיש להם גובה אחד. אם $T_m \supset T_n$ אז $[a_k^{(m)}, b_k^{(m)}] \supset [a_k^{(n)}, b_k^{(n)}]$

כל $1 \leq k \leq n$ - $a_k^{(m)} \leq a_k^{(n)} \leq b_k^{(n)} \leq b_k^{(m)}$

אם $T_m \supset T_n$ אז $\prod_{k=1}^n [a_k^{(m)}, b_k^{(m)}] \supset \prod_{k=1}^n [a_k^{(n)}, b_k^{(n)}]$

קובץ גובה רוחב: $T = \prod_{k=1}^n [a_k, b_k]$ - T הוא קובץ \mathbb{R}^n שגובהו T

המספרים $\{a_k\}_{k=1}^n$ הם T - T הוא קובץ \mathbb{R}^n שגובהו T

הוא $[a_k, b_k]$ - $[a_k, b_k]$ הוא קובץ \mathbb{R}^1 שגובהו $[a_k, b_k]$

הוא $[a_k, b_k]$ - $[a_k, b_k]$ הוא קובץ \mathbb{R}^1 שגובהו $[a_k, b_k]$

$$\{T_m\}_{m=1}^{\infty}, \{a_k^{(m)}\}_{m=1}^{\infty}$$

אם $T_m \supset T_n$ אז $a_k^{(m)} \leq a_k^{(n)} \leq b_k^{(n)} \leq b_k^{(m)}$

אם $T_m \supset T_n$ אז $a_k^{(m)} \leq a_k^{(n)} \leq b_k^{(n)} \leq b_k^{(m)}$

אם $T_m \supset T_n$ אז $a_k^{(m)} \leq a_k^{(n)} \leq b_k^{(n)} \leq b_k^{(m)}$

אם $T_m \supset T_n$ אז $a_k^{(m)} \leq a_k^{(n)} \leq b_k^{(n)} \leq b_k^{(m)}$

אם $T_m \supset T_n$ אז $a_k^{(m)} \leq a_k^{(n)} \leq b_k^{(n)} \leq b_k^{(m)}$

אם $T_m \supset T_n$ אז $a_k^{(m)} \leq a_k^{(n)} \leq b_k^{(n)} \leq b_k^{(m)}$

אם $T_m \supset T_n$ אז $a_k^{(m)} \leq a_k^{(n)} \leq b_k^{(n)} \leq b_k^{(m)}$

אם $T_m \supset T_n$ אז $a_k^{(m)} \leq a_k^{(n)} \leq b_k^{(n)} \leq b_k^{(m)}$

אם $T_m \supset T_n$ אז $a_k^{(m)} \leq a_k^{(n)} \leq b_k^{(n)} \leq b_k^{(m)}$

משפט 11: (משפט הייב-קרוס) ←

קבוצת $S \subset \mathbb{R}^n$ קומפקטית \Leftrightarrow היא סגורה ומסומת.

הוכחה: (\Rightarrow) אם נתון S קומפקטית, אזי S היא סגורה וסומת. (33 גם ניתן להוכיח זאת).

(\Leftarrow) אם S היא סגורה ומסומת, אז S קומפקטית.

אם T קומפקטית, אז S היא קומפקטית.

$$l^2 = \left\{ x = (x_n)_{n=1}^{\infty} \mid \|x\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} x_n^2 < \infty \right\}$$

היא סגורה ומסומת. (ראו גם משפט 11).
נראה ש- l^2 היא סגורה ומסומת.

$$e_1 = (1, 0, 0, \dots), e_2 = (0, 1, 0, \dots)$$

... $e_n = (0, \dots, 1, \dots)$. $S = \{e_1, e_2, \dots\}$ היא סגורה ומסומת.

כל $S \subset B(0, 2)$ היא סגורה ומסומת.

$$d(e_n, e_m) = \|e_n - e_m\| = \sqrt{2} \quad (n \neq m)$$

כל S היא סגורה ומסומת.

כל S היא קומפקטית.

כל S היא סגורה ומסומת.

כל S היא סגורה ומסומת.

כל S היא סגורה ומסומת.

כל S היא סגורה ומסומת.

כל S היא סגורה ומסומת.

אלגוריתם $S \subseteq X$ מניח את (X, d) ויש Case 12 ←

יש S ויש F - F מניח את $F \subseteq S$ ויש $F \subseteq S$ ויש $F \subseteq S$

הוכחה: $S \subseteq X$ ויש $F \subseteq S$ ויש $F \subseteq S$ ויש $F \subseteq S$

יש $x \in S$ ויש $x \in F$ ויש $x \in F$ ויש $x \in F$

$$\emptyset = F \cap B(x, r) \text{ - יש } r > 0 \text{ ויש } x \notin F \text{ ויש } \{x\} = F \cap B(x, r_x)$$

יש S ויש S ויש S ויש S ויש S

$$B(x_k, r_k) - B(x_k, r_k) \text{ - יש } r_k > 0 \text{ ויש } x_k \in F$$

יש $B(x_k, r_k) \cap F \neq \emptyset$ ויש $F \subseteq \bigcup_{k=1}^n B(x_k, r_k)$ ויש $F \subseteq \bigcup_{k=1}^n B(x_k, r_k)$


יש $F \subseteq \bigcup_{k=1}^n B(x_k, r_k)$ ויש $F \subseteq \bigcup_{k=1}^n B(x_k, r_k)$

יש $F \subseteq \bigcup_{k=1}^n B(x_k, r_k)$


דוגמה: יש S ויש S ויש S ויש S

יש S ויש S ויש S ויש S ויש S

משפטים



המשפטים $S \subset X$ הם כולם "על" זהים



המשפטים: X מורכב מכל המשפטים $S \subset X$ שיש להם משפטים

$S \cap A, S \cap B \neq \emptyset \implies S \subset A \cup B, (A \cap B) \cap S \neq \emptyset$ וכן $A \cap B \neq \emptyset$

משפטים $S \subset X$ שיש להם משפטים

$S \subset A \cup B \implies S$ משפטים $A \cap B$ משפטים S משפטים S

משפטים S משפטים $S \subset A$ משפטים $S \subset A \cup B$ משפטים $A \cap B$ משפטים S משפטים S

משפטים

משפטים $R \setminus \{0\}$

$B = R^+ = \{x \in R \mid x > 0\}, A = R^- = \{x \in R \mid x < 0\}, S = R \setminus \{0\}$ משפטים

משפטים S משפטים $S \cap A, S \cap B \neq \emptyset \implies S = A \cup B$ משפטים $S \subset A \cup B$ משפטים $A \cap B$

משפטים R משפטים R משפטים R משפטים R משפטים R

משפטים R^n משפטים R^n משפטים R^n

משפטים P משפטים Q משפטים R^n משפטים R^n משפטים R^n

משפטים $Q - P$ משפטים P משפטים P משפטים P משפטים P

$Q = P + (Q - P)$ משפטים $Q - P$ משפטים $Q - P$ משפטים $Q - P$

משפטים $0 \leq t \leq 1$ משפטים $x_t = P + t(Q - P)$ משפטים $x_t = P + t(Q - P)$

משפטים $0 \leq t \leq 1$ משפטים $x_t = P + t(Q - P)$ משפטים $x_t = P + t(Q - P)$

משפטים $P = (4, 2, 3), Q = (5, 1, 0) \in R^3$ משפטים $P = (4, 2, 3), Q = (5, 1, 0) \in R^3$

משפטים $(x, y, z) = P + t(Q - P)$ משפטים $(x, y, z) = P + t(Q - P)$

משפטים $0 \leq t \leq 1$ משפטים $(x, y, z) = (4, 2, 3) + t(1, -1, -3)$ משפטים $(x, y, z) = (4, 2, 3) + t(1, -1, -3)$

משפטים $z = 3 - 3t, y = 2 - t, x = 4 + t$ משפטים $z = 3 - 3t, y = 2 - t, x = 4 + t$

משפטים R^3 משפטים R^3 משפטים R^3 משפטים R^3 משפטים R^3

1.11.13

2. \mathbb{R}^2 של המישור

המשפט: $PQ \subset A \cup B$ ו- $A, B \in \mathbb{R}^2$ אזי לכל נקודה x במישור \mathbb{R}^2 קיים $P, Q \in \mathbb{R}^2$ כך ש-

$Q = x \in B$ ו- P נמצא במרחק ϵ מ- x , P, Q נמצאים במרחק ϵ מ- A, B

$$U \equiv \sup \{ t \in (0, 1) \mid x_t \in A \} \equiv \sup K \quad - \text{ענין}$$

(כ- \sup מ- ϵ) \Rightarrow U נמצא ב- A או B או $U=1$ או $U=0$ (אם A או B ריקים)

1.11.13

המשפט: $x_t \in A$ או $x_t = x_t = Q \in B$ ו- $U=1$ או $U=0$

$A \rightarrow$ אם $x_t \in A$ אז $x_t \in A$ ו- $U=1$ או $U=0$ (אם A ריק)

$x_t \in A$ ו- $U=1$ או $U=0$ (אם A ריק)

1.11.13

$x_t \in B$, $U=0$ או $U=1$ או $U=1$ או $U=0$ (אם B ריק)

K - \sup של K ו- $U=1$ או $U=0$ (אם K ריק)

1.11.13

המשפט: $PQ \subset A \cup B$ ו- $A, B \in \mathbb{R}^2$ אזי לכל נקודה x במישור \mathbb{R}^2 קיים $P, Q \in \mathbb{R}^2$ כך ש-

המשפט: $S = \bigcup_{\alpha \in A} S_\alpha$ ו- $\bigcap_{\alpha \in A} S_\alpha \neq \emptyset$ ו- $x \rightarrow$ המרחק $d(x, S)$ ו- $S \subset \mathbb{R}^n$


המשפט: $S \subset B \subset C$ ו- $S \subset B \subset C$ ו- $S \subset B \subset C$ ו- $S \subset B \subset C$

$S \subset B \subset C$ ו- $S \subset B \subset C$ ו- $S \subset B \subset C$


המשפט: $S \subset B \subset C$ ו- $S \subset B \subset C$ ו- $S \subset B \subset C$

המשפט: $S \subset B \subset C$ ו- $S \subset B \subset C$ ו- $S \subset B \subset C$

המשפט: $S \subset B \subset C$ ו- $S \subset B \subset C$ ו- $S \subset B \subset C$




1.11.13



$$S_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1, y = \frac{1}{x}\}$$

$$S_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \neq 0, -1 \leq y \leq 1\}$$



נקודת $S = S_1 \cup S_2$ היא איננה (קבוצה איננה) של איננה איננה S_1 או S_2 דוגמה של איננה $S \rightarrow$
 קבוצה S איננה איננה

קבוצה S איננה

בהינתן $A, B \subset \mathbb{R}^2$ קבוצה איננה S איננה $S \subset A \cup B$ קבוצה איננה $S \subset A \cup B$ קבוצה איננה

קבוצה S איננה (כפי היא קבוצה) קבוצה איננה $S \subset A$ קבוצה איננה $S \subset A$ קבוצה איננה

כיון S איננה איננה קבוצה איננה $S \subset A$ או $S \subset B$ קבוצה איננה $S \subset A$ קבוצה איננה $S \subset A$ קבוצה איננה

בהינתן N מכילה נקודות של S
 קבוצה $N \subset S$ קבוצה איננה $N \subset A$ קבוצה איננה $N \subset A$ קבוצה איננה

הצגה: X היא מרחב מטרי (X, d) ו- $x \in X$. נניח $\{x_n\}$ היא סדרה ב- X .

$x_n \rightarrow x$ אם ורק אם $\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, x) = 0$. כלומר $\forall \epsilon > 0$ קיים $n_0 \in \mathbb{N}$ כך ש- $\forall n > n_0$ מתקיים $d(x_n, x) < \epsilon$.

$\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, x) = 0 \iff x_n \rightarrow x$: הצגה

קולמה 1: $x_n \rightarrow x$ אם ורק אם $\forall \epsilon > 0$ קיים n_0 כך ש- $\forall n > n_0$ מתקיים $d(x_n, x) < \epsilon$.

אם $x_n \rightarrow x$ אז $x_n \rightarrow x$ ו- $x_n \rightarrow x$ (הצגה 2)

$d(x_n, y_n) \rightarrow d(x, y)$ אם $x_n \rightarrow x$ ו- $y_n \rightarrow y$ (הצגה 3)

הצגה 3: $d(x_n, y_n) \rightarrow d(x, y)$ אם $x_n \rightarrow x$ ו- $y_n \rightarrow y$.

$d(x, z) - d(x, y) \leq d(y, z)$ - כל $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ - כל $d(x, z) - d(x, y) \leq d(y, z)$ (הצגה 4)

אם $y_n \rightarrow y$ ו- $x_n \rightarrow x$ אז $d(x_n, y_n) \rightarrow d(x, y)$.

$0 \leq |d(x_n, y_n) - d(x, y)| = |d(x_n, y_n) - d(x_n, y) + d(x_n, y) - d(x, y)| \leq d(y_n, y) + d(x_n, x) \rightarrow 0$

$d(x_n, y_n) \rightarrow d(x, y)$ - הצגה 3

קולמה 2: $x_n \rightarrow x$ אם ורק אם $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x\| = 0$ (הצגה 5)

$\|x_n\| \rightarrow \|x\|$ (הצגה 6), $\|cx_n\| \rightarrow \|cx\|$ (הצגה 7), $\|x_n \pm y_n\| \rightarrow \|x \pm y\|$ (הצגה 8)

$1 \leq k \leq n$ כל $x_k^{(n)} \rightarrow x \iff \mathbb{R}^n \rightarrow x^{(n)} = (x_1^{(n)}, \dots, x_n^{(n)}) \rightarrow x = (x_1, \dots, x_n)$ (הצגה 9)

אם $x_k^{(n)} \rightarrow x_k$ אז $x^{(n)} \rightarrow x$ (הצגה 10)

(הצגה 10) $x_k^{(n)} \rightarrow x_k$ אם ורק אם $\forall \epsilon > 0$ קיים n_0 כך ש- $\forall n > n_0$ מתקיים $|x_k^{(n)} - x_k| < \epsilon$.

הצגה 10

$d(x_n, y_n, x+y) = \|x_n - y_n - (x+y)\| = \|(x_n - x) + (y_n - y) - (x+y)\| \leq \|x_n - x\| + \|y_n - y\| + \|x+y\|$ (הצגה 11)

אם $x_n \rightarrow x$ ו- $y_n \rightarrow y$ אז $x_n + y_n \rightarrow x + y$ (הצגה 12)

$d(cx_n, cx) = \|cx_n - cx\| = |c| \|x_n - x\| \rightarrow 0$ (הצגה 13)

$0 \leq |\|x_n\| - \|x\|| \leq \|x_n - x\| \rightarrow 0$ (הצגה 14)

$0 \leq \|x_k^{(n)} - x_k\| \leq \left(\sum_{j=1}^n |x_j^{(n)} - x_j|^2 \right)^{1/2} = \|x^{(n)} - x\|$ (הצגה 15)

$\lim_{n \rightarrow \infty} x_k^{(n)} = x_k$ אם ורק אם $|x_k^{(n)} - x_k| \rightarrow 0$ - כל $x_k^{(n)} \rightarrow x_k$ (הצגה 16)

$\lim_{n \rightarrow \infty} \|x^{(n)} - x\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\sum_{k=1}^n (x_k^{(n)} - x_k)^2} = \sqrt{\sum_{k=1}^n 0} = 0$ - כל $x_k^{(n)} \rightarrow x_k$ (הצגה 17)

$y_k^{(n)} \rightarrow y_k$, $x_k^{(n)} \rightarrow x_k$ - כל $x_k^{(n)} y_k^{(n)} \rightarrow x_k y_k$ (הצגה 18)

$x^{(n)} \cdot y^{(n)} = \sum_{k=1}^n x_k^{(n)} y_k^{(n)} \rightarrow \sum_{k=1}^n x_k y_k = x \cdot y$

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n}, (1 + \frac{2}{n})^n) \rightarrow \text{על } \mathbb{R}^2$

הוכחה: $(1, e^2)$ - נקודה קצרה

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n}, \sin n) \rightarrow \text{על } \mathbb{R}^2$

הוכחה: אין נקודה יחידה כלשהי

הוכחה: (x, d) נקודה כלשהי

אם $\{x_n\}$ סדרה מתכנסת, אז $\{x_n\}$ נמצא בתוך $[a, b]$

הוכחה: סדרה מתכנסת היא סדרה חסומה

כל סדרה חסומה היא סדרה מתכנסת

3. $x_n \rightarrow x$ אם ורק אם $x_n \rightarrow x$

4. $x \in S$ אם ורק אם $\exists \{x_n\} \subset S$ מתכנסת ל- x

הוכחה: $\{x_n\} \subset S$ מתכנסת ל- x

הוכחה: אם $x \in S$ אז יש סדרה מתכנסת ל- x

הוכחה: S סגור, אז $x \in S$

אם $x \notin S$, אז x איננו נקודה מצומצמת של S

הוכחה: S סגור, אז $x \in S$

הוכחה: $\{x_n\} \subset S$ מתכנסת ל- x

הוכחה: $x \in S$ אם ורק אם $\exists \{x_n\} \subset S$ מתכנסת ל- x

הוכחה: $B(x, \frac{1}{2}) \cap S \neq \emptyset$ כי $x \in S$

אם $n_2 > n_1$, אז $x_{n_2} \in B(x, \frac{1}{3})$

אם $n_3 > n_2$, אז $x_{n_3} \in B(x, \frac{1}{k})$

הוכחה: $x_n \rightarrow x$

← שאלה 5 על סדרות וצמצום \mathbb{R}^n

היה $\{x_n\}$ סדרה חסומה ב- \mathbb{R}^n , אז יש לה סדרה מתכנסת.

תוצאה: נניח $\{x_n\}$ חסומה, אז יש לה סדרה מתכנסת $\|x_n\| \leq M$ - $n \in \mathbb{N}$ לכל M מסוים.

היא אכן מתכנסת - $\{x_n\} \subseteq \overline{B(0, M)}$. אז יש לה סדרה מתכנסת - $\overline{B(0, M)}$ קומפקטית.

כלומר יש לה סדרה מתכנסת $\{x_{n_k}\}$ מתוך הסדרה המקורית $\{x_n\} \rightarrow \overline{B(0, M)}$.

תוצאה: על סדרות וצמצום לניסוח \mathbb{R}^n מתבסס טורם בלייב

למשל, \mathbb{R}^2 וקטורי ה"בסיס" - $e_1 = (1, 0, \dots)$, $e_2 = (0, 1, \dots)$ וכו' מהווים סדרה חסומה $\{e_n\}_{n=1}^\infty$.

אז, אם יש סדרה מתכנסת,

תוצאה: ההתכנסות של $\{x_n\}$ היא x ומהחבירה יש לה סדרה מתכנסת Sx מתוך הסדרה המקורית.

כל סדרה $\rightarrow S$ היא קבוצת חזקה S , כל S קומפקטית.

מקרה של ϵ \rightarrow $\{x_n\}$ סדרה ב (X, d) מתכנסת ל x אם ורק אם $\forall \epsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}$ כזה ש $\forall n, m > N$ מתקיים $d(x_n, x_m) < \epsilon$

למה זה נכון? \leftarrow

נניח $\{x_n\}$ מתכנסת ל x . ניקח $\epsilon > 0$. נבחר N כזה ש $\forall n > N$ מתקיים $d(x_n, x) < \frac{\epsilon}{2}$.
אם $n, m > N$ אז $d(x_n, x_m) \leq d(x_n, x) + d(x, x_m) < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$.
לכן $\{x_n\}$ היא סדרה קוסימה.

המשפט הפוך נכון?

כן, למשל $X = \mathbb{R}$ עם המטרית הרגילה.

$\mathbb{Q} \rightarrow$ סדרה קוסימה ב \mathbb{R} איננה בהכרח סדרה קוסימה ב \mathbb{Q} .

למשל $\{1, 1.4, 1.41, 1.414, \dots\}$ היא סדרה קוסימה ב \mathbb{R} אבל לא ב \mathbb{Q} .

אם $\{x_n\}$ היא סדרה קוסימה ב \mathbb{R} אז היא מתכנסת ל מספר רציונלי או אירracional.

למשל $\{1/n\}$ היא סדרה קוסימה ב \mathbb{R} ונתכנסת ל 0 .

המשפט הפוך נכון: (X, d) סדרה קוסימה מתכנסת ל x אם ורק אם $\forall \epsilon > 0 \exists N$ כזה ש $\forall n > N$ מתקיים $d(x_n, x) < \epsilon$.

המשפט הפוך נכון: "אם ורק אם"

אם $\{x_n\}$ היא סדרה קוסימה ב \mathbb{R} אז היא מתכנסת ל מספר רציונלי או אירracional.

צד 1: $\epsilon > 0$ בחרו δ כזה ש

\rightarrow אם $d(x_n, x) < \delta$ אז $|f(x_n) - f(x)| < \epsilon$.
 נבחר $\delta = \epsilon$.

צד 2: $\epsilon = 1$. כיון ש f מתחבט, אז $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ כך ש $d(x_{n_0}, x) < 1$.

$$M = \max\{d(x_1, x), d(x_2, x), \dots, d(x_{n_0}, x)\}$$

אם $n > n_0$, אז $d(x_n, x) < M$. לפי ההנחה $d(x_n, x) < \epsilon$.

נבחר $\delta = \epsilon$. אז $\forall n > n_0$ מתקיים $d(x_n, x) < \delta \Rightarrow |f(x_n) - f(x)| < \epsilon$.

$$d(x_n, x) < \frac{\epsilon}{2} \text{ אז } |f(x_n) - f(x)| < \frac{\epsilon}{2}$$

$$d(x_{n_k}, x_{n_l}) < \frac{\epsilon}{2} \text{ אז } |f(x_{n_k}) - f(x_{n_l})| < \frac{\epsilon}{2}$$

לכן $\lim_{k \rightarrow \infty} d(x_{n_k}, x) = 0$ וכן $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(x)$.

תוצאה 1: $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ היא פונקציה רציפה אם ורק אם f מתחבט.

הוכחה: \Rightarrow אם f מתחבט, אז f רציפה. \Leftarrow אם f רציפה, אז f מתחבט.

אם f רציפה, אז $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$ כך ש $d(x, y) < \delta \Rightarrow d(f(x), f(y)) < \epsilon$.

אם f מתחבט, אז $\exists x_0 \in \mathbb{R}^n$ כך ש $d(x_n, x_0) < \delta$.

תוצאה 2: (X, d) היא מרחב מטריקה אם d מקיימת:

1. $d(x, y) \geq 0$ ו $d(x, x) = 0$.
 2. $d(x, y) = d(y, x)$.
 3. $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

אם X היא קבוצה, אז d היא מטריקה אם d מקיימת את התנאים לעיל.

אם X היא קבוצה, אז d היא מטריקה אם d מקיימת את התנאים לעיל.

תוצאה 3: (X, d) היא מרחב מטריקה אם d מקיימת את התנאים לעיל.

אם X היא קבוצה, אז d היא מטריקה אם d מקיימת את התנאים לעיל.

אם X היא קבוצה, אז d היא מטריקה אם d מקיימת את התנאים לעיל.

אם X היא קבוצה, אז d היא מטריקה אם d מקיימת את התנאים לעיל.

$(Y, d_Y), (X, d_X)$ שני מרחבי מטריקה.

נתון פונקציה $f: E \rightarrow Y$ ושאלתנו היא:

$F \subseteq E$ מרחב, פונקציה $f: E \rightarrow Y$ ופונקציה $F \rightarrow Y$ שנקראת $f|_F$.

$x \in F$ בל $f|_F(x) = f(x)$ - כלומר $f|_F: F \rightarrow Y$ - פונקציה F של f על F .

השאלה: E בל f ב p - F בל $f|_F$ ב p ?

$x \in E$ שאלתנו היא $\delta > 0$ ו $\epsilon > 0$ בל $x \in E$ ו $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = q \in Y$ - שאלתנו היא $d_Y(f(x), q) < \epsilon$ שאלתנו היא $0 < d_X(x, p) < \delta$ שאלתנו היא

התשובה היא: כן - E בל f ב p - F בל $f|_F$ ב p .

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = q \in Y$$

$\epsilon > 0$ $f(x) \rightarrow q$, $p \neq x \rightarrow p$ - $E \rightarrow \{x\}$ מרחב בל \rightarrow

$$\lim_{x \rightarrow p} f|_H(x) = q - H \text{ בל } f|_H \text{ ב } p \text{ ו } H \subseteq E$$

הוכחה

$f(x) \rightarrow q$ ב E - $\epsilon > 0$ $p \neq x \rightarrow p$ מרחב בל \rightarrow $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = q$ ו $\epsilon > 0$ $x \in E$

$x \in E$ שאלתנו היא $\delta > 0$ ו $\epsilon > 0$ $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = q$ ו $\epsilon > 0$ $x \in E$

מרחב בל \rightarrow $p \neq x \rightarrow p$ ו $\epsilon > 0$ $d_Y(f(x), q) < \epsilon$ - שאלתנו היא $0 < d_X(x, p) < \delta$ -

שאלתנו היא $f(x) \rightarrow q$ ו $d_Y(f(x), q) < \epsilon$ - שאלתנו היא $0 < d_X(x, p) < \delta$ שאלתנו היא

$\delta > 0$ בל \rightarrow $\epsilon > 0$ $\lim_{x \rightarrow p} f(x) \neq q$ - שאלתנו היא $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = q$ ו $\epsilon > 0$ $x \in E$

$x \in E$ ו $\delta = \frac{1}{n}$ שאלתנו היא $d(f(x), q) \geq \epsilon$ - שאלתנו היא $d(x, p) < \delta$ - $x \in E$ ו

$\lim_{x \rightarrow p} f(x) \neq q$ בל $x \rightarrow p$, שאלתנו היא $d(f(x), q) \geq \epsilon$ שאלתנו היא $d(x, p) < \frac{1}{n}$ - $\epsilon > 0$

שאלתנו היא $f|_E = f$ בל $\lim_{x \rightarrow p} f|_E(x) = q$ - שאלתנו היא $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = q$ ו $\epsilon > 0$ $x \in E$

שאלתנו היא $\lim_{x \rightarrow p} f|_E(x) = q$ - שאלתנו היא $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = q$ - $\epsilon > 0$ $x \in E$

$d(f(x), q) < \epsilon$ - שאלתנו היא $0 < d(x, p) < \delta$ - $x \in E$ שאלתנו היא $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = q$ - $\epsilon > 0$ $x \in E$

$d(f(x), q) < \epsilon$ - שאלתנו היא $x \in E$ ו $0 < d(x, p) < \delta$ - $x \in E$ שאלתנו היא $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = q$

לפי $\lim_{x \rightarrow p} f|_E(x) = q$ שאלתנו היא

התשובה היא: כן - שאלתנו היא $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = q$ ו $\epsilon > 0$ $x \in E$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$

היון צור 3 צור ←

$f(x) \leq g(x) \leq h(x) \rightarrow E \rightarrow p \rightarrow \infty$ $E \in (\mathbb{R}^2 \text{ y } p \in \mathbb{R})$

$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = L$, $\lim_{x \rightarrow p} h(x) = L \in \mathbb{R}$ - e $\forall \epsilon > 0$

$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = 0 \iff \lim_{x \rightarrow p} h(x) = 0$ 1 2 3

$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = 0$ $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in D_f \cap (p-\delta, p+\delta) \implies |f(x)| < \epsilon$ 1 2 3

-2 3 4 5 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2x^2y}{x^2+y^2} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x \cdot \frac{2y}{x^2+y^2} = 0$ 1 2 3

[$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2 \implies x^2+y^2 < \delta \implies |2xy| < \epsilon$]

צור $g: Y \rightarrow Z$, $f: X \rightarrow Y$ 1 2 3 4 5 ←

$\lim_{y \rightarrow q} g(y) = g(q) = r \in Z$ - $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall y \in Y \cap (q-\delta, q+\delta) \implies |g(y) - r| < \epsilon$

$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = q \in Y$ - $\forall \delta > 0 \exists \epsilon > 0 \forall x \in X \cap (p-\epsilon, p+\epsilon) \implies |f(x) - q| < \delta$

$f(x_n) \rightarrow q$ - $\forall \delta > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N \implies |f(x_n) - q| < \delta$ 1 2 3 4 5

$(g \circ f)(x_n) \rightarrow r$ - $\forall \epsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N \implies |(g \circ f)(x_n) - r| < \epsilon$

$\lim_{x \rightarrow p} (g \circ f)(x) = r$ - $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in X \cap (p-\delta, p+\delta) \implies |(g \circ f)(x) - r| < \epsilon$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

$x \rightarrow p$ $y = f(x) \rightarrow q$, $\lim_{y \rightarrow q} g(y) = r$ - $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall y \in Y \cap (q-\delta, q+\delta) \implies |g(y) - r| < \epsilon$

$\lim_{x \rightarrow p} g(f(x)) = \lim_{y \rightarrow q} g(y) = r$ - $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in X \cap (p-\delta, p+\delta) \implies |g(f(x)) - r| < \epsilon$

$\lim_{(x,y) \rightarrow (2,1)} \frac{(x^2y^2 - 4xy) \arcsin(x-y)}{\arctan(3xy-6)}$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

$t \rightarrow 0$ $(x,y) \rightarrow (2,1)$ $t^2 - 4 = x^2y^2 - 4xy$, $3t = 3xy - 6$ $\implies t = xy - 2$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

- $\exists \delta > 0 \forall t \in (-\delta, \delta) \implies |t| < \delta$

$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{(t^2-4) \arcsin t}{\arctan(3t)} = \lim_{t \rightarrow 0} (t^2-4) \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\arcsin(t)}{\arctan(3t)} = (-4) \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1/\sqrt{1-t^2}}{3 \cdot 1/(1+9t^2)} = \frac{4}{3}$

"גזירות תוצרת"

זכור, מלבד, תוצרת. י"ז מוגדרת: $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x,y)$ מתקיים

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x,y)$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (2,4)} x^2 e^{xy} \quad \text{תוצרת}$$

$$\lim x^2 e^{xy} = \lim \lim x^2 e^{xy} = \lim x^2 e^{4x} = 4e^8$$

ישנה גם תוצרת:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} x \sin\left(\frac{1}{1-y}\right) \quad \text{1 תוצרת}$$

(0 ושל 0) (0 ושל 0) 0 ושל 0, ק"מ ושל 0

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 1} x \sin\left(\frac{1}{1-y}\right) = 0 \quad \text{תוצרת}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2+y^2} \quad \text{2 תוצרות}$$

בדרך תוצרת תוצרת תוצרת

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{xy}{x^2+y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0 \quad \text{תוצרת}$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xy}{x^2+y^2} = 0 \quad \text{, p 16}$$

$$f: X \rightarrow \mathbb{R}^n \text{ (vector)}$$

$f(p) = (f_1(p), f_2(p), \dots, f_n(p)) \in \mathbb{R}^n$ $\forall p \in X$ and X is a subset of \mathbb{R}^m

$1 \leq k \leq n, f_k: X \rightarrow \mathbb{R}$ is scalar

$f = (f_1, f_2, \dots, f_n)$ is a vector-valued function $f: E \rightarrow \mathbb{R}^n$ where $E \subseteq \mathbb{R}^m$

is a subset of \mathbb{R}^m and $p \in E$

$$f) \lim_{x \rightarrow p} f_k(x) = q_k, (1 \leq k \leq n) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow p} f(x) = q$$

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = (q_1, q_2, \dots, q_n) \in \mathbb{R}^n, p \in E$$

sequence of points $\{x_m\}$ in X such that $x_m \rightarrow p$ (where $x_m \neq p$):

then the sequence $(f_1(x_m), f_2(x_m), \dots, f_n(x_m))$ converges

$$\mathbb{R}^n \ni (q_1, \dots, q_n)$$

$$\lim_{m \rightarrow \infty} f_k(x_m) = q_k, 1 \leq k \leq n \Leftrightarrow \lim_{m \rightarrow \infty} f(x_m) = q$$

$$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow p} f(x) = q \in \mathbb{R}^n, q = (q_1, \dots, q_n)$$


$$\lim_{x \rightarrow p} f_k(x) = q_k \in \mathbb{R} \text{ for } 1 \leq k \leq n \Leftrightarrow$$

מבוא

תהי $E \subset X$ קבוצה פתוחה ב- X , $f: E \rightarrow Y$ פונקציה רציפה.
 נניח $p \in E$ ו- $\delta > 0$ מסויים. אז קיים $\epsilon > 0$ כזה ש-
 $d_Y(f(p), f_w) < \epsilon$ לכל $d_X(p, x) < \delta$ ו- $x \in E$.
 זהו הביטוי לרציפות בנקודה p .
 רציפות בנקודה p מובילה לרציפות בנקודה $f(p)$.
 רציפות בנקודה $f(p)$ מובילה לרציפות בנקודה p .
 (משפט 1.1)

תהי $E \subset X$ קבוצה פתוחה ב- X , $f: E \rightarrow Y$ פונקציה רציפה.
 נניח $p \in E$ ו- $\delta > 0$ מסויים. אז קיים $\epsilon > 0$ כזה ש-
 $d_Y(f(p), f_w) < \epsilon$ לכל $d_X(p, x) < \delta$ ו- $x \in E$.
 זהו הביטוי לרציפות בנקודה p .

תהי $f: E \rightarrow Y$ פונקציה רציפה. נניח $p \in E$ ו- $\delta > 0$ מסויים.
 אז קיים $\epsilon > 0$ כזה ש- $d_Y(f(p), f_w) < \epsilon$ לכל $d_X(p, x) < \delta$ ו- $x \in E$.
 זהו הביטוי לרציפות בנקודה p .



תהי $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ פונקציה רציפה. נניח $p \in \mathbb{R}^n$ ו- $\delta > 0$ מסויים.
 אז קיים $\epsilon > 0$ כזה ש- $d_Y(f(p), f_w) < \epsilon$ לכל $d_X(p, x) < \delta$ ו- $x \in \mathbb{R}^n$.
 זהו הביטוי לרציפות בנקודה p .

$$f_3(x, y, z) = z \quad f_2(x, y) = y \quad f_1(x, y) = x$$

תהי $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ פונקציה רציפה. נניח $p \in \mathbb{R}^n$ ו- $\delta > 0$ מסויים.
 אז קיים $\epsilon > 0$ כזה ש- $d_Y(f(p), f_w) < \epsilon$ לכל $d_X(p, x) < \delta$ ו- $x \in \mathbb{R}^n$.
 זהו הביטוי לרציפות בנקודה p .

תהי $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ פונקציה רציפה. נניח $p \in \mathbb{R}^n$ ו- $\delta > 0$ מסויים.
 אז קיים $\epsilon > 0$ כזה ש- $d_Y(f(p), f_w) < \epsilon$ לכל $d_X(p, x) < \delta$ ו- $x \in \mathbb{R}^n$.
 זהו הביטוי לרציפות בנקודה p .

קבוצה S היא $f: E \rightarrow Y$ שבה $S = X$ היא נקודה אחת בלבד

$f(x, y, z) = z^3 e^{xz} - \bar{0}$ - $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ וזו היא

היא נקודה אחת בלבד ב- \mathbb{R}^3 , כי היא מתחברת לנקודה אחת בלבד

$g(z) = z^3 e^{xz} - \bar{0}$ - $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ - $f_3(x, y, z) = z - \bar{0}$ - $f_3: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$

היא נקודה אחת בלבד ב- \mathbb{R} , כי היא מתחברת לנקודה אחת בלבד

\mathbb{R}^3 היא נקודה אחת בלבד $f = g \circ f_3$ - e - 1 נקודה אחת בלבד

$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x \neq 0\}$ היא נקודה אחת בלבד $f(x, y, z) = \frac{1}{x^2}$ וזו היא

$g(x) = \frac{1}{x^2} - \bar{0}$ - $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ וזו $f_1(x, y, z) = x - \bar{0}$ - $f_1: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ וזו

היא נקודה אחת בלבד ב- \mathbb{R} , כי היא מתחברת לנקודה אחת בלבד

היא נקודה אחת בלבד ב- \mathbb{R}^3 , כי היא מתחברת לנקודה אחת בלבד

יש נקודה אחת בלבד \leftarrow

יש x ונקודה אחת בלבד $E \subset X$ - $f, g: E \rightarrow \mathbb{R}^m$ וזו $f, g: E \rightarrow \mathbb{R}^m$ וזו

היא נקודה אחת בלבד ב- \mathbb{R}^m , כי היא מתחברת לנקודה אחת בלבד

היא נקודה אחת בלבד

$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ היא נקודה אחת בלבד $f(x, y, z) = x^2 - y^2 - z^2$ וזו היא

\mathbb{R}^3 היא נקודה אחת בלבד $f(x, y, z) = \frac{e^{xz}y - zx \cos y^2}{e^{z^2} \sin y}$ וזו היא


$f_1(x, y, z) = x^2 - y^2 - z^2$ וזו $f_2(x, y, z) = y - \bar{0}$ וזו $f_3(x, y, z) = x^2$

\mathbb{R}^3 היא נקודה אחת בלבד $e^{xz}y$, \mathbb{R}^3 היא נקודה אחת בלבד x^2y - e - 1 נקודה אחת בלבד

f היא נקודה אחת בלבד ב- \mathbb{R}^3 , כי היא מתחברת לנקודה אחת בלבד

היא נקודה אחת בלבד ב- \mathbb{R} , כי היא מתחברת לנקודה אחת בלבד

גיאומטריה אנליטית



הפונקציה $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ מייצגת את המישור $\mathbb{R}^3 \rightarrow z = f(x, y)$ הישרי.

משפט 1

1. מישור במרחב \mathbb{R}^3


יש להגדיר את המישור באמצעות וקטור נורמלי \vec{n} ונקודה (x_0, y_0, z_0) עליו.

אם $\vec{x} = (x_1, x_2, x_3)$, $\vec{y} = (y_1, y_2, y_3)$ ו- $\mathbb{R}^3 \rightarrow$ וקטור נורמלי \vec{n} .

הקוטרינגול של שני וקטורים \vec{x} ו- \vec{y} הוא $\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \vec{x} \cdot \vec{y} = \sum_{k=1}^3 x_k y_k = \|\vec{x}\| \cdot \|\vec{y}\| \cdot \cos \theta$.

אם $\vec{x} \perp \vec{y}$ אז $\cos \theta = 0$ ו- $\vec{x} \cdot \vec{y} = 0$.

המשוואה הכללית של המישור (x, y, z) היא $\vec{n} \cdot \vec{r} = d$ כאשר $\vec{r} = (x, y, z)$ ו- $\vec{n} = (a, b, c)$.




המשוואה $\vec{n} \cdot \vec{r} = d$ היא $a(x-x_0) + b(y-y_0) + c(z-z_0) = 0$.

אם $\vec{n} = (a, b, c)$ ו- $\vec{r} = (x, y, z)$ אז $\vec{n} \cdot \vec{r} = ax + by + cz = d$.

המשוואה $\vec{n} \cdot \vec{r} = d$ היא $a(x-x_0) + b(y-y_0) + c(z-z_0) = 0$.

אם $a, b, c \neq 0$ אז $z = f(x, y) = \frac{1}{c}(d - ax - by)$.

אם $a = 0$ אז המישור הוא $z = \frac{d - by}{c}$.




אם $a = 0$ ו- $b = 0$ אז המישור הוא $z = \frac{d}{c}$.

אם $a = 0$ ו- $c = 0$ אז המישור הוא $x = \frac{d - by}{a}$.

אם $a = 0$ ו- $b = 0$ ו- $c = 0$ אז המישור הוא $x = \frac{d}{a}$.

2. מישור במרחב \mathbb{R}^3




המשוואה הכללית של המישור $z = f(x, y)$ היא $z = f(\sqrt{x^2 + y^2})$.

אם $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ אז המישור הוא $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.

אם $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} + c$ אז המישור הוא $z = \sqrt{x^2 + y^2} + c$.


משוואות



3. נוסחה של $z = a\sqrt{x^2 + y^2}$ עבור קונוס


$z = a\sqrt{x^2 + y^2}$ משוואת קונוס

$z^2 = a^2x^2 + a^2y^2$ - משוואת קונוס



4. נוסחה של $z = a(x^2 + y^2)$ עבור פרימה

$z = a(x^2 + y^2)$ משוואת פרימה



5. נוסחה של $z = f(x, y) = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$ עבור פרימה

משוואת פרימה $z = c$ עבור קונוס

עבור $z = c$ כאשר $c > 0$ עבור קונוס

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ כאשר $c = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ עבור $z = c > 0$

משוואת פרימה $z = c$ עבור קונוס

משוואת פרימה $z = \frac{y^2}{b^2}$, $x = 0$ כאשר $z = \frac{x^2}{a^2}$ כאשר $y = 0$

משוואת פרימה $z = c$ עבור קונוס

$z = c$ כאשר $c < 0$, עבור קונוס

6. נוסחה של R^n עבור קונוס

משוואת פרימה $P = (p_1, p_2, p_3)$ ו- $Q = (q_1, q_2, q_3)$ עבור קונוס

$x(t) = p_1 + t(q_1 - p_1)$, $y(t) = p_2 + t(q_2 - p_2)$, $z(t) = p_3 + t(q_3 - p_3)$ - משוואת קונוס

משוואת פרימה $z = c$ עבור קונוס

$\frac{x-p_1}{q_1-p_1} = \frac{y-p_2}{q_2-p_2} = \frac{z-p_3}{q_3-p_3}$ משוואת פרימה

משוואת פרימה $z = c$ עבור קונוס

אבסטר

האבסטר: $f: X \rightarrow Y$ של

$f(A) = \{f(x) \in Y \mid x \in A\} \subseteq Y$ - כאן $A \subseteq X$ (קבוצה) של $x \in A$ של

$f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\} \subseteq X$ - כאן $B \subseteq Y$ (קבוצה) של $y \in B$ של

האבסטר f^{-1} הוא הפונקציה ההפוכה (אם קיימת) של f .

$f^{-1}(S^c) = (f^{-1}(S))^c$, $f^{-1}(\bigcap_{\alpha \in A} S_\alpha) = \bigcap_{\alpha \in A} f^{-1}(S_\alpha)$, $f^{-1}(\bigcup_{\alpha \in A} S_\alpha) = \bigcup_{\alpha \in A} f^{-1}(S_\alpha)$; $S_\alpha \subseteq Y$ קבוצות

$f(\bigcup_{\alpha \in A} S_\alpha) = \bigcup_{\alpha \in A} f(S_\alpha)$ - כלומר f שומר על איחוד.

אם f של $S \subseteq X$ של $S \subseteq f^{-1}(f(S))$ של $S \subseteq X$ של

כל f של $f^{-1}(f(S)) \subseteq S$ של $S \subseteq Y$ של

האבסטר $f: X \rightarrow Y$ - $f^{-1}(f(S)) \subseteq S$ ו- $f(S) \subseteq f(f^{-1}(f(S)))$ ←

האבסטר $f^{-1}(0)$ הוא $0 \subseteq Y$ האבסטר של $f \iff (x \in 0) \iff f(x) = 0$

הוכחה

$x \rightarrow$ האבסטר $f^{-1}(0)$ הוא האבסטר של $0 \subseteq Y$ ←

$x \in f^{-1}(0) \iff f(x) = 0$ - כלומר $x \in f^{-1}(0) \iff f(x) = 0$

$f(x) = 0 \iff x \in f^{-1}(0)$ - כלומר $f^{-1}(0) = \{x \in X \mid f(x) = 0\}$

$B(f(x), \epsilon) \subseteq 0$ - כלומר $f(x) = 0$ - כלומר $f(x) = 0$

$d(f(x), f(y)) < \epsilon$ - כלומר $d(x, y) < \delta$ של $\delta > 0$ כל $x, y \in X$ של

$y \in B(x, \delta) \implies f(y) \in B(f(x), \epsilon)$ - כלומר $f(B(x, \delta)) \subseteq B(f(x), \epsilon)$

האבסטר $f^{-1}(0)$ של 0 הוא האבסטר של 0 - כלומר $f^{-1}(0) = \{x \in X \mid f(x) = 0\}$


כל $x \in X$ של $x \in f^{-1}(0) \iff f(x) = 0$ - כלומר $f^{-1}(0) = \{x \in X \mid f(x) = 0\}$

$x \rightarrow$ האבסטר $f^{-1}(B(f(x), \epsilon))$ - כלומר $f^{-1}(B(f(x), \epsilon)) = \{x \in X \mid f(x) \in B(f(x), \epsilon)\}$

$B(x, \delta)$ של $x \in X$ של $f^{-1}(B(f(x), \epsilon))$ של $x \in X$ של

$d(x, y) < \delta \implies f(y) \in B(f(x), \epsilon)$ - כלומר $f(B(x, \delta)) \subseteq B(f(x), \epsilon)$

$x \rightarrow$ האבסטר $f^{-1}(B(f(x), \epsilon))$ של $x \in X$ של $f^{-1}(B(f(x), \epsilon)) = \{x \in X \mid f(x) \in B(f(x), \epsilon)\}$



כל $x \in X$ של $f^{-1}(B(f(x), \epsilon)) = \{x \in X \mid f(x) \in B(f(x), \epsilon)\}$

סקירה: $f: X \rightarrow Y$ זיהיה \Leftrightarrow לכל $y \in Y$ קיימת $x \in X$ כזה ש- $f(x) = y$.
הכחשה: \Leftarrow $f: X \rightarrow Y$ אינה סגורה, אז $K \subsetneq f^{-1}(K)$ לכל $K \subset Y$.
 אם $f^{-1}(K) = K$ לכל $K \subset Y$, אז f סגורה.
 \Rightarrow נקח $y \in Y$ סגורה, נזכה להוכיח $f^{-1}(\{y\}) = \{y\}$.
 כיון ש- $\{y\}$ סגורה, $\{y\} \cap f^{-1}(\{y\}) = \{y\}$.
 לכל $x \in f^{-1}(\{y\})$ קיימת $x' \in f^{-1}(\{y\})$ (המשווא $f(x) = y$).

דוגמאות:

1. נניח $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ו- $f(x) = x^2$.
 \mathbb{R} סגורה אבל $f(\mathbb{R}) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$ אינו סגור.
 אולם - אם ניקח סבוג' זיהיה נאצייה f סגורה.

2. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ו- $f(x) = 0$.
 \mathbb{R} סגורה אבל $f(\mathbb{R}) = \{0\}$ אינו סגור.
 למה? הסיבה היא $f^{-1}(\{0\}) = \mathbb{R}$ אינו סגור.
 נראה שיש להוסיף f^{-1} ו- f אינו סגור.

3. נניח $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ו- $f(x) = \sqrt{x}$.
 נניח $f^{-1}(R) = [0, \infty)$ לכל $R \subset \mathbb{R}$ (אז f סגור).
 אז כן, סגור לכל $y \in \mathbb{R}$ קיימת $x \in [0, \infty)$ כזה ש- $f(x) = y$.
 כלומר f מוקמה f^{-1} על $E \subset X$, אם E סגור ו- $f^{-1}(E) = E$.
 דוגמה, f מוקמה f^{-1} על $[0, \infty)$ ו- \mathbb{R} .
 אז $f^{-1}(\mathbb{R}) = [0, \infty)$ סגור! כי הוא סגור ו- $f^{-1}([0, \infty)) = [0, \infty)$.

אנטי-הכחשה: \Leftarrow נניח f מוקמה f^{-1} על X .
 אז f מוקמה f^{-1} על $E \subset X$ לכל $E \subset X$.
 f זיהיה $\Leftrightarrow E \subset f^{-1}(E)$ לכל $E \subset X$.
 אז f זיהיה $\Leftrightarrow f^{-1}(E) = E$ לכל $E \subset X$.

קבוצה $S \subseteq E \subset X$ נקראת פתוחה (open) אם לכל (x, d) יש $\epsilon > 0$ כך ש- $B(x, \epsilon) \subseteq S$.

כלומר, לכל $x \in S$ קיים $\epsilon > 0$ כך ש- $B(x, \epsilon) \subseteq S$.

דוגמה: $E = [0, \infty)$ במרחב \mathbb{R} עם המטרית האוקלידית. E אינה פתוחה כי $0 \in E$ אבל $B(0, \epsilon) \not\subseteq E$ לכל $\epsilon > 0$.

$$B(0, \epsilon) = \{x \in \mathbb{R} \mid |x - 0| < \epsilon\} = (-\epsilon, \epsilon) \not\subseteq [0, \infty)$$

משפט 5: $S \subseteq E \subset X$ היא פתוחה אם ורק אם $E \setminus S$ סגורה.

$S = A \cap E$ עבור $A \subseteq X$ פתוחה $\Leftrightarrow E \setminus S$ סגורה.

\Leftrightarrow (E, d) היא פתוחה (במרחב (E, d)) אם ורק אם S פתוחה.

S פתוחה אם ורק אם לכל $x \in S$ קיים $\delta_x > 0$ כך ש- $B(x, \delta_x) \subseteq S$.

$$S = \bigcup_{x \in S} B(x, \delta_x)$$

$$B(x, \delta_x) = \{y \in E \mid d(x, y) < \delta_x\} = E \cap B(x, \delta_x) \text{ (במרחב } (E, d)\text{)}$$

$$\text{כלומר } B(x, \delta_x) = \{y \in X \mid d(x, y) < \delta_x\}$$

$$S = E \cap \left(\bigcup_{x \in S} B(x, \delta_x) \right) \Leftrightarrow S = \bigcup_{x \in S} B(x, \delta_x) \cap E \Leftrightarrow S = \bigcup_{x \in S} B(x, \delta_x) \Leftrightarrow (E, d) \text{ פתוחה ב-} S$$

דוגמה: $E = [0, 1]$ במרחב \mathbb{R} עם המטרית האוקלידית. E היא פתוחה במרחב (E, d) כי $E \setminus E = \emptyset$ סגורה.

$$E \setminus E = \emptyset$$

משפט 6: $S \subseteq E \subset X$ היא פתוחה אם ורק אם $E \setminus S$ סגורה.

$$S = E \cap K \text{ עבור } K \subseteq X \text{ סגורה} \Leftrightarrow$$

S פתוחה $\Leftrightarrow E \setminus S$ סגורה $\Leftrightarrow E \cap (E \setminus S)$ סגורה.

כלומר, S פתוחה $\Leftrightarrow S = S \cap E$ עבור $S \subseteq X$ סגורה.

E היא פתוחה במרחב (E, d) כי $E \setminus E = \emptyset$ סגורה.

$$S = G \cap E \text{ עבור } G \subseteq X \text{ פתוחה} \Leftrightarrow$$

S פתוחה $\Leftrightarrow E \setminus S$ סגורה $\Leftrightarrow E \cap (E \setminus S)$ סגורה.

משפט 7: $f: E \rightarrow Y$ היא פונקציה רציפה אם ורק אם $f^{-1}(G)$ פתוחה לכל $G \subseteq Y$ פתוחה.


$$f \text{ רציפה} \Leftrightarrow f^{-1}(G) \text{ פתוחה} \text{ לכל } G \subseteq Y \text{ פתוחה}$$

דוגמה: $f: X \rightarrow Y$ היא תצורה ו- $E \subseteq Y$ קבוצה. $f^{-1}(E)$ היא תצורה.

דוגמה: נניח $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ הוא $f(x) = x^2$. אז $f^{-1}(\{1\}) = \{-1, 1\}$ היא תצורה.

דוגמה: נניח $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ הוא $f(x) = x^2$. אז $f^{-1}(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ היא תצורה.

דוגמה: נניח $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ הוא $f(x) = x^2$. אז $f^{-1}(\{0\}) = \{0\}$ היא תצורה.



דוגמה: נניח $f: (0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^2$ הוא $f(t) = (\cos t, \sin t)$. אז $f^{-1}(\{(1, 0)\}) = \{0\}$ היא תצורה.

f היא תצורה כי f היא תצורה. נניח $f: (0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^2$ הוא $f(t) = (\cos t, \sin t)$. אז $f^{-1}(\{(1, 0)\}) = \{0\}$ היא תצורה.

נניח $P_n = (\cos \frac{1}{n}, \sin \frac{1}{n})$ כך ש- $P_n \rightarrow (1, 0)$ ו- $g(P_n) = \frac{1}{n}$.

אז $g^{-1}(\{0\}) = \{(1, 0)\}$ היא תצורה.

דוגמה: נניח $f: E \rightarrow Y$ היא תצורה ו- $E \subseteq X$ קבוצה. אז $f^{-1}(E) = E$ היא תצורה.

דוגמה: נניח $f: E \rightarrow Y$ היא תצורה ו- $E \subseteq X$ קבוצה. אז $f^{-1}(E) = E$ היא תצורה.

נניח $f: E \rightarrow Y$ היא תצורה ו- $E \subseteq X$ קבוצה. אז $f^{-1}(E) = E$ היא תצורה.

נניח $f: E \rightarrow Y$ היא תצורה ו- $E \subseteq X$ קבוצה. אז $f^{-1}(E) = E$ היא תצורה.

נניח $f: E \rightarrow Y$ היא תצורה ו- $E \subseteq X$ קבוצה. אז $f^{-1}(E) = E$ היא תצורה.

נניח $f: E \rightarrow Y$ היא תצורה ו- $E \subseteq X$ קבוצה. אז $f^{-1}(E) = E$ היא תצורה.

דוגמה: נניח $f: E \rightarrow Y$ היא תצורה ו- $E \subseteq X$ קבוצה. אז $f^{-1}(E) = E$ היא תצורה.

נניח $f: E \rightarrow Y$ היא תצורה ו- $E \subseteq X$ קבוצה. אז $f^{-1}(E) = E$ היא תצורה.

הצגה: "אפסה" $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ היא התחנה של פונק' רציפה אוקטס \mathbb{R}^n אל \mathbb{R}^m .

אפסה 2: אפסה $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ היא אפסה רציפה.

הוכחה: נניח ש- f היא אפסה $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. אפ' רציפה של f היא $I \subset \mathbb{R}^n$ ופונק' רציפה

$f: I \rightarrow \mathbb{R}^m$ כך ש- $f(I) = J \subset \mathbb{R}^m$ אפ' רציפה של f היא $I \subset \mathbb{R}^n$ ופונק' רציפה

אפ' רציפה של f היא $f(I) = J \subset \mathbb{R}^m$.

הוכחה: אפ' רציפה של f היא $I \subset \mathbb{R}^n$ ופונק' רציפה

אפסה 3: (אפסה של פונק' רציפה)

יב' (x, d) אפ' רציפה ופונק' רציפה $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ (רציפה)

אז נניח ש- $E \subset X$ אפ' רציפה ופונק' רציפה של f היא $f(E) = J \subset \mathbb{R}$ ופונק' רציפה

אפ' רציפה של f היא $f(E) = J \subset \mathbb{R}$ ופונק' רציפה

הוכחה: כיון ש- f רציפה ו- E אפ' רציפה, $f(E)$ אפ' רציפה $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

אפ' רציפה של f היא $f(E) = J \subset \mathbb{R}$ ופונק' רציפה

$$O_1 = \{y \in \mathbb{R} \mid y > c\}, O_2 = \{y \in \mathbb{R} \mid y < c\}$$

אז $f(E) \subset O_1 \cup O_2$, $\emptyset = O_1 \cap O_2$ ופונק' רציפה

אז $f(E) \subset O_1$ או $f(E) \subset O_2$ או $f(E) \cap O_1 \neq \emptyset$ ופונק' רציפה

$$f(E) \cap O_2 \neq \emptyset, f(E) \cap O_1 \neq \emptyset$$

אז $f(E) \cap O_1 \neq \emptyset$ ופונק' רציפה

$f: E \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה

$(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ נקודה קבועה פונקציה $f: E \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ נקודה קבועה

יחס (x_0, y_0) פונקציה f ל הפונקציה נקודה קבועה

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0) = f'_x(x_0, y_0) = D_x f(x_0, y_0) \text{ - שכיחה בלבד}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y} \text{ - יחס } y \text{ של הפונקציה נקודה קבועה}$$

$g(x) = f(x, y_0)$ - פונקציה של x ופונקציה $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$ נקודה קבועה

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x_0 + \Delta x) - g(x_0)}{\Delta x} = g'(x_0) \text{ - נקודה קבועה}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = h'(y_0) \text{ - שכיחה } h(y) = f(x_0, y) \text{ נקודה קבועה}$$

דוגמה

$f_x(1, 2), f_y(1, 2)$ של הפונקציה $f(x, y) = \sin(x^2 y + y^3)$ נקודה קבועה

$g(x) = \cos(2x^2 + 8) \cdot 4x$ - שכיחה $g(x) = \sin(2x^2 + 8)$ נקודה קבועה $y=2$ נקודה קבועה : $f_x(1, 2)$

$f_x(1, 2) = g'(1) = 4 \cdot \cos(4)$ - נקודה קבועה

$h(y) = (1+3y^2) \cos(y+y^3)$ - שכיחה $h(y) = \sin(y+y^3)$ נקודה קבועה $x=1$ נקודה קבועה : $f_y(1, 2)$

$f_y(1, 2) = h'(2) = 13 \cdot \cos(4)$ - נקודה קבועה

(x, y) נקודה קבועה פונקציה f_x, f_y נקודה קבועה $f(x, y) = \sin(x^2 y + y^3)$ נקודה קבועה

$f_x(x, y) = 2xy \cos(x^2 y + y^3)$: x נקודה קבועה של הפונקציה נקודה קבועה : f_x

$f_y(x, y) = (x^2 + 3y^2) \cos(x^2 y + y^3)$: y נקודה קבועה של הפונקציה נקודה קבועה : f_y

1 נקודה קבועה של הפונקציה נקודה קבועה $(1, 2)$ נקודה קבועה נקודה קבועה

$$f_x = \frac{(x^2 + y^2)(3x^2) - x^3(2x)}{(x^2 + y^2)^2} \quad f_y = \frac{(x^2 + y^2)(0) - x^3(2y)}{(x^2 + y^2)^2}$$

$f_x : (x, y) \neq (0, 0)$ נקודה קבועה

f_y

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$f_y(0, 0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0, 0 + \Delta y) - f(0, 0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{0^3}{\Delta y^2} = 0$: נקודה קבועה $f_x(0, 0)$ נקודה קבועה

$f_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(\Delta x)^3}{(\Delta x)^2} = 1$

מפתח פתרון

$$(0,0) \rightarrow \text{נקודה נתונה}, f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

$$f_x(0,0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0+\Delta x, 0) - f(0,0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0-0}{\Delta x} = 0$$

אז $f_y(0,0) = 0$ גם הנוסף וההנחה

אם $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2+y^2}$ לא קיים

אם הנוסף לא ז'רס, אז יש לנו שני גורמים \rightarrow אין פתרון

אם f_x ו- f_y קיימים בנקודה זו

אם f_x ו- f_y קיימים בנקודה זו, אז f היא פונקציה דיפרנציאלית

ישל: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ היא פונקציה רציפה ב- x_0 \iff 1 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\varepsilon(\Delta x)}{\Delta x} = 0$ - כל $\varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ כזה ש- $\forall \Delta x$ המקיים $|\Delta x| < \delta$ מתקיים $|\varepsilon(\Delta x)| < \varepsilon$

$f(x_0 + \Delta x) = f(x_0) + A\Delta x + \varepsilon(\Delta x)$ - כל Δx בלבד מקיים

הוכחה:

\implies נניח $f(x_0) = A$ ונניח $\varepsilon(\Delta x) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) - A\Delta x$ - כל Δx המקיים $|\Delta x| < \delta$ מתקיים $|\varepsilon(\Delta x)| < \varepsilon$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{A\Delta x + \varepsilon(\Delta x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(A + \frac{\varepsilon(\Delta x)}{\Delta x} \right) = A$$

\leftarrow נניח $f(x_0) = A$ ונניח $\varepsilon(\Delta x) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) - A\Delta x$ - כל Δx המקיים $|\Delta x| < \delta$ מתקיים $|\varepsilon(\Delta x)| < \varepsilon$

2 $f(x_0) = A \iff \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = A$ - כל $\varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ כזה ש- $\forall \Delta x$ המקיים $|\Delta x| < \delta$ מתקיים $|\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} - A| < \varepsilon$

קריטריון 1 נניח $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה ב- (x_0, y_0)

קריטריון 2: נניח $f(x, y)$ פונקציה רציפה ב- (x_0, y_0) ונניח $\varepsilon(\Delta x, \Delta y)$ כזה ש- $\forall \Delta x, \Delta y$ המקיים $\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} < \delta$ מתקיים $|\varepsilon(\Delta x, \Delta y)| < \varepsilon$

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \frac{\varepsilon(\Delta x, \Delta y)}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} = 0 \iff f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = f(x_0, y_0) + A\Delta x + B\Delta y + \varepsilon(\Delta x, \Delta y)$$

3 נניח $f(x, y)$ פונקציה רציפה ב- (x_0, y_0) ונניח $\varepsilon(\Delta x, \Delta y)$ כזה ש- $\forall \Delta x, \Delta y$ המקיים $\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} < \delta$ מתקיים $|\varepsilon(\Delta x, \Delta y)| < \varepsilon$

כלי (א) $f(x, y)$ פונקציה רציפה ב- (x_0, y_0)

\implies f_x, f_y קיימות ב- (x_0, y_0) וכל $\varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ כזה ש- $\forall \Delta x, \Delta y$ המקיים $\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} < \delta$ מתקיים $|\varepsilon(\Delta x, \Delta y)| < \varepsilon$

הוכחה:

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = f(x_0, y_0) \iff \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0) \iff (x, y) \rightarrow (x_0, y_0) \text{ רציפה } f$$

כלי (ב) $\Delta x = x - x_0, \Delta y = y - y_0$ - כל $\Delta x, \Delta y$ המקיים $\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} < \delta$ מתקיים $|\varepsilon(\Delta x, \Delta y)| < \varepsilon$

$$(x, y) \rightarrow (x_0, y_0) \text{ רציפה } f \iff \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = f(x_0, y_0) = f(x_0, y_0) + A\Delta x + B\Delta y + \frac{\varepsilon(\Delta x, \Delta y)}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} = f(x_0, y_0) + 0 + 0 + 0$$

\implies נניח f_x קיימת ב- (x_0, y_0) ונניח $\varepsilon(\Delta x, \Delta y)$ כזה ש- $\forall \Delta x, \Delta y$ המקיים $\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} < \delta$ מתקיים $|\varepsilon(\Delta x, \Delta y)| < \varepsilon$

$$f_x(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{A\Delta x + B \cdot 0 + \varepsilon(\Delta x, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(A + \frac{\varepsilon(\Delta x, 0)}{\Delta x} \right) = A$$

כלי (ג) f_x קיימת ב- (x_0, y_0) וכל $\varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ כזה ש- $\forall \Delta x, \Delta y$ המקיים $\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} < \delta$ מתקיים $|\varepsilon(\Delta x, \Delta y)| < \varepsilon$

הוכחה: את קונקוריאנטיות $f(x, y)$ נגד (x_0, y_0) נגזרת (צריך להוכיח)

משפט: תמיד קונקוריאנטיות f אם f היא פונקציה צורנית, $\frac{\partial f}{\partial y} = 1$ ו- $\frac{\partial f}{\partial x}$

אם $f(x, y) = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - A\Delta x - B\Delta y - \epsilon(\Delta x, \Delta y)$ $B = f_y(x_0, y_0)$, $A = f_x(x_0, y_0)$

נבדוק את $\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \frac{\epsilon(\Delta x, \Delta y)}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0$

3- ϵ הוא פונקציה של $(\Delta x, \Delta y)$ ונראה שהיא מתאפסת ב- $(0,0)$

אם f_x, f_y קיימות ורציפות ב- (x_0, y_0) אז f צורנית ב- (x_0, y_0)

3-1 משפט

1. משפט

$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b-a}$ על $\varphi \in (a, b)$ ו- $\psi \in (a, b) \rightarrow$ נמצא $f(\psi)$ על

על $(x_0, x_0 + \Delta x)$ ו- $\eta \in (x_0, x_0 + \Delta x) \rightarrow$ נמצא $f(\eta)$ על $(x_0, x_0 + \Delta x)$

$$f'(c) = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

$c = x_0 + t(x_0 + \Delta x - x_0) = x_0 + t\Delta x$ על $\varphi \in (0, 1)$ ו- $\eta \in (x_0, x_0 + \Delta x)$

$$f'(x_0 + t\Delta x) = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

על $(0, 1)$ נמצא $f_x(x_0 + t\Delta x, y_0) = \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$ ו- $\eta \in (x_0, x_0 + \Delta x)$

על $(0, 1)$ נמצא $f_y(x_0, y_0 + t\Delta y) = \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}$

2. $f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = f(x_0, y_0) + \epsilon(\Delta x, \Delta y) \Leftrightarrow (x_0, y_0)$ נמצא $f(x_0, y_0)$

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \frac{\epsilon(\Delta x, \Delta y)}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0$$

3- משפט $f(x, y)$ היא פונקציה צורנית ב- (x_0, y_0) אם ורק אם f_x, f_y קיימות ב- (x_0, y_0)

נניח f_x, f_y קיימות ב- (x_0, y_0) אז f צורנית ב- (x_0, y_0)

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0 + \Delta y) + f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) =$$

$$= f_x(x_0 + t\Delta x, y_0 + \Delta y)\Delta x + f_y(x_0, y_0 + t\Delta y)\Delta y - \epsilon(\Delta x, \Delta y)$$

נניח f_x, f_y קיימות ב- (x_0, y_0) אז f צורנית ב- (x_0, y_0) ו- $\epsilon(\Delta x, \Delta y) = \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y$

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \epsilon_i = 0 \text{ על } [f_x(x_0, y_0) + \epsilon_1(t\Delta x, \Delta y)]\Delta x + [f_y(x_0, y_0) + \epsilon_2(0, t\Delta y)]\Delta y$$

על $(0, 1)$ נמצא $f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon(\Delta x, \Delta y)$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0 \text{ ו- } \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0 \text{ על } \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \frac{\epsilon(\Delta x, \Delta y)}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0$$

(0,0) נקודת חנייה f_x, f_y של f . $f(x,y) = \begin{cases} (x^2+y^2)^{\frac{1}{2}} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$

אם f היא פונקציה של x בלבד

$$f_x = 2x \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} + \frac{(x^2+y^2)(-x) \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}}{(x^2+y^2)^{3/2}} \quad - (x,y) \neq (0,0) \text{ נכונ}$$

אם x ו- y שניהם שווים ל-0, ננסה לראות

$$f_x(0,0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0,0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{\Delta x^2}} - 0}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x \cdot \frac{1}{|\Delta x|}}{1} = 0$$

(0,0) נקודת חנייה של f_x - כלומר $f_y(0,0) = 0$ גם כן נכון

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_x(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left[2x \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} - \frac{x \cos \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}}{\sqrt{x^2+y^2}} \right] \quad - \text{נכונ}$$

אם $(x,y) \rightarrow (0,0)$ אז $\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} \rightarrow \infty$, ו- $\cos \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$ מתנהב כמו פונקציית סינוס

אם $x > 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos \frac{1}{\sqrt{x^2}}}{\sqrt{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{|x|} \cos \frac{1}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0} \pm 1 \cdot \cos \frac{1}{|x|}$ - זה לא מתנהב כמו פונקציית סינוס

אם $x < 0$, אז $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos \frac{1}{\sqrt{x^2}}}{\sqrt{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{|x|} \cos \frac{1}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0} -1 \cdot \cos \frac{1}{|x|}$

(0,0) - נקודת חנייה של f - כלומר $f_x(0,0) = f_y(0,0) = 0$

$$B = f_y(0,0) = 0, \quad A = f_x(0,0) = 0 \quad - \text{נכון}$$

$$0 = \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \frac{E(\Delta x, \Delta y)}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} = \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(0+\Delta x, 0+\Delta y) - f(0,0) - A\Delta x - B\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} = \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(\Delta x, \Delta y)}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} \quad - \text{נכון}$$

אם $\Delta x = \Delta y$, אז $\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(\Delta x, \Delta y)}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(\Delta x^2 + \Delta x^2)^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta x^2}} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2} \Delta x}{\sqrt{2} \Delta x} = 1$ - לא

אם $\Delta x = 0$, אז $\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(\Delta x, \Delta y)}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{(\Delta y^2)^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{0 + \Delta y^2}} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{|\Delta y|} = \pm 1$ - לא

הצורה הכללית של המישור

1. "פונקציה" -

$$f_x(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} \leftarrow \text{כאשר}$$


כאשר $f_x(x_0, y_0)$ הוא הנגזרת של f ביחס ל- x בנקודה (x_0, y_0) ו- Δx הוא ההפרש בין x ל- x_0 .

דוגמה: $f(x, y) = x^2 + y^2$ אז $f_x(1, 2) = 2x = 2 \cdot 1 = 2$ ו- $f_y(1, 2) = 2y = 2 \cdot 2 = 4$

אם (x_0, y_0) נמצא על המישור, אז $f(x_0, y_0) = z_0$. המישור המשיק לזוהי $z = z_0 + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$.

המשוואה הכללית של המישור המשיק היא:

$$z - z_0 = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$



2. הצורה הכללית

המשוואה הכללית של המישור המשיק היא:

$$\vec{n} \cdot (\vec{r} - \vec{r}_0) = 0$$

כאשר $\vec{n} = (f_x, f_y, -1)$ הוא וקטור הנורמל לזוהי המישור המשיק לזוהי $z = f(x, y)$ בנקודה (x_0, y_0, z_0) .

המשוואה הכללית של המישור המשיק היא:

$$\vec{n} \cdot (\vec{r} - \vec{r}_0) = 0$$

כאשר $\vec{n} = (f_x, f_y, -1)$ הוא וקטור הנורמל לזוהי המישור המשיק לזוהי $z = f(x, y)$ בנקודה (x_0, y_0, z_0) .

המשוואה הכללית של המישור המשיק היא:

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = f(x_0, y_0) + A\Delta x + B\Delta y + \epsilon$$

כאשר $A = f_x(x_0, y_0)$ ו- $B = f_y(x_0, y_0)$ ו- ϵ הוא שגיאת התאורה.

המשוואה הכללית של המישור המשיק היא:

המשוואה הכללית של המישור המשיק היא:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) - (z - z_0) = 0$$

כאשר $\vec{n} = (A, B, -1)$ הוא וקטור הנורמל לזוהי המישור המשיק לזוהי $z = f(x, y)$ בנקודה (x_0, y_0, z_0) .

המשוואה הכללית של המישור המשיק היא:

המשוואה הכללית של המישור המשיק היא:

$$\vec{n} = (A, B, -1) = (f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0), -1)$$

המשוואה הכללית של המישור המשיק היא:

המשוואה הכללית של המישור המשיק היא:

תשובה:

נתון $f(x,y) = x^2y^3$ נמצא את f בנקודה $(x,y) = (1,2)$

המשיק במערכת הקואורדינטות $z = f(x,y)$ בנקודה $(1,2,8)$


המשוואות: $f_x = 2xy^3$, $f_y = 3x^2y^2$ (הנגזרות חלקיות של f בנקודה)

$$f_x = 12 = A, \quad f_y = 12 = B \quad \text{בנקודה } (1,2) = (x_0, y_0)$$

המשיק במערכת

תשובה: המישור המשיק ל $z = f(x,y)$ בנקודה (x_0, y_0, z_0)

המשוואה:



אנחנו נחפש את המישור המשיק ל $f(x,y)$ בנקודה (x_0, y_0) ב \mathbb{R}^2

המשוואה של המישור המשיק בנקודה (x_0, y_0) היא:

$$(x, y) + t(a, b) = (x_0 + at, y_0 + bt) = \underline{(x_0, y_0) + t\vec{u}}$$

ב \mathbb{R}^2 המישור המשיק

הצגת כיוון

הצגת כיוון $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ מוגדרת על ידי \vec{u} וקטור יחידה, $\|\vec{u}\|=1$

שק f (הקוונטנטיב) בכיוון \vec{u} בנקודה (x_0, y_0) מוגדרת כ:

$$f_{\vec{u}}(x_0, y_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0+at, y_0+bt) - f(x_0, y_0)}{t}$$

כאשר $\vec{u} = (a, b)$

(שם $\vec{u} = \vec{e}_1$ בכיוון חזית x ושם $f_u = f_x$ וכן $\vec{u} = \vec{e}_2$ בכיוון חזית y שם $f_u = f_y$)

הצגת כיוון \vec{u} היא צירי התייחסות של f אל כיוון \vec{u} בנקודה (x_0, y_0)

מכיוון \vec{u} מייצגת כיוון \vec{u} ו-1 מייצגת את הנורמה של \vec{u} (הנורמה של \vec{u} היא $\|\vec{u}\|$)

הצגת כיוון $f_{\vec{u}}$ מוגדרת על ידי $f_{\vec{u}}(x, y) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x+at, y+bt) - f(x, y)}{t}$

$$f_{\vec{u}}(x, y) = a \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + b \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \vec{u} \cdot \nabla f(x, y)$$

כאשר $\vec{u} = (a, b)$ וקטור יחידה

$$f_{\vec{u}}(x, y) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x+at, y+bt) - f(x, y)}{t}$$

הצגת כיוון $f_{\vec{u}}$ מוגדרת על ידי

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{A(at) + B(bt) + \epsilon(at, bt)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} (Aa + Bb + \frac{\epsilon(at, bt)}{t})$$

$$\|\vec{u}\|^2 = a^2 + b^2 = 1 \text{ כאשר } \vec{u} = (a, b) \text{ וקטור יחידה}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\epsilon(at, bt)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\epsilon(at, bt)}{|t|} \cdot \frac{|t|}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\epsilon(at, bt)}{\sqrt{(at)^2 + (bt)^2}} \cdot \frac{|t|}{t}$$

כאשר $|t| = \sqrt{(at)^2 + (bt)^2}$

$$Aa + Bb = a f_x(x, y) + b f_y(x, y) \text{ וזוהי הצגת כיוון } f_{\vec{u}}$$

$$f(x, y) = \begin{cases} y & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

הצגת כיוון $f_{\vec{u}}$ בנקודה $(0,0)$ היא $f_{\vec{u}}(0,0) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$

$$f_x(0,0) = f_y(0,0) = 0$$

הצגת כיוון $f_{\vec{u}}$ בנקודה $(0,0)$ היא $f_{\vec{u}}(0,0) = a f_x(0,0) + b f_y(0,0) = 0$

כאשר $\vec{u} = (a, b)$ וקטור יחידה

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0+at, 0+bt) - f(0,0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{bt - 0}{t} = b$$

$$a f_x(0,0) + b f_y(0,0) = 0$$

הצגת כיוון $f_{\vec{u}}$ בנקודה $(0,0)$ היא $f_{\vec{u}}(0,0) = a f_x(0,0) + b f_y(0,0) = 0$

השערה: נניח ש- $f(x, y)$ מוגדרת בקטע (x_0, y_0) (הכלת נגזרות חלקיות ב- (x_0, y_0))
 אז התוקף $(f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0))$ קיים והשדה ∇f של f מוגדר ב- (x_0, y_0) .

משפט 1 (למשפט 4)

אם f מוגדרת בקטע (x_0, y_0) ו- $\vec{u} = (a, b)$ וקטור יחידה אז $\frac{\partial f}{\partial u}(x_0, y_0) = \vec{\nabla} f(x_0, y_0) \cdot \vec{u}$ וקטור יחידה של \vec{u} .

הוכחה: דבר ההשדה $\vec{\nabla} f = (f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0))$ ו- $\vec{u} = (a, b)$ אז $\frac{\partial f}{\partial u}(x_0, y_0) = \vec{\nabla} f \cdot \vec{u}$ זהו הביקור $\frac{\partial f}{\partial u}(x_0, y_0)$.

הערה: מכאן מתקבלת הנוסחה $\frac{\partial f}{\partial u} = \|\vec{\nabla} f\| \cos \theta = \|\vec{\nabla} f\| \|\vec{u}\| \cos \theta = \|\vec{\nabla} f\| \cos \theta$ כאשר θ הוא הזווית בין $\vec{\nabla} f$ ל- \vec{u} .

כל מקסימום/מינימום של f בקטע (x_0, y_0) מתרחש ב- $\vec{\nabla} f = 0$ או ב- $\cos \theta = 0$.

כל מקסימום/מינימום של f בקטע (x_0, y_0) מתרחש ב- $\vec{\nabla} f = 0$ או ב- $\cos \theta = 0$ (כלומר ב- $\vec{u} \perp \vec{\nabla} f$)
 ו- $(\vec{\nabla} f)$ כונה "כיוון עלייה" של f .

משפט 2 (למשפט 4)

$\vec{\nabla} f(p)$ הוא וקטור שביניהם לכיוון של עלייה גבוהה של f ב- (p) ,
 ואורכו $\|\vec{\nabla} f(p)\|$ שווה לאורך קרב מקסימלי.

הוכחה: נניח \vec{u} הוא וקטור יחידה אז $\frac{\partial f}{\partial u}(p) = \vec{\nabla} f(p) \cdot \vec{u}$ ו- $\frac{\partial f}{\partial u}(p) = \|\vec{\nabla} f(p)\| \cos \theta$.

כאשר $\theta = 0$ הוא קטור כיוון $\vec{\nabla} f$, זהו המקרה כאשר $\cos \theta = 1$ ו- $\frac{\partial f}{\partial u}(p) = \|\vec{\nabla} f(p)\|$ שהוא
 מקסימום.

דוגמה: נניח $f(x, y) = 100 - x^2 - y^2$ (גובה) ו- $(3, 2)$ הוא נקודה על הירקון. אז $\vec{\nabla} f(3, 2) = (-6, -4)$.

הכיוון של עלייה גבוהה של f ב- $(3, 2)$ הוא $(-6, -4)$ או $(6, 4)$ (כיוון ההר).

הערה: $f_x(x, y) = -2x$, $f_y(x, y) = -2y$ אז $\vec{\nabla} f(3, 2) = (-6, -4)$.

$\vec{\nabla} f$ כונה "כיוון עלייה" של f ב- (x, y) ו- $\|\vec{\nabla} f\|$ הוא אורך הקרב המקסימלי.

אם $\vec{u} = (a, b, c)$ הוא וקטור יחידה ב- \mathbb{R}^3 אז $\frac{\partial f}{\partial u}(x, y, z) = \vec{\nabla} f(x, y, z) \cdot \vec{u}$.

כאשר $\vec{u} = (1, 0, 0)$ אז $\frac{\partial f}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial x}$ ו- $\vec{u} = (0, 1, 0)$ אז $\frac{\partial f}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial y}$.

הכיוון של עלייה גבוהה של f ב- (x, y, z) הוא $(-2x, -2y, -2z)$ או $(2x, 2y, 2z)$.

הכיוון של עלייה גבוהה של f ב- $(3, 2, 1)$ הוא $(-6, -4, -2)$ או $(6, 4, 2)$.

$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ גזירה

הצגה $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ ופונקציה $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ -1. $E \subset \mathbb{R}^n$ תת-קבוצה. $1 \leq k \leq n$ אז

$$\frac{\partial f}{\partial x_k}(x) = \lim_{\Delta x_k \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_k + \Delta x_k, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_k, \dots, x_n)}{\Delta x_k}$$

הצגה f גזירה בנקודה x אם קיימת פונקציה A_1, A_2, \dots, A_n ופונקציה $\epsilon(\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n)$ כך

$$f(x_1 + \Delta x_1, \dots, x_n + \Delta x_n) = f(x_1, \dots, x_n) + \sum_{k=1}^n A_k \Delta x_k + \epsilon(\Delta x_1, \dots, \Delta x_n)$$

$$\lim_{(\Delta x_1, \dots, \Delta x_n) \rightarrow (0, \dots, 0)} \frac{\epsilon}{\sqrt{\Delta x_1^2 + \dots + \Delta x_n^2}} = 0$$

נסות אחרת - יפנה: $x = (x_1, \dots, x_n)$ וקטור $h = (\Delta x_1, \dots, \Delta x_n)$

$L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה ליניארית ו- $\epsilon(h)$ פונקציה כך

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\epsilon(h)}{\|h\|} = 0$$

$$f(x+h) = f(x) + L(h) + \epsilon(h)$$

הצגה קבוצה \mathbb{R}^n וקטור $a = (a_1, \dots, a_n)$ אז

$$\frac{\partial f}{\partial x_k}(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + a_1 t, \dots, x_k + a_k t, \dots, x_n + a_n t) - f(x_1, \dots, x_k, \dots, x_n)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x+ta) - f(x)}{t}$$

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right) = (f_{x_1}, \dots, f_{x_n})$$

משפט $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ גזירה בנקודה $x \in \mathbb{R}^n$ אם ורק אם קיימת פונקציה ליניארית $L(h)$ כך

$$L(h) = (A_1, \dots, A_n) \begin{pmatrix} \Delta x_1 \\ \vdots \\ \Delta x_n \end{pmatrix} = \sum_{k=1}^n A_k \Delta x_k, \quad h = (\Delta x_1, \dots, \Delta x_n)$$

כך f גזירה בנקודה x

$$A_k \text{ ונקרא } \frac{\partial f}{\partial x_k}(x) - \text{נגזרת חלקית}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x) = \nabla f(x) \cdot \vec{u} - \text{נגזרת כיוונית}$$

הצגה

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(x+h) = \lim_{h \rightarrow 0} [f(x) + L(h) + \epsilon(h)] = f(x)$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \epsilon(h) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\epsilon(h)}{\|h\|} \cdot \|h\| = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_k}(x) = \lim_{\Delta x_k \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_k + \Delta x_k, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_k, \dots, x_n)}{\Delta x_k} = \lim_{\Delta x_k \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x_k e_k) - f(x)}{\Delta x_k}$$

$$\lim_{\Delta x_k \rightarrow 0} \frac{L(\Delta x_k e_k) + \epsilon(\Delta x_k e_k)}{\Delta x_k} = \lim_{\Delta x_k \rightarrow 0} \left[\frac{L(\Delta x_k e_k)}{\Delta x_k} + \frac{\epsilon(\Delta x_k e_k)}{\Delta x_k} \right]$$

$$L(e_k) = A_k$$

$$a = (a_1, \dots, a_n) \text{ אז } \frac{\partial f}{\partial x}(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x+ta) - f(x)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{L(ta) + \epsilon(ta)}{t} = L(a)$$

$$L(a) = (A_1, \dots, A_n) \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = (f_{x_1}, \dots, f_{x_n}) \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \nabla f(x) \cdot \vec{a}$$

\mathbb{R}^2 הוא
 ∇f
 וקטור
 f גזירה
 ונגזרת
 חלקית
 קיימת

דו"ח-תוכנה

$\varepsilon_1(h) \cdot dg|_x \left(\frac{h}{\|h\|} \right) - \delta$ שיהיה δ קטן מספיק $\frac{\varepsilon_1(h) \cdot dg|_x(h)}{\|h\|}$ (כאן) $\frac{\varepsilon(h)}{\|h\|}$ - \rightarrow המסקנה

$dg|_x \left(\frac{h}{\|h\|} \right) = dg|_x(v) = \vec{\nabla} g(x) \cdot \vec{v} \leq \|\vec{\nabla} g(x)\| \cdot \|v\| = \|\vec{\nabla} g(x)\| \cdot 1$ וקטור תמיד נש"כ $\frac{h}{\|h\|}$ - המסקנה

$g(x) \cdot \frac{\varepsilon_1(h)}{\|h\|}$ (כאן) המסקנה, $\frac{\varepsilon_1(h) \cdot \varepsilon_2(h)}{\|h\|}$ (כאן) $\frac{\varepsilon(h)}{\|h\|}$ - \rightarrow המסקנה

מסקנה: $\alpha \cdot f(x) \cdot \varepsilon_2(h)$

(ε קטן) = מקור

במרחב n -ממדי f ו- g $\nabla(fg) = f \nabla g + g \nabla f$

אולי קי'ם פונקציה רציפה $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ (אולי רציפה)

$1 \leq j \leq k$ אולי $f_j: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ אולי $f(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x))$ - אולי $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ אולי k אולי \mathbb{R}

$x \in \mathbb{R}^n$ אולי $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ אולי רציפה

$f(x+h) = f(x) + L(h) + \varepsilon(h)$ - אולי $h \in \mathbb{R}^n$ אולי $x \rightarrow$ f

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varepsilon(h)}{\|h\|} = 0$ - אולי $L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ אולי

\mathbb{R}^k אולי f אולי רציפה אולי f אולי רציפה אולי רציפה אולי רציפה

$(\mathbb{R}^k, \|\cdot\|)$ $x \in \mathbb{R}^n$ אולי $f = (f_1, \dots, f_k)$ אולי רציפה \leftarrow

$x \rightarrow$ אולי $1 \leq j \leq k$ - אולי $f_j: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ אולי $x \rightarrow$ אולי f_j אולי

$df|_x = (df_1|_x, \dots, df_k|_x)$ - אולי

$df|_x(h) = (df_1|_x(h), \dots, df_k|_x(h))$ - אולי $h \in \mathbb{R}^n$ אולי

אולי

$p_j(x_1, \dots, x_n) = x_j$ אולי $p_j: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ אולי $x \rightarrow$ אולי $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ אולי \leftarrow

$\exists \varepsilon, L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ אולי $f(x+h) = f(x) + L(h) + \varepsilon(h)$ - אולי $x \rightarrow$ אולי f אולי

$f_j(x+h) - f_j(x) = p_j(f(x+h) - f(x)) = p_j(L(h) + \varepsilon(h)) = p_j(L(h)) + p_j(\varepsilon(h))$ אולי $1 \leq j \leq k$ אולי

אולי $p_j(L(h))$

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{p_j(\varepsilon(h))}{\|h\|} = 0$ - אולי $x \rightarrow$ אולי f_j אולי

אולי $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{p_j(\varepsilon(h))}{\|h\|} = \lim_{h \rightarrow 0} p_j\left(\frac{\varepsilon(h)}{\|h\|}\right) = p_j(0) = 0$ - אולי

$f_j(x+h) - f_j(x) = df_j|_x(h) + \varepsilon_j(h)$ אולי $1 \leq j \leq k$ אולי $x \rightarrow$ אולי f_j אולי \Rightarrow

$f(x+h) - f(x) = (f_1(x+h) - f_1(x), \dots, f_k(x+h) - f_k(x)) = \underbrace{(df_1|_x(h), \dots, df_k|_x(h))}_{df|_x(h)} + \underbrace{(\varepsilon_1(h), \dots, \varepsilon_k(h))}_{\varepsilon(h)}$

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varepsilon(h)}{\|h\|} = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{\varepsilon_1(h)}{\|h\|} + \dots + \frac{\varepsilon_k(h)}{\|h\|} \right) = 0$ - אולי $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varepsilon_j(h)}{\|h\|} = 0$ אולי

f_j אולי רציפה אולי רציפה אולי רציפה

$df|_x = (df_1|_x, \dots, df_k|_x)$ - אולי

הצורה הכללית של $h = (h_1, \dots, h_n)$ היא ∇f (הצורה הכללית)

$$df|_x(w) = \begin{pmatrix} df_1|_x(w) \\ \vdots \\ df_k|_x(w) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \nabla f_1 \cdot h \\ \vdots \\ \nabla f_k \cdot h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} h_1 + \frac{\partial f_1}{\partial x_2} h_2 + \dots + \frac{\partial f_1}{\partial x_n} h_n \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} h_1 + \dots + \frac{\partial f_2}{\partial x_n} h_n \\ \vdots \\ \frac{\partial f_k}{\partial x_1} h_1 + \dots + \frac{\partial f_k}{\partial x_n} h_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_k}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_k}{\partial x_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_n \end{pmatrix}$$

הצורה הכללית של $df|_x$ היא $(1 \leq i \leq k, 1 \leq j \leq n)$ $\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right)$ (הצורה הכללית)

נקראת הצורה הכללית f של $X \rightarrow f$ היא ∇f (הצורה הכללית)

$$\left(\frac{\partial (f_1, \dots, f_k)}{\partial (x_1, \dots, x_n)} \right) - \text{כאן } k$$

כאשר $k = n$ (הצורה הכללית), הצורה הכללית של f היא

$$\frac{\partial (f_1, \dots, f_n)}{\partial (x_1, \dots, x_n)} \text{ מיוחס "הצורה הכללית" } f$$

נתון $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ מוגדר על ידי $f(x, y, z) = \sin(xy^2z^3)$ ונתון $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ מוגדר על ידי $g(t) = (x(t), y(t), z(t))$.
 נרצה לחשב את הנגזרת של $f \circ g$ בנקודה t_0 .
 נגדיר $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ על ידי $h(t) = \sin t$. אז $f = h \circ g$, כלומר $f(x, y, z) = h(g(x, y, z))$.
 לפי הכלל שרואים: "הנגזרת של f בנקודה (x, y, z) היא $\cos(xy^2z^3) \cdot (y^2z^3, 2xy^2z^3, 3xy^2z^2)$ ".

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \cos(xy^2z^3) \cdot (y^2z^3), \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \cos(xy^2z^3) \cdot (2xy^2z^3)$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \cos(xy^2z^3) \cdot (3xy^2z^2)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = h'(g(x, y, z)) \frac{\partial g}{\partial y}, \quad \frac{\partial f}{\partial x} = h'(g(x, y, z)) \frac{\partial g}{\partial x} \quad \text{כלל השרשרת}$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = h'(g(x, y, z)) \frac{\partial g}{\partial z}$$

אם נגדיר $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ על ידי $\gamma(t) = (x(t), y(t), z(t))$ אז $f \circ \gamma = h \circ \gamma$.

נרצה לחשב את הנגזרת של $f \circ \gamma$ בנקודה t_0 . נרשום $f \circ \gamma = h \circ \gamma$.

נתון $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ ונתון $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ מוגדר על ידי $g(t) = (x(t), y(t), z(t))$.
 נרצה לחשב את הנגזרת של $f \circ g$ בנקודה t_0 .
 נגדיר $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ על ידי $h(t) = \sin t$. אז $f = h \circ g$.

נרצה לחשב את הנגזרת של $f \circ g$ בנקודה t_0 . נרשום $f \circ g = h \circ g$.

נתון $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ ונתון $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ מוגדר על ידי $g(t) = (x(t), y(t), z(t))$.
 נרצה לחשב את הנגזרת של $f \circ g$ בנקודה t_0 .
 נגדיר $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ על ידי $h(t) = \sin t$. אז $f = h \circ g$.

$$g'(t_0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{g(t_0 + \Delta t) - g(t_0)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta g}{\Delta t}$$

נתון $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ ונתון $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ מוגדר על ידי $g(t) = (x(t), y(t), z(t))$.
 נרצה לחשב את הנגזרת של $f \circ g$ בנקודה t_0 .
 נגדיר $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ על ידי $h(t) = \sin t$. אז $f = h \circ g$.

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = A \Delta x + B \Delta y + \varepsilon(\Delta x, \Delta y)$$

$$\Delta f = A \Delta x + B \Delta y + \varepsilon(\Delta x, \Delta y)$$

$$g'(t_0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left[A \frac{\Delta x}{\Delta t} + B \frac{\Delta y}{\Delta t} + \frac{\varepsilon(\Delta x, \Delta y)}{\Delta t} \right] =$$

$$= A x'(t_0) + B y'(t_0) + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\varepsilon(\Delta x, \Delta y)}{\Delta t}$$

כלל

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\varepsilon(\Delta x, \Delta y)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\varepsilon(\Delta x, \Delta y)}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} \cdot \frac{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \underbrace{\frac{\varepsilon(\Delta x, \Delta y)}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}}}_{\rightarrow 0} \cdot \underbrace{\left(\frac{\Delta x}{\Delta t} \right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{\Delta t} \right)^2}_{\rightarrow \pm \sqrt{x'^2 + y'^2}} = 0$$

הנגזרת של f היא $f'(t_0)$

$$Ax'(t_0) + By'(t_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) x'(t_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) y'(t_0)$$

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt}$$

אם $f(x, y) \rightarrow$ ונתון $y=y(t, y_0), x=x(t, y_0)$ אז, נגזרת

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial y}$$

$g = f(\vec{v}(t, y)), f = f(x, y), \vec{v} = (x(t, y), y(t, y))$ ונתון

$$\frac{\partial g}{\partial t} = \vec{v} f(\vec{v}(t, y)) \cdot \frac{\partial \vec{v}}{\partial t}(t, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right) \left(\frac{\partial x}{\partial t}, \frac{\partial y}{\partial t} \right)$$

הקבוצה של הנגזרות של f היא $f'(x, y)$

$P \rightarrow$ אם $P \in \mathbb{R}^n$ ונתון $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ נגזרת f ב- P היא $f'(P) \in \mathbb{R}^m$

אם $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ונתון $g: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$ ונתון $f(P) = P \in \mathbb{R}^m$

$$d(g \circ f) = dg|_P \circ df|_P$$

(הנגזרת של $g \circ f$ היא הנגזרת של g ב- $f(P)$ כפונקציה של f ב- P)

הנגזרת של f ב- P היא $df|_P$

$$(g \circ f)(P+h) - (g \circ f)(P) = g[f(P+h)] - g[f(P)] = g[f(P)+\Delta f] - g[f(P)]$$

$$= dg|_{f(P)} [f(P+h) - f(P)] + \varepsilon_g(f(P+h) - f(P)) = dg|_{f(P)} [\Delta f + \varepsilon_f(h)] + \varepsilon_g(f(P+h) - f(P)) =$$

$$= [dg|_{f(P)} \circ df|_P](h) + \underbrace{dg|_{f(P)}(\varepsilon_f(h)) + \varepsilon_g(\Delta f)}_{\varepsilon}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{dg|_{f(P)}(\varepsilon_f(h))}{\|h\|} = \lim_{h \rightarrow 0} dg|_{f(P)} \left(\frac{\varepsilon_f(h)}{\|h\|} \right) = dg|_{f(P)}(0) = 0$$


$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varepsilon_g(\Delta f)}{\|h\|} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varepsilon_g(\Delta f) \cdot \|\Delta f\|}{\|\Delta f\| \cdot \|h\|} = \lim_{\Delta f \rightarrow 0} \frac{\varepsilon_g(\Delta f)}{\|\Delta f\|} = 0$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|\Delta f\|}{\|h\|} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|f(P+h) - f(P)\|}{\|h\|} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|df|_P(h) + \varepsilon_f(h)\|}{\|h\|} = \frac{\|df|_P(h)\|}{\|h\|} = \|df|_P\|$$

הנגזרת של f ב- P היא $df|_P$ ונתון $f(P) = P \in \mathbb{R}^m$

משפט 3.1

3.1.1 $f(x,y)$ פונקציה של שני משתנים. $\vec{\nabla} f$ וקטור הגרדיאנט של f הוא וקטור המצבי על כיוון עליית הפונקציה. $\vec{\nabla} f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right)$.
 אם C היא קו מתפתח של f , כל וקטור המצבי על כיוון עליית הפונקציה הוא וקטור המצבי על כיוון הנורמל לקו C .
 כלומר, $\vec{\nabla} f$ הוא וקטור הנורמל לקו C .
 כלומר, $\vec{\nabla} f$ הוא וקטור הנורמל לקו C .



דוגמה: $f(x,y) = x^2 + y^2$

4.1.1 $z = 3y + x^2z^2 + e^{xy} + \sin(\pi z) = 7$ - משוואת המישור המשיק בנקודה $(0, 2, 1)$ ב- \mathbb{R}^3 .

המשוואה היא $z = 3y + x^2z^2 + e^{xy} + \sin(\pi z) = 7$.

הפונקציה היא $f(x,y,z) = 3y + x^2z^2 + e^{xy} + \sin(\pi z)$.

הגרדיאנט הוא $\vec{\nabla} f = (2xz^2 + ye^{xy}, 3 + xe^{xy}, 2x^2 + \pi \cos(\pi z))$.

הגרדיאנט בנקודה $(0, 2, 1)$ הוא $\vec{\nabla} f(0, 2, 1) = (2, 3, -\pi)$.

המשוואה של המישור המשיק היא $2(x-0) + 3(y-2) - \pi(z-1) = 0$.

כלומר $2(x-0) + 3(y-2) - \pi(z-1) = 0$.

נגזרות חלקיות


אם $f(x,y)$ היא פונקציה של שני משתנים, אז $f_x = \frac{\partial f}{\partial x}$, $f_y = \frac{\partial f}{\partial y}$
 אם f היא פונקציה של n משתנים, אז $f_{x_i} = \frac{\partial f}{\partial x_i}$, $f_{x_i x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$, $f_{x_j x_i} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$
 כלומר, נגזרות חלקיות מסדר 2 מתחלפות.

כלומר, $f_{xy} = f_{yx}$ וכו' - כלומר, $f_{x_1 x_2 \dots x_n} = f_{x_2 x_1 \dots x_n}$ וכו'.

הנגזרת החלקית של f ביחס ל- x היא $f_x(x,y)$ וכו'.

כלומר, f_x, f_y הן פונקציות של (x,y) וכו'.

אם $f_{xy} = f_{yx}$ וכו' אז $f_{xy}(x,y) = f_{yx}(x,y)$ וכו'.



$$\omega(h,k) = \frac{f(x_0+h, y_0+k) + f(x_0+h, y_0) - f(x_0, y_0+k) - f(x_0, y_0)}{hk}$$

אם $k=1$ אז $\omega(x) = \frac{f(x_0+h, y_0+k) - f(x_0, y_0+k)}{k}$ וכו'.

אם $h=1$ אז $\omega = \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$ וכו'.

$$f'_x(x_0+t_1, h) = \frac{f_x(x_0+t_1, h, y_0+k) - f_x(x_0+t_1, h, y_0)}{k}$$

אם $0 \leq t_1, t_2 \leq 1$ אז $f_{xy}(x_0+t_1, h, y_0+t_2, k) = f_{yx}(x_0+t_1, h, y_0+t_2, k)$ וכו'.

אם $0 \leq t_3, t_4 \leq 1$ אז $f_{yx}(x_0+t_3, h, y_0+t_4, k) = f_{xy}(x_0+t_3, h, y_0+t_4, k)$ וכו'.

כלומר, $f_{xy}(x_0, y_0) = \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} f_{xy}(x_0+t_1, h, y_0+t_2, k) = \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} f_{yx}(x_0+t_3, h, y_0+t_4, k) = f_{yx}(x_0, y_0)$

כלומר, $f_{xy} = f_{yx}$ וכו'.

$$f_{xy}(x_0, y_0) = \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} f_{xy}(x_0+t_1, h, y_0+t_2, k) = \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} f_{yx}(x_0+t_3, h, y_0+t_4, k) = f_{yx}(x_0, y_0)$$

כלומר, $D^2 f = C^2(D)$ וכו'.

כלומר, $C^2(D) = C^2(D)$ וכו'.

$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה

x_0 נקודה קבועה (התנאי) נניח f היא פונקציה רציפה $f(x)$ על 2 נקודות נפרדות לא

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}$$

x_0 ו- x נמצאים באותו קטע

$$\theta \in (0,1) \text{ נמצא } f(x+h) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} h^k + \frac{f^{(n+1)}(x_0+\theta h)}{(n+1)!} h^{n+1}$$

$(x_0, y_0) \in S$ נניח C^{n+1} הפונקציה $f(x,y)$ על S

נניח k, h מסוימים $g(t) = f(x_0+th, y_0+tk)$ נניח $g(0) = f(x_0, y_0)$

$$g'(t) = f_x(x_0+th, y_0+tk) \cdot h + f_y(x_0+th, y_0+tk) \cdot k$$

$$g''(t) = f_{xx}(x_0+th, y_0+tk) \cdot h^2 + f_{xy}(x_0+th, y_0+tk) \cdot hk + f_{yx}(x_0+th, y_0+tk) \cdot hk + f_{yy}(x_0+th, y_0+tk) \cdot k^2$$

$$g''(0) = [f_{xx}h^2 + 2f_{xy}hk + f_{yy}k^2](x_0, y_0)$$

$$g'''(t) = (f_{xxx}h^3 + f_{xxy}h^2k + f_{xyx}h^2k + f_{xyy}hk^2 + f_{yxx}hk^2 + f_{yyy}k^3)(x_0+th, y_0+tk)$$

$$g'''(0) = (f_{xxx}h^3 + 3f_{xxy}h^2k + 3f_{xyx}hk^2 + f_{yyy}k^3)(x_0, y_0)$$

$$g^{(m)}(x_0+th, y_0+tk) = \sum_{l=0}^m \binom{m}{l} \frac{\partial^m f}{\partial x^l \partial y^{m-l}}(x_0+th, y_0+tk) \cdot h^l k^{m-l}$$

$$g(t) = \sum_{m=0}^n \frac{g^{(m)}(0)}{m!} t^m + \frac{g^{(n+1)}(\theta)}{(n+1)!} t^{n+1}$$

ב- $t=0$ נניח g היא פונקציה רציפה

(t הוא מספר ממשי)

$$\text{לכן } 0 < \theta < 1 \text{ נמצא } g(1) = \sum_{m=0}^n \frac{g^{(m)}(0)}{m!} + \frac{g^{(n+1)}(\theta)}{(n+1)!}$$

$$f(x_0+h, y_0+k) = g(1) = \sum_{m=0}^n \frac{1}{m!} \sum_{l=0}^m \binom{m}{l} \frac{\partial^m f}{\partial x^l \partial y^{m-l}}(x_0, y_0) \cdot h^l k^{m-l} + \frac{g^{(n+1)}(\theta)}{(n+1)!}$$

$0 < \theta < 1$ נמצא

$$(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y})^m f = \sum_{l=0}^m \binom{m}{l} \frac{\partial^m f}{\partial x^l \partial y^{m-l}} h^l k^{m-l}$$

נניח f היא פונקציה רציפה

$$\left[(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y})^2 f = (h^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} + 2hk \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + k^2 \frac{\partial^2}{\partial y^2}) f \right]$$

נניח f היא פונקציה רציפה

$$0 < \theta < 1 \text{ נמצא } f(x_0+h, y_0+k) = \sum_{m=0}^n \frac{1}{m!} (h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y})^m f(x_0, y_0) + \frac{1}{(n+1)!} (h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y})^{n+1} f(x_0+\theta h, y_0+\theta k)$$

נדבר את המושג "מרחב טנגנטי" ונראה כי הוא, שווה ל
 (מתחילתו) הוא בסיס של המישור $f(x,y)$ הנגזרת בנקודה (x_0, y_0) ,
 ונראה כי $f(x_0, y_0) = f - f'$

במרחב (x_0, y_0) נראה כי $z = f(x_0, y_0)$

$$f(x_0+h, y_0+k) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)h + f_y(x_0, y_0)k + \frac{1}{2}(f_{xx}h^2 + 2f_{xy}hk + f_{yy}k^2)(x_0+oh, y_0+ok)$$

כאשר $f_x(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) = 0$ - נקודה קריטית

אם $C = f_{yy}(x_0+oh, y_0+ok)$, $B = f_{xy}(x_0+oh, y_0+ok)$, $A = f_{xx}(x_0+oh, y_0+ok)$ אז

$$f(x_0+h, y_0+k) = f(x_0, y_0) + \frac{1}{2}(Ah^2 + 2Bhk + Ck^2) - \dots$$

אם $Ah^2 + 2Bhk + Ck^2 > 0$ - נקודה קריטית מקומית

אם $Ah^2 + 2Bhk + Ck^2 < 0$ - נקודה קריטית מקומית

$$Ah^2 + 2Bhk + Ck^2 = k^2 \left[A\left(\frac{h}{k}\right)^2 + 2B\left(\frac{h}{k}\right) + C \right] ; k \neq 0$$

$$k^2(Ax^2 + 2Bx + C) \quad x = \frac{h}{k}$$

אם $A > 0$ - $(2B)^2 - 4AC < 0$ - נקודה קריטית מקומית

אם $A < 0$ - " " " " " " " "

אם $(2B)^2 - 4AC > 0$ - נקודה קריטית מקומית

אם $x = \frac{h}{k} = e$ - נקודה קריטית מקומית

אם $(2B)^2 - 4AC = 0$ - נקודה קריטית מקומית

אם $f_x(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) = 0$ - נקודה קריטית מקומית

אם $f_{xx} > 0$ - $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ - נקודה קריטית מקומית

אם $f_{xx} < 0$ - $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ - נקודה קריטית מקומית

אם $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 < 0$ - נקודה קריטית מקומית

אם $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 0$ - נקודה קריטית מקומית

אם $f_x = f_y = 0$ - נקודה קריטית מקומית

$$S = \{(x_0+h, y_0+k) \mid h^2+k^2 < r\} = B(x_0, y_0, r)$$

$$f(x_0+h, y_0+k) = f(x_0, y_0) + \frac{1}{2}(f_{xx}h^2 + 2f_{xy}hk + f_{yy}k^2)(x_0+oh, y_0+ok)$$

אם $f_{xx} > 0$, $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ - נקודה קריטית מקומית

$$H(x,y) = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix} : f(x,y) \text{ קובץ } \in \boxed{\text{מרחב וקטורי}} \text{ קוורטני}$$

$$(h, k) \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} - \text{ל} \text{ של } \text{קוורטני}$$

$$(h, k) \begin{pmatrix} f_{xx}h + f_{xy}k \\ f_{yx}h + f_{yy}k \end{pmatrix} = f_{xx}h^2 + 2hkf_{xy} + f_{yy}k^2 - \text{ל} \text{ של } \text{קוורטני}$$

מרחב וקטורי של וקטורים קוורטני

$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ קובץ של f וקטורי

$$H(x) = H(x_1, \dots, x_n) = \begin{pmatrix} f_{x_1x_1} & f_{x_1x_2} & \dots & f_{x_1x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{x_nx_1} & \dots & \dots & f_{x_nx_n} \end{pmatrix} - \text{קובץ של } f \text{ וקטורי}$$

$$k = \begin{pmatrix} k_1 \\ \vdots \\ k_n \end{pmatrix} \text{ וקטורי}$$

$$k^t H k = \sum_{i,j=1}^n f_{ij} k_i k_j = \left(k_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + k_2 \frac{\partial}{\partial x_2} + \dots + k_n \frac{\partial}{\partial x_n} \right)^2 f$$

$$x^0 = (x_1^0, \dots, x_n^0) \text{ קובץ של } f(x) = f(x_1, \dots, x_n) \text{ וקטורי}$$

קובץ של וקטורים $k = (k_1, \dots, k_n)$ וקטורי

$$f(x^0 + k) = f(x^0) + \nabla f(x^0) \cdot k + \frac{1}{2} k^t H k(x^0 + \theta k) - \text{קובץ של}$$

קובץ של וקטורים

$$k^t A k > 0 : k_{n+1} \neq 0 \text{ של } \boxed{\text{מרחב וקטורי}} \text{ (1) : } A \text{ של וקטורי}$$

$$k^t A k \geq 0 : k_{n+1} \neq 0 \text{ של } \boxed{\text{מרחב וקטורי}} \text{ (2)}$$

$$k^t A k < 0 : k_{n+1} \neq 0 \text{ של } \boxed{\text{מרחב וקטורי}} \text{ (2)}$$

$$k^t A k \leq 0 : k_{n+1} \neq 0 \text{ של } \boxed{\text{מרחב וקטורי}} \text{ (3)}$$

$$k_2^t A k_2 < 0 \text{ וקטורי } k_1^t A k_1 > 0 \text{ וקטורי } \boxed{\text{מרחב וקטורי}} \text{ (2)}$$

מרחב וקטורי M_1, \dots, M_n וקטורי \Leftrightarrow מרחב וקטורי A של וקטורי \Leftrightarrow קובץ של וקטורים

$$M_k = \det \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1} & \dots & a_{kk} \end{pmatrix} \text{ וקטורי}$$

(1) $M_k > 0$ וקטורי M_k של וקטורי \Leftrightarrow מרחב וקטורי $(A) \Leftrightarrow$ מרחב וקטורי A וקטורי

$$M_k > 0 \text{ של } \boxed{\text{מרחב וקטורי}} \text{ של } A$$

$$(1) M_k > 0 \text{ של } \boxed{\text{מרחב וקטורי}} \text{ של } A$$

מרחב וקטורי A של וקטורי \Leftrightarrow

למשפט 1: נניח R^n ונגד $f: R^n \rightarrow R$

אם f היא פונקציה רציפה ו- C^2 בנקודה $x^0 \in R^n$

אז f היא פונקציה מקומית קיצונית ב- x^0 אם ורק אם $\nabla f(x^0) = 0$

אם f היא פונקציה מקומית קיצונית ב- x^0 אז $H(x^0)$ היא מטריצה סימטרית

אם $H(x^0)$ היא מטריצה סימטרית ב- x^0 אז f היא פונקציה מקומית קיצונית ב- x^0 אם ורק אם

(1) $H(x^0)$ היא מטריצה סימטרית ב- x^0

(2) $H(x^0)$ היא מטריצה סימטרית ב- x^0 ו- $\det H(x^0) < 0$

הוכחה: נניח $f \in C^2$ ו- $\nabla f(x^0) = 0$ ו- $k = (k_1, \dots, k_n)^T$

$$f(x^0 + k) = f(x^0) + \frac{1}{2} k^T H(x^0 + \theta k) k$$

אם $H(x^0)$ היא מטריצה סימטרית ב- x^0 אז $H(x^0 + \theta k)$ היא מטריצה סימטרית ב- $x^0 + \theta k$

אם $\|k\| < r$ אז $\|k\| < r$ ו- $0 < \theta < 1$ אז $\|k\| < r$

$$f(x^0 + k) = f(x^0) + \frac{1}{2} k^T H(x^0 + \theta k) k > f(x^0)$$

אם $\|k\| < r$ אז $f(x^0 + k) > f(x^0)$

כלומר x^0 היא נקודה מקומית קיצונית

אם $k_1^T H(x^0) k_1 > 0$ ו- $k_2^T H(x^0) k_2 < 0$ אז k_1 ו- k_2 הם וקטורים

ב- R^n ו- $\|k_i\| < r$ ו- $0 < \theta < 1$ אז $\|k_i\| < r$

$$k_1^T H(x^0 + \theta k_1) k_1 > 0, k_2^T H(x^0 + \theta k_2) k_2 < 0$$

$$f(x^0 + k_1) = f(x^0) + \frac{1}{2} k_1^T H(x^0 + \theta k_1) k_1 > f(x^0)$$

אם $\|k_i\| < r$ ו- $0 < \theta < 1$ אז $\|k_i\| < r$

$$f(x^0 + k_2) = f(x^0) + \frac{1}{2} k_2^T H(x^0 + \theta k_2) k_2 < f(x^0)$$

$$f(x^0 + k_2) < f(x^0)$$

אם $\|k_i\| < r$ ו- $0 < \theta < 1$ אז $\|k_i\| < r$

$$f(x^0 + k_2) < f(x^0), f(x^0 + k_1) > f(x^0)$$

אם f היא פונקציה מקומית קיצונית ב- x^0

אז $H(x^0)$ היא מטריצה סימטרית ב- x^0 ו- $\det H(x^0) < 0$

בצורה: יוני X ממפה $T: X \rightarrow X^{-1}$, (כאן T סגור) $X_1, X_2 \in S$ אז

$$d(Tx_1, Tx_2) \leq kd(x_1, x_2) \text{ וזו } 0 < k < 1 \text{ אז}$$

X היא T -ערכה ליניארית T

הצורה: $x \in X$ נקראת נקודה קבועה אם $T(x) = x$

הוכחה: נניח x היא נקודה קבועה, כלומר $T(x) = x$

אז $d(x, Tx) = d(x, x) = 0$

1 דוגמה: יוני X ממפה $T: X \rightarrow X$ כזו

שהיא T -ערכה $T(x) = x$ וזו $T: X \rightarrow X$ כזו

הוכחה: נניח $x_1, x_2 \in X$ אז $d(Tx_1, Tx_2) \leq kd(x_1, x_2)$

אם $x_1 = x_2$ אז $d(x_1, x_2) = 0$

אם $x_1 \neq x_2$ אז $d(x_1, x_2) > 0$ ונניח $d(x_1, x_2) = r$

אז $d(Tx_1, Tx_2) \leq kr$ וזו $d(x_1, x_2) = r$

הוכחה: נניח $T \circ T \dots \circ T = T^n$ וזו $T^n: X \rightarrow X$

אז $d(T^n x, T^n x) \leq k^n d(x, x) = 0$

$d(T^n x, T^n x) \leq k^n d(x, x) = 0$

אם $x \in X$ אז $T^n x = x$

דוגמה: $\{T^n x\}$ היא

הוכחה: נניח $n > m$ אז $d(T^n x, T^m x) = 0$

$$d(T^n x, T^m x) \leq d(T^n x, T^{n-1} x) + d(T^{n-1} x, T^{n-2} x) + \dots + d(T^{m+1} x, T^m x) \leq$$

$$\leq k^{n-1}r + k^{n-2}r + \dots + k^m r \quad (r = d(x, Tx))$$

$$d(T^n x, T^m x) \leq r k^m (1 + k + k^2 + \dots + k^{n-m}) = \frac{r k^m}{1-k} (1 - k^{n-m+1})$$


אם $n \rightarrow \infty$ אז $d(T^n x, T^m x) \rightarrow \frac{r k^m}{1-k}$

$$d(T^n x, T^m x) \leq \frac{r k^m}{1-k} < \frac{r k^m}{1-k} < \epsilon \text{ אז } n > m > n_0$$

אם $\{T^n x\}$ היא Cauchy

אם $x \in X$ אז $y = \lim_{n \rightarrow \infty} T^n x$ אז $T(y) = y$

$$T(y) = T(\lim_{n \rightarrow \infty} T^n x) = \lim_{n \rightarrow \infty} T^{n+1} x = y \text{ אז } y \text{ היא נקודה קבועה}$$



השורה השנייה היא המשפחה

המשפחה של כל $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ שבה $f(x) = x$ לכל $x \in \mathbb{R}^n$

כל df_x היא, אם f היא הפונקציה $f: S \rightarrow T$ שבה $f(x) = x$

הוא $f^{-1}: T \rightarrow S$ והמשפחה

משפט

1. יהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה, כי הנקודה $f'(x) = f'(x)$

כל df_x היא $f'(x)$. אם $f(x) \neq 0 \iff f'(x) \neq 0$, כל $f'(x) \neq 0$ אז $f'(x) \neq 0$

אם $f(x) = 0$ אז $f'(x) = 0$ והיא הפונקציה

2. אם $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ פונקציה $f(x) = (f_1(x), \dots, f_n(x))$

אם $f(x) = y$ אז $f_1(x) = y_1, \dots, f_n(x) = y_n$

$$f_1(x_1, \dots, x_n) = y_1, \dots, f_n(x_1, \dots, x_n) = y_n$$

כל $f(x) = y$ אז $f_1(x) = y_1, \dots, f_n(x) = y_n$

אם $f(x) = y$ אז $f_1(x) = y_1, \dots, f_n(x) = y_n$

3. המשפחה של כל $L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ שבה $L(x) = L(x) + L(h) + o$

$$L(x+h) = L(x) + L(h) + o$$

4. אם $f(x) = 0$ אז $f'(x) = 0$

5. אם $f: S \rightarrow \mathbb{R}^n$ פונקציה $f(x) = (f_1(x), \dots, f_n(x))$

אם $f(x) = 0$ אז $f_1(x) = 0, \dots, f_n(x) = 0$

אם $f(x) = 0$ אז $f_1(x) = 0, \dots, f_n(x) = 0$

אם $f(x) = 0$ אז $f_1(x) = 0, \dots, f_n(x) = 0$

אם $f(x) = 0$ אז $f_1(x) = 0, \dots, f_n(x) = 0$

אם $f(x) = 0$ אז $f_1(x) = 0, \dots, f_n(x) = 0$

אם $f(x) = 0$ אז $f_1(x) = 0, \dots, f_n(x) = 0$

$$\|f(x) - f(x_0)\| \leq \sum_{k=1}^n \|f_k(x) - f_k(x_0)\| \leq \sum_{k=1}^n \frac{\epsilon}{n} \|x - x_0\| = \epsilon \|x - x_0\|$$

$$\|f(x) - f(x_0)\|^2 = \sum_{k=1}^n \|f_k(x) - f_k(x_0)\|^2 < \sum_{k=1}^n \frac{\epsilon^2}{n} \|x - x_0\|^2 = \epsilon^2 \|x - x_0\|^2$$

$$\|f(x) - f(x_0)\| < \epsilon \|x - x_0\|$$

2.2 Calculus derivative of functions

if $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ is a function and $x_0 \in \mathbb{R}^n$ is a point, then f is differentiable at x_0 if there exists a linear map $df|_{x_0}$ such that

$$\frac{\partial(f_1, \dots, f_m)}{\partial(x_1, \dots, x_n)} \neq 0$$

if f is differentiable at x_0 , then $f \in C^1$ and $df|_{x_0}$ is the derivative of f at x_0 .

$$f(x_0+h) = f(x_0) + df|_{x_0}h + \epsilon(h) \quad \text{where } \epsilon(h) \rightarrow 0 \text{ as } h \rightarrow 0$$

$$f(x) = f(x_0) + df|_{x_0}(x-x_0) + \epsilon(x-x_0) \quad \text{where } \epsilon(x-x_0) \rightarrow 0 \text{ as } x-x_0 \rightarrow 0$$

2.2 Calculus inverse function theorem

$$f(x_1) = f(x_0) + df|_{x_0}(x_1 - x_0) + \epsilon_1 \quad \text{where } x_1 = x_0 + (df|_{x_0})^{-1}(y - f(x_0))$$

$$\text{so } x_2 = x_1 + (df|_{x_1})^{-1}(y - f(x_1)) \quad \text{and } f(x_2) = f(x_1) + y - f(x_1) + \epsilon_2$$

if f is differentiable at x_0 and $df|_{x_0}$ is invertible, then f is a local diffeomorphism near x_0 .

2.3 Calculus of vector fields

$$g(x) = 0 \quad \text{where } g(x) = (df|_{x_0})^{-1}(f(x) - y)$$

$$dg|_x = d[(df|_{x_0})^{-1}] \cdot d[(f(x) - y)]|_{x_0} = (df|_{x_0})^{-1} \cdot df|_{x_0} = I$$

$dg = I - df = 0$ where $g(x) = 0$ and $f(x) = y$.

f is a local diffeomorphism near x_0 if $df|_{x_0}$ is invertible.

$$dh|_x = dx - dg|_x = I - I = 0, \quad h(x) = x - g(x) \quad \text{where } h(x) = x - g(x)$$

$$\|h(x_1) - h(x_2)\| \leq \frac{1}{2} \|x_1 - x_2\| \quad \text{where } x_1, x_2 \in \overline{B(0, r)}$$

$$\|h(x)\| = \|h(x) - h(0)\| \leq \frac{1}{2} \|x - 0\| = \frac{1}{2} \|x\| \quad \text{where } x \in \overline{B(0, r)}$$

$\overline{B(0, r)} \rightarrow x$ is a diffeomorphism near x_0 .

$$g(x) = y \quad \text{where } x \in \overline{B(0, r)} \quad \text{and } y \in \overline{B(0, r)}$$

$$(x + dg|_{x_0}^{-1}(y - f(x_0))) \quad g_y(x) = x + y - f(x) \quad \text{where } x \in \overline{B(0, r)}$$

$$g_y(x) = h(x) + y$$

if f is a diffeomorphism near x_0 .

משפט השלכות

המשפט השלכות: $\epsilon > 0$: $\exists \delta > 0$

כזה שכל $x \in \overline{B(0, r)}$ מתקיים $\|g(x)\| < \delta$

וכאשר $\|x\| \leq r$ (כלומר $x \in \overline{B(0, r)}$) אז $\|g(x)\| < \delta$

אם $g(x) \in \overline{B(0, r)}$ אז $\|g(x)\| < \frac{r}{2} + \|y\| \leq \frac{r}{2} + \frac{r}{2} = r - \delta$

(*) $\overline{B(0, r)}$ סגור וקומפקט

לכן g ממשיך להיות קבוע על $\overline{B(0, r)}$ ויש M כך שכל $x \in \overline{B(0, r)}$ מתקיים $\|g(x)\| \leq M$

כלומר $\|g(x)\| \leq M$

(*) $\overline{B(0, r)}$ קומפקט

כלומר $x_1, x_2 \in \overline{B(0, r)}$

אז $\|g(x_1) - g(x_2)\| = \|h(x_1) + y - [h(x_2) + y]\| = \|h(x_1) - h(x_2)\| \leq \frac{1}{2} \|x_1 - x_2\|$

כלומר g היא L -קוסינג'ורנט על $\overline{B(0, r)}$

אם $g(x) = y$ אז $x - g(x) = x + y - g(x) - y$

אם $T = B(0, r)$ ו- $S = g^{-1}(B(0, r))$ כיוון ש- g היא L -קוסינג'ורנט

אז g^{-1} היא L^{-1} -קוסינג'ורנט על T כלומר $g^{-1} : T \rightarrow S$

כלומר $g^{-1} \in C^1(T)$ (כלומר g^{-1} היא פונקציה חלקה)

כלומר $g^{-1} : T \rightarrow S$ היא פונקציה חלקה

כלומר $x_1, x_2 \in S$ ו- $g(x_1) = g(x_2) = y$ אז $h(x_1) = x_1 - g(x_1) = x_1 - y$

כלומר $\|x_1 - x_2\| = \|g(x_1) + h(x_1) - g(x_2) - h(x_2)\| \leq \|g(x_1) - g(x_2)\| + \|h(x_1) - h(x_2)\| \leq \|g(x_1) - g(x_2)\| + \frac{1}{2} \|x_1 - x_2\|$

כלומר $\|g^{-1}(y_1) - g^{-1}(y_2)\| \leq 2 \|y_1 - y_2\|$ כלומר $\frac{1}{2} \|x_1 - x_2\| \leq \|g(x_1) - g(x_2)\|$

כלומר g היא פונקציה חלקה ויש לה הפיכה חלקה

2.2 Inverse Function Theorem

$(dg^{-1})|_{y_1} = (dg|_{x_1})^{-1}$ - If $g(x_1) = y_1 \in T$, then C^1 , $T \rightarrow \mathbb{R}^n$ is a diffeomorphism g^{-1} is local

$g(x) = y \in T$ then $g(x_1) = y_1 \in T$ - inverse

$g^{-1}(y) = g^{-1}(y_1) + (dg|_{x_1})^{-1}(y - y_1) + \epsilon(y - y_1)$, ϵ is a vector field

$$\lim_{y \rightarrow y_1} \frac{\epsilon(y - y_1)}{\|y - y_1\|} = 0$$

Let $y = g(x), y_1 = g(x_1)$, then

$$\begin{aligned} \epsilon(y - y_1) &= g^{-1}(y) - g^{-1}(y_1) - (dg|_{x_1})^{-1}(y - y_1) = (x - x_1) - (dg|_{x_1})^{-1}(g(x) - g(x_1)) \\ &= (x - x_1) - (dg|_{x_1})^{-1}(dg|_{x_1}(x - x_1) + \epsilon_g(x - x_1)) \\ &= (x - x_1) - (x - x_1) - (dg|_{x_1})^{-1}(\epsilon_g(x - x_1)) \end{aligned}$$

$$\lim_{y \rightarrow y_1} \frac{\epsilon(y - y_1)}{\|y - y_1\|} = \lim_{y \rightarrow y_1} \frac{-(dg|_{x_1})^{-1}(\epsilon_g(x - x_1))}{\|y - y_1\|} = \lim_{y \rightarrow y_1} (dg|_{x_1})^{-1} \left(\frac{\epsilon_g(x - x_1)}{\|x - x_1\|} \right) \frac{\|x - x_1\|}{\|y - y_1\|}$$

$$\frac{\|x - x_1\|}{\|y - y_1\|} = \frac{\|g^{-1}(y) - g^{-1}(y_1)\|}{\|y - y_1\|} \leq 2, \text{ by the Mean Value Theorem}$$

$(dg|_{x_1})^{-1}$ is a linear map, $\lim_{y \rightarrow y_1} (dg|_{x_1})^{-1} \left(\frac{\epsilon_g(x - x_1)}{\|x - x_1\|} \right) = 0$, so

the limit $\lim_{y \rightarrow y_1} \frac{\epsilon(y - y_1)}{\|y - y_1\|} = 0$, so g^{-1} is a diffeomorphism

4. Inverse of the Jacobian

g^{-1} is a diffeomorphism if $g \in C^1(T)$ and $J(g) \neq 0$

$$\left(\frac{\partial g_i}{\partial x_j} \right)_{i,j=1,\dots,n} = \text{matrix of } dg|_x \text{ and } dg|_y^{-1} = (dg|_x)^{-1}$$

$$\text{det } dg|_x = \Delta \neq 0 \Rightarrow \text{det } (dg|_x)^{-1} = \frac{1}{\Delta}$$

$$\frac{1}{\Delta} ((-1)^{i+j} M_{ij}) \text{ is the } (i,j)\text{-th element of } (dg|_x)^{-1}$$

M_{ij} is the minor of Δ obtained by deleting the i -th row and j -th column

Let $J(g^{-1}(y)) = \frac{1}{\Delta} ((-1)^{i+j} M_{ij})$, then $J(g^{-1}(y)) = (J(g(x)))^{-1}$

Let $J(g(x)) = dg|_x$ and $J(g^{-1}(y)) = dg|_y^{-1}$

$$J(g^{-1}(y)) = (J(g(x)))^{-1}$$

Let $J(g(x)) = dg|_x$ and $J(g^{-1}(y)) = dg|_y^{-1}$

Let $J(g(x)) \in C^1(T)$, then $J(g^{-1}(y)) \in C^1(T)$


2 צדדים שווים פה

$$g(x) = (df|_x)^{-1} f(x_0 + x) - y_0, \quad x \in S, \quad f \text{ ו-} g \text{ א-1 ו-1 נכנסים זה לזה}$$

$$\text{- לפי קבוצת } g, \quad g(x_0) = (df|_{x_0})^{-1} (f(x_0) - y_0), \quad x \in S + x_0. \quad \text{לפי - הדף}$$

$$x = x_0 + g^{-1}((df|_{x_0})^{-1}(y - y_0)) \text{ - פשוט, } f(x) = g \text{ א-1 } (x - x_0) g^{-1}((df|_{x_0})^{-1}(f(x) - y_0))$$

$$f \text{ - } S \text{ נכנסים זה לזה } f^{-1}(y) = x_0 + g^{-1}((df|_{x_0})^{-1}(y - y_0)), \quad \text{אם}$$



C^1 - פשוט זהו זה המרחב הזה, y זה אפילו C^1 - זה מה f^{-1}

$$(df^{-1})|_y = (df|_x)^{-1} : f(x) = y \in T, \quad x \in S \text{ פ, } \text{אולי } \text{אולי } \text{אולי} : \text{אולי}$$

$$f^{-1}(f(x)) = x \quad \text{אם } y = f(x) \text{ - } x \in S \text{ זה המרחב}$$

$$df^{-1}|_y = (df|_x)^{-1} \quad \text{- לפי } df^{-1}|_y \cdot df|_x = dx = I \quad \text{- אולי } \text{אולי} \text{ זה הפה}$$

$$f^{-1} \in C^k(T) \text{ , } k \in \mathbb{N} \text{ - } f \in C^k(S) \text{ 2 צדדים זה : 2 צדדים}$$

קטגוריית \mathbb{R} - $F(x,y)=0$ נניח y פונקציה של x .

נעלה את x - $F_x + F_y \frac{dy}{dx} = 0$ כי $F_x + F_y \frac{dy}{dx} = 0$ זהו $F_y = 0$

הפונקציה y איננה פונקציה של x אם $F_y = 0$!

מכיוון שכל x הוא בנקודה של $F(x,y)$ קיימת פונקציה של y של x .

כלומר, הפונקציה y של x היא פונקציה של x - כלומר, הפונקציה y של x היא פונקציה של x .

בנקודות שבהן $F(x,y)=0$ ו- $F \in C^1$ קיים $F_y \neq 0$ אז $F(x,y)=0 \Rightarrow y=y(x)$

הפונקציה y של x היא פונקציה של x - כלומר, הפונקציה y של x היא פונקציה של x .

ובכן - נגזרת y של x - $\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$

נגד $G: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ - $G(x,y) = (x, F(x,y))$ - כלומר $G(x,y) = (x, F(x,y))$

ההגזרת של G היא $J_G = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ F_x & F_y \end{pmatrix} = F_y \neq 0$ בנקודה (x_0, y_0)

כלומר G היא פונקציה של (x,y) ו- $G(x,y) = (x, F(x,y))$ - כלומר $G(x,y) = (x, F(x,y))$

כלומר $G^{-1}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ - כלומר $G^{-1}(x,z) = (x, h(x,z))$

כלומר $G^{-1}(x,z) = (x, h(x,z))$ - כלומר $G^{-1}(x,z) = (x, h(x,z))$

כלומר $G^{-1}(x,z) = (x, h(x,z))$ - כלומר $G^{-1}(x,z) = (x, h(x,z))$


כלומר $G(x, h(x,z)) = (x, F(x, h(x,z)))$ - כלומר $G(x, h(x,z)) = (x, F(x, h(x,z)))$

כלומר $F(x, h(x,z)) = 0$ - כלומר $F(x, h(x,z)) = 0$

כלומר $F(x, h(x,z)) = 0$ - כלומר $F(x, h(x,z)) = 0$

כלומר $F(x, h(x,z)) = 0$ - כלומר $F(x, h(x,z)) = 0$

כלומר $F(x, h(x,z)) = 0$ - כלומר $F(x, h(x,z)) = 0$



כלומר $F(x, h(x,z)) = 0$ - כלומר $F(x, h(x,z)) = 0$

כלומר $F(x, h(x,z)) = 0$ - כלומר $F(x, h(x,z)) = 0$

כלומר $F(x, h(x,z)) = 0$ - כלומר $F(x, h(x,z)) = 0$

כלומר $\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$ - כלומר $\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$

על המרחב \mathbb{R}^s (הערות המרחב \mathbb{R}^k)

הן C^1 המרחב $\mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^s \rightarrow \mathbb{R}^s$ $F = (F_1, \dots, F_s)$

נקודת $(x^0, y^0) = (x_1^0, \dots, x_k^0, y_1^0, \dots, y_s^0)$ שבה $k+s$ נקודות

ונניח $F_1(x^0, y^0) = 0, \dots, F_s(x^0, y^0) = 0$ $\Rightarrow F(x^0, y^0) = 0$

על (x^0, y^0) \rightarrow $k+s$ נקודות \rightarrow $k+s$ נקודות

אם $\frac{\partial(F_1, \dots, F_s)}{\partial(y_1, \dots, y_s)} \neq 0$ \rightarrow (x^0, y^0) נקודת

נקודה $x \in I \subset \mathbb{R}^k$ \rightarrow $y \in J \subset \mathbb{R}^s$ \rightarrow $F(x, y) = 0$

$\exists \varphi \in C^1(I) \rightarrow F(x, \varphi(x)) = 0$ \rightarrow $\varphi(x) = y$ \rightarrow $x \in I \rightarrow y \in J$

הוכחה

$$\begin{cases} x_1 = x_1^0 \\ x_2 = x_2^0 \\ \vdots \\ x_k = x_k^0 \\ F_1(x, y) = 0 \\ \vdots \\ F_s(x, y) = 0 \end{cases}$$

1. $\det \frac{\partial(F_1, \dots, F_s)}{\partial(y_1, \dots, y_s)} \neq 0$ \rightarrow $\frac{\partial(F_1, \dots, F_s)}{\partial(y_1, \dots, y_s)} \neq 0$ \rightarrow $\frac{\partial(F_1, \dots, F_s)}{\partial(y_1, \dots, y_s)} \neq 0$

$G(x, z) = (x, F(x, \varphi(x)))$ \rightarrow $G: \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^s \rightarrow \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^s$ \rightarrow $G(x, z) = (x, F(x, \varphi(x)))$

T \rightarrow $G^{-1}(x, z) = (x, \varphi(x))$ \rightarrow $G(x, z) = (x, F(x, \varphi(x)))$ \rightarrow $G(x, z) = (x, F(x, \varphi(x)))$

$G^{-1}(T) \rightarrow G^{-1}: T \rightarrow I \times J$ \rightarrow $G^{-1}(x, z) = (x, \varphi(x))$ \rightarrow $G(x, z) = (x, F(x, \varphi(x)))$

$x = (x_1, \dots, x_k), z = (z_1, \dots, z_s) \rightarrow G^{-1}(x, z) = (h_1(x, z), h_2(x, z))$ \rightarrow $G(x, z) = (x, F(x, \varphi(x)))$

$h_1(x, z) = x$ \rightarrow $G(x, z) = (x, F(x, \varphi(x)))$ \rightarrow $G(x, z) = (x, F(x, \varphi(x)))$

$G(x, h(x, z)) = (x, z)$ \rightarrow $x \in I \rightarrow z \in J, \varphi(x) = h(x, 0)$

$G(x, h(x, z)) = (x, z)$ \rightarrow $x \in I \rightarrow z \in J, \varphi(x) = h(x, 0)$

$(x, 0) = G(x, \varphi(x)) = (x, F(x, \varphi(x)))$ \rightarrow $G(x, y) = (x, F(x, y))$

הוכחה \rightarrow $C^1(I)$ \rightarrow $\varphi(x) = h(x, 0)$ \rightarrow $F(x, \varphi(x)) = 0$ \rightarrow $F(x, y) = 0$

גורם לזכור

2. $F_1(x,y,z)=0, F_2(x,y,z)=0$ - משוואות של משתנים 2

בצורה כללית $F_1(x,y,z)=0, F_2(x,y,z)=0$ - משוואות של משתנים 2

אם $F_1, F_2 \in C^1$, נניח שהמשוואות מתארות קו C^1 בסביבת נקודה (x_0, y_0, z_0) ונניח ש-

הקו אינו אנכי ל- $(0,0,0)$

אם $\frac{\partial(F_1, F_2)}{\partial(x,y,z)} \neq 0$ - נניח (x_0, y_0, z_0) נמצא בסביבת נקודה זו ונניח ש-

יש לנו C^1 - קו C^1 בסביבת נקודה זו (x_0, y_0, z_0) ונניח ש-

הקו C^1 מתארת $x=x(t), y=y(t), z=z(t)$ ונניח ש-

הקו C^1 אינו אנכי ל- $(0,0,0)$

אם $\frac{\partial(F_1, F_2)}{\partial(x,y,z)} \neq 0$ - נניח (x_0, y_0, z_0) נמצא בסביבת נקודה זו ונניח ש-

הקו C^1 מתארת $x=x(t), y=y(t), z=z(t)$ ונניח ש-

הקו C^1 אינו אנכי ל- $(0,0,0)$

3. נניח $f(x) = \frac{x^2 + \sin x}{x^2 + e^{2x}}$ - נניח $f(0)=1$ ונניח ש-

הקו C^1 מתארת $y=f(x)$ ונניח ש-

$\frac{y^3}{3} + e^y = \frac{x^4}{4} + c_1 x + c_2$ - נניח $y=f(x)$ ונניח ש-

$c = e^{-\frac{2}{3}}$ - נניח $y=f(x)$ ונניח ש-

הקו C^1 מתארת $y=f(x)$ ונניח ש-

$0 = F(x,y) = \frac{y^3}{3} + e^y - \frac{x^4}{4} - c_1 x - c_2$ - נניח $y=f(x)$ ונניח ש-

הקו C^1 מתארת $y=f(x)$ ונניח ש-

$F(x,y) = 0$ - נניח $y=f(x)$ ונניח ש-


$F_y(x,y) = y^2 + e^y \neq 0$ - נניח $y=f(x)$ ונניח ש-

הקו C^1 מתארת $y=f(x)$ ונניח ש-

תורת הקיצון

4. נמצא את הקיצון של הפונקציה $f(x,y,z)$ בתנאי הקשר $g(x,y,z) = 0$.

התנאי הקשר $g(x,y,z) = 0$ מוגדר על ידי המשוואה $x+y=10$.



הפונקציה $f(x,y) = xy$ מוגדרת על התחום $x+y=10$.

התנאי הקשר $g(x,y) = 10-x$ מוגדר על התחום $x+y=10$.

$$g(x) = xy = x(10-x)$$

הפונקציה $f(x,y)$ מוגדרת על התחום $x+y=10$.

התנאי הקשר $g(x,y) = 10-x$ מוגדר על התחום $x+y=10$.

הפונקציה $f(x,y,z)$ מוגדרת על התחום $x+y+z=10$.

התנאי הקשר $g(x,y,z) = 10-x-y-z$ מוגדר על התחום $x+y+z=10$.

הפונקציה $f(x,y,z)$ מוגדרת על התחום $x+y+z=10$.

התנאי הקשר $g(x,y,z) = 10-x-y-z$ מוגדר על התחום $x+y+z=10$.

$$g_x = f_x + \lambda g_x = 0, \quad g_y = f_y + \lambda g_y = 0, \quad g_z = f_z + \lambda g_z = 0$$

$$f_x = -f_z, \quad f_y = -f_z, \quad f_x = -f_z$$

$$h_y + h_z \frac{\partial z}{\partial y} = 0, \quad h_x + h_z \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \quad \text{כאשר } f_x = \frac{\partial z}{\partial x} = \lambda, \quad f_y = \frac{\partial z}{\partial y} = \lambda$$

$$f_x = -\frac{f_z}{\lambda}, \quad f_y = -\frac{f_z}{\lambda}, \quad f_z = f_z \cdot 1$$

$$f_x = -\frac{f_z}{\lambda}, \quad f_y = -\frac{f_z}{\lambda}, \quad f_z = f_z \cdot 1$$

התנאי הקשר $g(x,y,z) = 10-x-y-z$ מוגדר על התחום $x+y+z=10$.

התנאי הקשר $g(x,y,z) = 10-x-y-z$ מוגדר על התחום $x+y+z=10$.

התנאי הקשר $g(x,y,z) = 10-x-y-z$ מוגדר על התחום $x+y+z=10$.

$$\vec{\nabla} f(x,y,z) \cdot \vec{u} = 0 \quad \text{כאשר } \frac{\partial f}{\partial x}(x,y,z) = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y,z) = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial z}(x,y,z) = 0$$

התנאי הקשר $g(x,y,z) = 10-x-y-z$ מוגדר על התחום $x+y+z=10$.

התנאי הקשר $g(x,y,z) = 10-x-y-z$ מוגדר על התחום $x+y+z=10$.

התנאי הקשר $g(x,y,z) = 10-x-y-z$ מוגדר על התחום $x+y+z=10$.

הצגת הבעיה

1. נתון פונקציה $f(x, y, z)$ ופונקציה $h(x, y, z)$ - נמצא את המקסימום של f על C .


על C מוגדרת הפונקציה $G(x, y, z, \lambda) = f(x, y, z) + \lambda h(x, y, z)$

2. נמצא את הנקודה (x_0, y_0, z_0) ואת λ_0 כך ש:

$$G_x = f_x + \lambda h_x = 0, \quad G_y = f_y + \lambda h_y = 0, \quad G_z = f_z + \lambda h_z = 0, \quad G_\lambda = h = 0$$

למעשה $\begin{pmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \end{pmatrix} = -\lambda \begin{pmatrix} h_x \\ h_y \\ h_z \end{pmatrix}$ - כלומר $h=0$

פתרון



3. נמצא את הנקודה (x_0, y_0, z_0) ואת λ_0 כך ש:

$$f(x, y, z) = (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2$$

$$h(x, y, z) = ax + by + cz + d = 0$$

$$G(x, y, z, \lambda) = f + \lambda h = (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2 + \lambda(ax + by + cz + d)$$

$$G_x = 2(x-x_0) + a\lambda = 0, \quad G_y = 2(y-y_0) + b\lambda = 0, \quad G_z = 2(z-z_0) + c\lambda = 0, \quad G_\lambda = h = 0$$

$$4[(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2] = (a^2 + b^2 + c^2)\lambda^2$$

$$2(x-x_0)^2 = -\lambda a(x-x_0), \quad 2(y-y_0)^2 = -\lambda b(y-y_0), \quad 2(z-z_0)^2 = -\lambda c(z-z_0)$$

$$2[(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2] = -\lambda(ax + by + cz - ax_0 - by_0 - cz_0)$$

$$2k = -\lambda d - \lambda(ax_0 + by_0 + cz_0) \Rightarrow k = (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2$$

$$4k = \lambda^2(a^2 + b^2 + c^2), \quad 4k^2 = \lambda^2(ax + by + cz + d)^2 \Rightarrow k = \frac{(ax + by + cz + d)^2}{a^2 + b^2 + c^2}$$

$$\sqrt{k} = \frac{|ax + by + cz + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

4. נמצא את הנקודה (x_0, y_0, z_0) ואת λ_0 כך ש:

$$h_1(x, y, z) = 0, \quad h_2(x, y, z) = 0$$

5. נמצא את הנקודה (x_0, y_0, z_0) ואת λ_0 כך ש:

$$\nabla f(P) = 0 \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x}(P) = 0, \quad P \in \mathcal{D} \Rightarrow \vec{u} \text{ ישר, } P \in \mathcal{D} \Rightarrow \vec{u} \text{ ישר}$$

6. נמצא את הנקודה (x_0, y_0, z_0) ואת λ_0 כך ש:

$$\nabla f = \lambda_1 \nabla h_1 + \lambda_2 \nabla h_2$$

$$G(x, y, z, \lambda, \mu) = f(x, y, z) + \lambda h_1(x, y, z) + \mu h_2(x, y, z)$$

קובץ: $D \subseteq \mathbb{R}^n$ קרן \square (או תחום פתוח) של D שיהיה קבוע.

כל p של \bar{D} קרן \square (או תחום פתוח)

הכל \bar{D} תחום של \mathbb{R}^n ו- $f: \bar{D} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה קבועה,

$$\int_{\bar{D}} f(x) dx = \int_{\bar{D}} f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n$$

כל פונקציה קבועה, $f: \bar{D} \rightarrow \mathbb{R}$ ו- $\bar{D} \in \mathcal{A}$ (או תחום פתוח) ו- $\bar{D} = \bigcup_{j=1}^k \bar{D}_j$

(כאשר $D_i \cap D_j = \emptyset$ ל- $i \neq j$) כל תחום של \bar{D}_j ו- $\bar{D} = \bigcup_{j=1}^k \bar{D}_j$

$$m_j = \inf \{ f(x) \mid x \in \bar{D}_j \}, M_j = \sup \{ f(x) \mid x \in \bar{D}_j \}$$

$$S(f, P) = \sum_{j=1}^k m_j |\bar{D}_j|, \bar{S}(f, P) = \sum_{j=1}^k M_j |\bar{D}_j|$$

כל j של \bar{D}_j ו- \bar{D}_j תחום של \mathbb{R}^n ו- $\bar{D}_j \rightarrow \mathbb{R}^n$ פונקציה קבועה

$\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ פונקציה קבועה ו- $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ פונקציה קבועה

$$|T| = \prod_{j=1}^n (b_j - a_j) \quad T = \{ (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid a_j \leq x_j \leq b_j, 1 \leq j \leq n \}$$

$$|D|_{\text{int}} = \sup_{\substack{T \subseteq \bar{D} \\ T \text{ קרן}}} \sum_{s=1}^l |T_s|$$

$$|D|_{\text{ext}} = \inf_{\substack{T \subseteq \bar{D} \\ T \text{ קרן}}} \sum_{s=1}^l |T_s|$$

$$|D|_{\text{ext}} = |D|_{\text{int}}$$

$\bar{D} \text{ קרן} \iff \bar{D} \text{ (תחום פתוח)}$ ו- $\bar{D} \text{ קרן} \iff \bar{D} \text{ (תחום פתוח)}$

$$\bar{D} \subseteq \bigcup_{s=1}^l T_s \implies \sum_{s=1}^l |T_s| < \epsilon$$

משפט: נניח $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה קבועה ו- f פונקציה קבועה

כל $\epsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כזה שכל T קרן של $[a, b]$ ו- $|T| < \delta$ אז $\sum_{s=1}^l |T_s| < \epsilon$

$$|f(x) - f(y)| < \frac{\epsilon}{b-a} \text{ כל } |x-y| < \delta$$

כל $\epsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כזה שכל T קרן של $[a, b]$ ו- $|T| < \delta$ אז $\sum_{s=1}^l |T_s| < \epsilon$

כל $\epsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כזה שכל T קרן של $[a, b]$ ו- $|T| < \delta$ אז $\sum_{s=1}^l |T_s| < \epsilon$

כל $\epsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כזה שכל T קרן של $[a, b]$ ו- $|T| < \delta$ אז $\sum_{s=1}^l |T_s| < \epsilon$

כל $\epsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כזה שכל T קרן של $[a, b]$ ו- $|T| < \delta$ אז $\sum_{s=1}^l |T_s| < \epsilon$

כל $\epsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כזה שכל T קרן של $[a, b]$ ו- $|T| < \delta$ אז $\sum_{s=1}^l |T_s| < \epsilon$

כל $\epsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כזה שכל T קרן של $[a, b]$ ו- $|T| < \delta$ אז $\sum_{s=1}^l |T_s| < \epsilon$

$\lambda(P) = \max_{1 \leq j \leq k} \text{diam}(\bar{D}_j)$ - "פרימה" P הנמוכה ביותר

\bar{D} של P מקיים f על D , $x \in \bar{D}$ אז, $m \leq f(x) \leq M$ מתקיים f ממשותף f על D :1 גל

$$m|\bar{D}| = m \sum_{j=1}^k |\bar{D}_j| = \sum_{j=1}^k m |\bar{D}_j| = \sum_{j=1}^k m_j |\bar{D}_j| \leq \sum_{j=1}^k M_j |\bar{D}_j| \leq \sum_{j=1}^k M |\bar{D}_j| = M|\bar{D}|$$

$$\underline{S}(f, P) \leq \underline{S}(f, P) \leq M|\bar{D}| - \text{על כן, סדר}$$

הפרה: \bar{D} הוא D ו- \bar{D} הוא D -1

$P \rightarrow \bar{P}$: $\underline{S}(f, P), \bar{S}(f, P)$ הם \pm גל \bar{P} ב- D ו- \bar{P} הוא P על D

$$\int f = \sup \underline{S}(f, P) = \inf \bar{S}(f, P) - \text{הפרה}$$

$\int f(x) dx$ הוא $\int f = \int \bar{f}$ על D הפרה

P ו- Q הם $P \in \bar{P}$ ו- $Q \in \bar{Q}$ הפרה

P, Q הם P, Q

$$\underline{S}(f, P) \leq \underline{S}(f, Q) \leq \bar{S}(f, Q) \leq \bar{S}(f, P) - \text{על כן, } P \text{ ו-} Q$$

הפרה: $Q = \bigcup_{j=1}^k P_j$ ו- $P_j \in P$

$$\underline{S}(f, P) \leq \underline{S}(f, Q) \leq \bar{S}(f, Q) = \sum_{j=1}^k \bar{S}(f, P_j) \leq \sum_{j=1}^k M_j |P_j| = \bar{S}(f, P)$$

$$\underline{S}(f, P) \leq \bar{S}(f, R) - \text{על כן, } P, R$$

הפרה: $P \rightarrow R$ ו- $R \rightarrow T$ הם P, R, T הם D

$$\underline{S}(f, P) \leq \underline{S}(f, T) \leq \bar{S}(f, T) \leq \bar{S}(f, R) - \text{על כן, } P, R, T$$

$$\int f \leq \int \bar{f} - \text{על כן, } f, \bar{f}$$

$\bar{S}(f, P) - \underline{S}(f, P) < \epsilon$ - ϵ של P \Rightarrow $\bar{S}(f, P) \approx \underline{S}(f, P)$ הפרה

$$\bar{S}(f, P) - \underline{S}(f, P) < \epsilon \Rightarrow \int f = \int \bar{f} - \text{על כן, } f, \bar{f}$$

$$0 \leq \int f - \int \bar{f} \leq \bar{S}(f, P) - \underline{S}(f, P) < \epsilon$$

$$0 \leq \int f - \int \bar{f} < \frac{\epsilon}{2} - \text{על כן, } P$$

$$0 \leq \int f - \int \bar{f} < \frac{\epsilon}{2} - \text{על כן, } Q$$

$$0 \leq \int f - \int \bar{f} < \frac{\epsilon}{2}, 0 \leq \int f - \int \bar{f} < \frac{\epsilon}{2} - \text{על כן, } R$$

$\sum_{j=1}^k (m_j - m_{j-1}) |D_j| < \epsilon$ - e $\varphi(D = \bigcup_{j=1}^k D_j)$ $P = \{D_j\}_{j=1}^k$ חוקה $\epsilon > 0$ $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ \Leftrightarrow $D \rightarrow \mathbb{R}$ f רציפה
 $S(f, P) = \sum_{j=1}^k m_j |D_j|$, $S(f, P) = \sum_{j=1}^k m_j |D_j|$ - הכמה של הקטנה

$\sum_{j=1}^k (m_j - m_{j-1}) |D_j| = S(f, P) - S(f, P) < \epsilon$ - e φ P חוקה $\epsilon > 0$ $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ \Leftrightarrow f ϵ δ רציפה

$D \rightarrow \mathbb{R}$ f ϵ δ \Leftrightarrow $D \rightarrow \mathbb{R}$ f ϵ δ רציפה \leftarrow

הכמה של הקטנה $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}^k$ ϵ δ \Leftrightarrow f ϵ δ רציפה

ϵ δ \Leftrightarrow $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ ϵ δ רציפה \Leftrightarrow $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ ϵ δ רציפה

$|f(x) - f(y)| < \frac{\epsilon}{2|D|}$ \Leftrightarrow $\|x - y\| < \delta$ \Leftrightarrow $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ ϵ δ רציפה

$P = \{D_j\}_{j=1}^k$ $\chi(P) < \delta$ - e $D \subseteq P$ \Leftrightarrow $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ ϵ δ רציפה

$m_j - m_{j-1} \leq \frac{\epsilon}{2|D|}$ \Leftrightarrow $\chi(P) < \delta$ \Leftrightarrow $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ ϵ δ רציפה

$$S(f, P) - S(f, P) = \sum_{j=1}^k (m_j - m_{j-1}) |D_j| \leq \sum_{j=1}^k \frac{\epsilon}{2|D|} |D_j| = \frac{\epsilon}{2|D|} \sum_{j=1}^k |D_j| = \frac{\epsilon}{2|D|} |D| = \frac{\epsilon}{2} < \epsilon$$

$D \rightarrow \mathbb{R}$ f ϵ δ רציפה \Leftrightarrow $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ ϵ δ רציפה

$$\lim_{\chi(P) \rightarrow 0} S(f, P) - S(f, P) = 0 \quad \text{לכן } f: D \rightarrow \mathbb{R} \text{ רציפה}$$

$$\int f = \lim_{\chi(P) \rightarrow 0} S(f, P) = \lim_{\chi(P) \rightarrow 0} S(f, P) - 0$$

$S(f, P) - S(f, P) < \epsilon$ \Leftrightarrow $\chi(P) < \delta$ \Leftrightarrow $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ ϵ δ רציפה

$$\lim_{\chi(P) \rightarrow 0} S(f, P) - S(f, P) = 0 \quad \text{לכן } f: D \rightarrow \mathbb{R} \text{ רציפה}$$

$$0 \leq S(f, P) - \int f \leq S(f, P) - S(f, P) \quad \text{לכן } \int f \leq S(f, P) \leq \int f + \epsilon$$

$$\lim_{\chi(P) \rightarrow 0} S(f, P) = \int f \quad \text{לכן } \lim_{\chi(P) \rightarrow 0} [S(f, P) - \int f] = 0$$

רציפה \Leftrightarrow $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ ϵ δ רציפה \leftarrow

$$\lim_{\chi(P) \rightarrow 0} S(f, P) - S(f, P) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad f: D \rightarrow \mathbb{R} \text{ רציפה}$$

$f: D \rightarrow \mathbb{R}$ ϵ δ רציפה \Leftrightarrow $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ ϵ δ רציפה

משפט הנני $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ -1 D ופונקטור $P = \{D_j\}_{j=1}^k$ ונני $\sum_{j=1}^k f(x_j) |D_j|$: P פונקטור f על $\boxed{\text{מסבך}}$

כאן x_j נק' מסבך P_j .

$\underline{S}(f, P) \leq S \leq \overline{S}(f, P)$: פונקטור f על מסבך P .

מסבך S : מסבך P ופונקטור f על מסבך S ופונקטור f על מסבך S ופונקטור f על מסבך S .

משפט : הנני f פונקטור $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ ונני $\lambda(P) \rightarrow 0$ כאשר P מסבך D .

$L = \int_D f$: מסבך P ופונקטור f על מסבך P ופונקטור f על מסבך P .

משפט : הנני $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ ופונקטור P ופונקטור f על מסבך P .

$\int_D f = \int_D f$: הנני f פונקטור $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ ופונקטור P ופונקטור f על מסבך P .

משפט : הנני $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ ופונקטור P ופונקטור f על מסבך P .

$\int_D f = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \overline{S}(f, P) = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \underline{S}(f, P)$: הנני f פונקטור $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ ופונקטור P ופונקטור f על מסבך P .

$\int_D f = \int_D f$: הנני f פונקטור $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ ופונקטור P ופונקטור f על מסבך P .

$\overline{S}(f, P) = \sup \{ S \mid P \text{ מסבך } f \text{ על } S \}$: הנני f פונקטור $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ ופונקטור P ופונקטור f על מסבך P .

הנני $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ ופונקטור P ופונקטור f על מסבך P .

$\int_D f = \int_D f$: הנני f פונקטור $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ ופונקטור P ופונקטור f על מסבך P .

משפט : הנני $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ ופונקטור P ופונקטור f על מסבך P .

(1) הנני $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ ופונקטור P ופונקטור f על מסבך P .

הנני $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ ופונקטור P ופונקטור f על מסבך P .

$\mathbb{R}^n \supseteq S = \{ (x_1, \dots, x_n, y) \in \mathbb{R}^n \mid 0 \leq y \leq f(x_1, \dots, x_n) \}$: הנני $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ ופונקטור P ופונקטור f על מסבך P .

(2) הנני $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ ופונקטור P ופונקטור f על מסבך P .

הנני $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ ופונקטור P ופונקטור f על מסבך P .

הנני $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ ופונקטור P ופונקטור f על מסבך P .

הנני $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ ופונקטור P ופונקטור f על מסבך P .

הכנסה נוספת: כלל ←

יש. כל $c \in \mathbb{R} \rightarrow D \rightarrow$ פונקציות $f, g: D \rightarrow \mathbb{R}$ וכל $D \subseteq \mathbb{R}^n$ אז

(1) $\int (cf + cg) = c \int f + c \int g$ - נקרא $D \rightarrow$ ע"כ $f + cg$ (1)

(2) $\int f \geq \int g$ - נקרא $f(x) \geq g(x) \forall x \in D$ כל (2)

$\int f = \sum_{j=1}^k \int_{D_j} f$ - נקרא D_j כל f ו- $D = \bigcup_{j=1}^k D_j$ כל (2)

$m|D| \leq \int f \leq M|D|$ - נקרא $D \rightarrow m \leq f(x) \leq M$ כל (3)

$\int 1 = |D|$ (1)

$\int f = \int f(x)|D|$ - נקרא $x \in D$ אז $D \rightarrow$ נקרא f כל הפונקציה כל (1)

$|\int f| \leq \int |f|$ - נקרא f כל $|f|$ (5)

הוכחה

$\int_{j=1}^k [f(x_j) + cg(x_j)] |D_j| = \int_{j=1}^k f(x_j) |D_j| + c \int_{j=1}^k g(x_j) |D_j|$ - נקרא $f + cg$ כל (1)

אז כל f ו- g כל p_i , $\int f + cg = \int f + c \int g$ - נקרא f, g כל $x(p_i) \rightarrow p_i$

$\int f + cg = \lim_{x(p_i) \rightarrow p_i} (f + cg) = \int f + c \int g$ - נקרא $f + cg$ כל (1)

$\int f \geq \int g$ כל $x(p_i) \rightarrow p_i$, $\int_{j=1}^k f(x_j) |D_j| \geq \int_{j=1}^k g(x_j) |D_j|$ - נקרא $f(x) \geq g(x)$ כל (2)

$\int f \geq \int 0 = 0$ - נקרא $f(x) \geq 0$ כל (2)

D כל $P = \bigcup_{j=1}^k P_j$ כל P_j כל P כל $1 \leq j \leq k$ כל (2)

$\int(f, P) = \int(f, P) = \sum_{j=1}^k \int(f, P_j) = \int(f, P)$ - נקרא $\int(f, P) = \sum_{j=1}^k \int(f, P_j)$, $\int(f, P) = \sum_{j=1}^k \int(f, P_j)$ - נקרא

$0 \leq \int(f, P) = \int(f, P) \leq \int(f, P) = \int(f, P)$, $1 \leq j \leq k$ כל P_j כל P כל $1 \leq j \leq k$ כל (2)

$\int(f, P) = \int(f, P) = \int(f, P)$ - נקרא $x(p_i) \rightarrow p_i$ כל $D \rightarrow$ כל f - נקרא

$\int(f, P) = \int(f, P) = \int(f, P)$ - נקרא $\int(f, P_j) = \int(f, P_j) = \int(f, P_j)$

$\int f = \lim_{x(p_i) \rightarrow p_i} \int(f, P) = \lim_{x(p_i) \rightarrow p_i} \sum_{j=1}^k \int(f, P_j) = \sum_{j=1}^k \int f$

D כל P כל f כל $1 \leq j \leq k$ כל (3)

$m|D| \leq \int f \leq M|D|$ - נקרא $x(p_i) \rightarrow p_i$ כל $m \leq f(x) \leq M$ כל (3)


$1|D| \leq \int 1 \leq 1|D|$ - נקרא $1 \leq f(x) \leq 1$ כל $f(x) = 1$ כל (3)

נתונה פונקציה $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ ו- $D \subset \mathbb{R}^2$ אזור קוואדראט. נגדיר את האינטגרל כ:

סכום ריבועי: $\iint_D f(x,y) dx dy$ (קרוי "אינטגרל כפול")

אזור $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$ נקרא "אזור מלבני" (rectangle).

נניח $f(x) \geq 0$ אז האינטגרל הוא שטח מתחת העקום.



נבחר נקודות $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ ו- $c \leq y \leq d$ ונבנה את השטח.

אנחנו רוצים להעריך את שטח המשטח באופן מקורב. נבנה את המשטח A_k ו- x_{k-1} .

הוא $A(x_{k-1})(x_k - x_{k-1})$ כאשר $A(x_{k-1})$ הוא שטח החתך של המשטח ב- $x = x_{k-1}$ (האינטגרל $\int_c^d f(x_{k-1}, y) dy$).

אם כן, השטח של המשטח הוא "סכום כמות": $\sum_{k=1}^n A(x_{k-1})(x_k - x_{k-1})$.

כאשר $n \rightarrow \infty$ (המשטח מתחמק), נקרא את השטח האינטגרל $\int_a^b \int_c^d f(x,y) dy dx$.

אם $f(x,y) \geq 0$, אז האינטגרל הוא שטח מתחת העקום $z = f(x,y)$ מעל האזור D .
 והוא $\int_a^b \int_c^d f(x,y) dy dx$. עדיף לכתוב $\int_a^b \int_c^d f(x,y) dy dx$ שונה מאינטגרל ממוצע:

$$\int_a^b \int_c^d f(x,y) dy dx = \int_a^b \left(\int_c^d f(x,y) dy \right) dx$$

$$\int_c^d \int_a^b f(x,y) dx dy = \int_c^d \left(\int_a^b f(x,y) dx \right) dy$$

המשטח הוא תחת העקום של אינטגרל כפול.

תרגילי אינטגרל

1. $D = [0,1] \times [0,1]$: חשבו את האינטגרל $\iint_D (x+y)^3 dx dy$

פתרון: האינטגרל הוא פשוט ונחשב על ידי אינטגרציה חצונית.

$$\begin{aligned} \int_0^1 dx \int_0^1 (x+y)^3 dy &= \int_0^1 \left. \frac{(x+y)^4}{4} \right|_{y=0}^{y=1} dx = \int_0^1 \left(\frac{(x+1)^4}{4} - \frac{x^4}{4} \right) dx = -1/4 \\ &= \left. \left(\frac{(x+1)^5}{20} - \frac{x^5}{20} \right) \right|_0^1 = \frac{2^5 - 2}{20} = \frac{30}{20} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$


2. $D = [0,1] \times [0, \frac{\pi}{2}]$: חשבו את האינטגרל $\iint_D xy^2 \cos(x^2y) dx dy$

פתרון: כאן נשתמש בשיטת החלפת משתנים, נגדיר $u = x^2y$.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} dy \int_0^1 xy^2 \cos(x^2y) dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} dy \left(\frac{1}{2} \sin(x^2y) \right) \Big|_{x=0}^{x=1} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} \sin y dy = -1/2 \\ &= -\frac{1}{2} \cos y \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

תחום אינטגרציה

התחום $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b, \varphi(x) \leq y \leq \psi(x)\}$ נקרא תחום מוגבל.



אם $f(x) \geq 0$ ו- $c=0$, אז $D = [a,b] \times [0,f(x)]$. האינטגרל $\iint_D f(x,y) dx dy$ שווה ל- $\int_a^b f(x) dx$.

אם $f(x) \leq 0$ ו- $c=0$, אז $D = [a,b] \times [0, -f(x)]$.

אם $f(x) \geq 0$ ו- $c > 0$, אז $D = [a,b] \times [c, c+f(x)]$.


$$\iint_D f(x,y) dx dy = \int_a^b dx \int_c^{c+f(x)} f(x,y) dy = \int_a^b dx \int_c^d f(x,y) dy - \int_a^b dx \int_c^{c+f(x)} f(x,y) dy$$

$$\iint_D f(x,y) dx dy = \int_a^b dx \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x,y) dy = \int_a^b \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x,y) dy dx$$

תרגיל

3. $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq y \leq 1\}$: חשבו את האינטגרל $\iint_D xy^2 dx dy$

$$\int_0^1 dy \int_0^y xy^2 dx = \int_0^1 y^3 \left. \frac{x^2}{2} \right|_{x=0}^{x=y} dy = \int_0^1 \frac{y^5}{2} dy = \frac{1}{12}$$




4. $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq y \leq 1\}$: חשבו את האינטגרל $\iint_D e^{xy} dx dy$

$$\int_0^1 dy \int_0^y e^{xy} dx = \int_0^1 dy \left. \frac{e^{xy}}{y} \right|_{x=0}^{x=y} = \int_0^1 (e^{y^2} - 1) dy$$

$$= \left. \frac{e^{y^2}}{2} - y \right|_0^1 = \frac{e}{2} - 1$$

$x \in [a, b]$ וכל $y \in [c, d]$ אז $A = [a, b] \times [c, d]$ הוא קטע מלבני. $f(x, y)$ היא פונקציה רציפה על A .
 $\iint_A f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx$ - פונקציה $I(x)$ על $[a, b]$ שבה $I(x) = \int_c^d f(x, y) dy$ (הפונקציה הפנימית)



$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ - חלוקה של $[a, b]$ ל- n קטעים.
 $a = y_0 < y_1 < \dots < y_m = d$ - חלוקה של $[c, d]$ ל- m קטעים.
 המלבנים A_{ij} הם קטעים $P \times Q$ המכילים את A .

$\Delta y_j = y_j - y_{j-1}$, $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ - רוחב קטעים, $A_{ij} = [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j]$

$m_{ij} = \inf_{(x,y) \in A_{ij}} f(x,y)$, $M_{ij} = \sup_{(x,y) \in A_{ij}} f(x,y)$

$\sum_{i=1}^n I(t_i) \Delta x_i$ - סכום ריבוי של $I(x)$ על $[a, b]$ עם P חלוקה, $\int_a^b I(x) dx$ הוא גבול הסכום.

$t_i \in [x_{i-1}, x_i]$ - נקודה בקטע $[x_{i-1}, x_i]$.

$m_{ij} \leq f(t_i, y) \leq M_{ij}$ - לכל $(t_i, y) \in A_{ij}$ ו- $y \in [y_{j-1}, y_j]$

$m_{ij} \Delta y_j \leq \int_{y_{j-1}}^{y_j} f(t_i, y) dy \leq M_{ij} \Delta y_j$

$\sum_{j=1}^m m_{ij} \Delta y_j \leq \sum_{j=1}^m \int_{y_{j-1}}^{y_j} f(t_i, y) dy \leq \sum_{j=1}^m M_{ij} \Delta y_j$

$\sum_{j=1}^m m_{ij} \Delta y_j \leq I(t_i) \leq \sum_{j=1}^m M_{ij} \Delta y_j$ - כי $\int_{y_{j-1}}^{y_j} f(t_i, y) dy = I(t_i)$

$\sum_{j=1}^m m_{ij} \Delta x_i \Delta y_j \leq \sum_{i=1}^n I(t_i) \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m M_{ij} \Delta x_i \Delta y_j$

$\sum_{i=1}^n I(t_i) \Delta x_i$ - סכום ריבוי של $I(x)$ עם R חלוקה, $\int_a^b I(x) dx \leq R \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m M_{ij} \Delta x_i \Delta y_j$

$\lambda(P \times Q) \rightarrow 0$ - חלוקה $\lambda(Q) \rightarrow 0$ - חלוקה $\lambda(P) \rightarrow 0$

$\iint_A f(x, y) dx dy = \int_a^b I(x) dx = \iint_A f(x, y) dx dy$ - זהו תוצאה יסודית.

(סעיף)

$\int_a^b I(x) dx = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx$

משפט פאניני

אם f ו- g שייכים ל- C^0 אז $\iint_R (g(x,y) \pm f(x,y)) dx dy = \iint_R g(x,y) dx dy \pm \iint_R f(x,y) dx dy$ - כלומר

האינטגרל של סכום (הפרש) פונקציות הוא סכום (הפרש) האינטגרלים שלהן.

$$\iint_R f \pm \iint_R g = \iint_R (f \pm g) dx dy$$

אם $f(x,y) = g(x,y) \Rightarrow \iint_R f(x,y) dx dy = \iint_R g(x,y) dx dy$ - כלומר

$$\iint_R f(x,y) dx dy = \int_a^b dx \int_{\phi(x)}^{\psi(x)} f(x,y) dy$$

משפט פאניני: אם $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ היא פונקציה רציפה על $D \subset \mathbb{R}^2$ אז האינטגרל שלה קיים.

משפט פאניני: אם $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ היא פונקציה רציפה על $D \subset \mathbb{R}^2$ אז האינטגרל שלה קיים.

$D = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x,y) \in A, z \in [h(x,y), k(x,y)]\}$ - אז $D \subset \mathbb{R}^3$ ו- $A \subset \mathbb{R}^2$

אם $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ היא פונקציה רציפה על D אז

$$\iiint_D f(x,y,z) dx dy dz = \iint_A dx dy \int_{h(x,y)}^{k(x,y)} f(x,y,z) dz$$

(משפט פאניני עבור אינטגרל כפול)

משפט פאניני: אם $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ היא פונקציה רציפה על $D \subset \mathbb{R}^3$ אז האינטגרל שלה קיים.