

תרגיל 7

1. תהא $\mathbb{R} \not\subseteq A$ קבוצה צפופה ב \mathbb{R} . הוכיחו כי A לא קשירה.
פתרון:

כיוון ש $\mathbb{R} \neq A$ אזי קיים $x \in \mathbb{R} \setminus A$. כעת נגדיר $V_1 = (x, \infty)$, $V_2 = (-\infty, x)$ פתוחות ב \mathbb{R} ולכן $A \cap V_i \neq \emptyset$ (לכל i) כי A צפופה. נקבל מכאן כי

$$A = [A \cap V_1] \cup [A \cap V_2]$$

פירוק של A לאיחוד זר של קבוצות פתוחות (ב A) זרות לא ריקות. לכן A אינה קשירה.

2. יהי (X, τ) מרחב טופולוגי. עבור קבוצה $A \subseteq X$ נגדיר את הפונקציה $\chi_A : X \rightarrow \mathbb{R}$ שנקראת הפונקציה האופיינית של A לפי

$$\chi_A = \begin{cases} 1 & x \in A \\ 0 & x \notin A \end{cases}$$

הוכיחו כי X קשירה אם ורק אם לכל $A \subseteq X$ (למעט \emptyset, X) הפונקציה χ_A אינה רציפה.

פתרון. X קשירה אם ורק אם אין $A \subseteq X$ (למעט \emptyset, X) שהיא סגורה. לכן מספיק להראות ש χ_A רציפה אם ורק אם A סגורה. אבל באמת, נניח ש A סגורה ותהי $U \subseteq \mathbb{R}$ פתוחה אז

$$\chi_A^{-1}(U) \in \{\emptyset, A, A^c, X\}$$

ולכן χ_A רציפה. מצד שני, אם χ_A רציפה אז

$$A = \chi_A^{-1}(\{1\})$$

$$A = \chi_A^{-1}((0.5, 1.5))$$

ולכן A גם פתוחה וגם סגורה.

3. האם המרחבים הבאים קשירים?

(א) $(\mathbb{R} \cup \{p\}, \tau)$ כאשר $\{O^c : |O^c| < \aleph_0\}$ $\tau = P(\mathbb{R}) \cup \{O \subseteq \mathbb{R} \cup \{p\} : |O^c| < \aleph_0\}$
פתרון:

לא קשיר. הקבוצה $\{1\}$ סגורה, כי ניתן לראות שגם היא וגם המשלים פתוחות, לפי הגדרת הטופולוגיה.

(ב) (\mathbb{N}, τ) כאשר $\tau = \{\emptyset, \mathbb{N}, O_n\} \forall n$, $O_n = \{0, \dots, n\}$.

פתרון:

המרחב קשיר. אין קבוצה סגורה לא טריוויאלית, כי כל קבוצה פתוחה שאינה ריקה חייבת להכיל את 0, ולכן לא תיתכן קבוצה פתוחה שאינה ריקה, שגם המשלימה שלה פתוחה.

(ג) עם \mathbb{Z} הטופולוגיה המושרית מהמטריקה הק-אדית.

פתרון:

המרחב אינו קשיר. הוכחנו בעבר שכל קבוצה מהצורה $p\mathbb{Z}$ היא סגורה.

4. יהו $A, B \subseteq X$ קבוצות פתוחות כך ש $A \cap B$ ו $A \cup B$ קשירים. הוכיחו ש A, B קשירות. פתרון:

לשם הפשטות נניח ש $A \cup B$ הוא כל המרחב שלנו. כלומר, $X = A \cup B$.

נניח בשלילה ש A לא קשיר. אז יש פירוק לא טריוויאלי $A = O_1 \cup O_2$ קבוצות פתוחות בזרות. מכיוון ש A פתוחת הן פתוחות גם ב X . נשים לב שמכיוון ש $A \cap B$ קשירה, אז היא בהכרח מוכלת באחת מהקבוצות. בה"כ, $A \cap B \subseteq O_1$. לכן $B \subseteq O_2$ הן קבוצות פתוחות לא ריקות וזרות שמכסות את X . בסתירה לכך ש X קשיר. לכן A קשיר. באופן זהה ניתן להוכיח ש B קשיר.

5. הוכיחו כי מרחב טופולוגי X הוא טריוויאלי אם ורק אם יש לו בסיס בעל קבוצה אחת.

פתרון. אם המרחב X טריוויאלי אז X היא הקבוצה הפתוחה הלא ריקה היחידה ולכן בוודאי ש $\mathcal{B} = \{X\}$ בסיס. מצד שני נניח ש $\mathcal{B} = \{B\}$ בסיס של X . בעצמה קבוצה פתוחה וצריכה להיות איחוד של אברים מהבסיס ולכן בהכרח $B = X$. לכן אין עוד קבוצות פתוחות חוץ מ X וזו טופולוגיה טריוויאלית.

6. יהי (X, τ) מרחב טופולוגי B_2 , הוכיחו כי $|\tau| \leq \aleph = 2^{\aleph_0}$.

פתרון. יש ל X בסיס בן מניה $\mathcal{B} = \{B_i\}_{i=1}^{\infty}$. כל קבוצה פתוחה P אפשר לכתוב כאיחוד של איברים מהבסיס.

$$O = \bigcup_{i \in I_P} B_i$$

כאשר $I_O \subseteq \mathbb{N}$. (כמובן, הבחירה של קבוצת האינדקסים I_O לא יחידה אבל אפשר לבחור קבוצה כלשהיא) נגדיר פונקציה

$$f : \tau \rightarrow P(\mathbb{N})$$

(כאן $P(\mathbb{N})$ זאת קבוצת החזקה) לפי

$$f(O) = I_O$$

נשים לב ש f חד חד ערכית כי אם

$$f(O_1) = f(O_2)$$

כלומר

$$I_{O_1} = I_{O_2}$$

אז

$$O_1 = \bigcup_{i \in I_{O_1}} B_i = \bigcup_{i \in I_{O_2}} B_i = O_2$$

ולכן העוצמות מקיימות ש

$$|\tau| \leq |P(\mathbb{N})| = \aleph$$

כנדרש.

7. תהי X קבוצה לא בת מניה עם טופולוגיה קו-מנייתית (cocountable). כלומר תת-קבוצות הפתוחות הן קבוצה ריקה, וקבוצות שהמשלים שלהן הוא בן מניה. האם מרחב זה הוא B_2 ?

פתרון. פתרון:

נוכיח ש (X, τ) אינו ספרבילי, ולכן אינו B_2 . נניח בשלילה ש X ספרבילית אז יש קבוצה בת מניה A שהיא צפופה, כלומר $cl(A) = X$. אבל A בת מניה ולכן סגורה, כי המשלימה שלה פתוחה. ולכן $cl(A) = A$. קיבלנו $A = X$ בסתירה לכך ש X לא בת מניה.

8. (א) יהי X מרחב B_2 . הראו כי לכל כיסוי כלשהוא של קבוצות פתוחות יש תת כיסוי בן מניה. (תכונה זאת נקראת תכונת לינדולף). כלומר, אם יש אוסף \mathcal{U} של קבוצות פתוחות כך ש $X = \bigcup_{U_i \in \mathcal{U}} U_i$, אז יש תת קבוצה בת מניה $\mathcal{O} \subseteq \mathcal{U}$ כך ש $X = \bigcup_{U_i \in \mathcal{O}} U_i$.

פתרון. יהי $\mathcal{U} = \{U_i\}_{i \in I}$ כיסוי של קבוצות פתוחות ויהי \mathcal{B} בסיס בן מניה. לכל $x \in U$, קיים $B_x \in \mathcal{B}$ כך ש $x \in B_x \subseteq U$ (לפי הגדרת בסיס). ברור ש $\{B_x\}_{x \in X}$ הינו כיסוי עבור X . למרות ש X יכולה להיות לא בת מניה, הכיסוי הזה חייב להיות בן מניה כי הוא מכיל רק אברים מ \mathcal{B} שהיא קבוצה בת מניה. לכן קיימת איזה קבוצה בת מניה $Y \subseteq X$ כך ש $\{B_y\}_{y \in Y}$ הוא גם כיסוי עבור X . כעת, לפי הבניה שלנו, ניתן לראות שלכל $y \in Y$ יש איזה $U \in \mathcal{U}$ כך ש $U \subseteq B_y$. יכולות להיות כמה קבוצות כאלה, אבל יש לפחות אחת. נבחר אחת מהן ונסמן אותה U_y . כעת האוסף $\{U_y\}_{y \in Y}$ שהוא תת קבוצה של \mathcal{U} הוא וודאי בן מניה (מאונדקס ע"י Y שהיא קבוצה בת מניה) והוא מכסה את X כי

$$X = \bigcup_{x \in X} B_x \subseteq \bigcup_{x \in X} U_x$$

ולכן זה תת כיסוי בן מניה כנדרש.

(ב) יהי X מרחב B_2 . הראו שלכל בסיס $\mathcal{B} = \{B_i\}_{i \in I}$ יש תת קבוצה בת מניה שהיא גם בסיס.

פתרון. יהי $\mathcal{C} = \{C_i\}_{i=1}^{\infty}$ בסיס בן מניה של X . היות שגם \mathcal{B} בסיס. כל C_i הוא איחוד איברים מ \mathcal{B} . נניח שלכל $i \in \mathbb{N}$ יש קבוצת אינדקסים J_i כך ש

$$\bigcup_{j \in J_i} B_j = C_i$$

לפי שאלה 4 C_i עצמו הוא גם מרחב מניה שניה בתור תת מרחב. לכן, לפי הסעיף הקודם, לכל כיסוי יש תת כיסוי בן מניה. לכן יש קבוצת אינדקסים בת מניה

$$K_i \subseteq J_i$$

כך ש

$$\bigcup_{j \in K_i} B_j = C_i$$

נשים לב ש $\bigcup_{i=1}^{\infty} K_i$ היא קבוצה בת מניה בתור איחוד בן מניה של בנות מניה. לכן הקבוצה $\{B_j \mid j \in \bigcup_{i=1}^{\infty} K_i\}$ היא גם בת מניה. אבל קבוצה זו היא גם בסיס כי כל איבר מהבסיס C_i הוא איחוד של איברים מקבוצה זו. ובזה סיימנו.