

## אנליזה מודרנית – תרגול 10

בהרצאה נלמד משפט לבג המקשר בין אינטגרל רימן  $\int_a^b f(x) dx$  ואינטגרל לבג  $\int_{[a,b]} f dm$  על קטע סגור. נוכיח בתרגול תוצאה דומה עבור האינטגרל ה"לא אמיתי"  $\int_a^\infty f(x) dx$ .

משפט: נניח כי האינטגרל הלא אמיתי של  $f$  בקרן  $[a, \infty)$  מתכנס בהחלט (ז"א

$$\int_a^\infty |f(x)| dx < \infty \text{ וגם כמובן } \int_a^\infty f^+ dx, \int_a^\infty f^- dx < \infty \text{ אזי } f \text{ אינט' לבג בקרן } [a, \infty) \text{ ומתקיים}$$

$$\int_a^\infty f(x) dx = \int_{[a, \infty)} f dm$$

הוכחה: נגדיר סדרת פונקציות  $g_n = f^+ I_{[a, a+n]}$  אזי  $\{g_n\}$  סדרה מונוטונית עולה של פונקציות אי-שליליות שגבולן  $f^+$  ומתקיים

$$\int_{[a, \infty)} f^+ dm = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[a, \infty)} g_n dm = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[a, a+n]} f^+ dm = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^{a+n} f^+(x) dx = \int_a^\infty f^+(x) dx$$

תרגיל ("כשלון חרוץ" של משפטי פוביני וטונלי):

יהיו הממ"חים  $([0,1], L([0,1]), u), ([0,1], P([0,1]), v)$  כאשר  $u = m$  היא מידת לבג ו-  
 $v = \#$  היא מידת הספירה, ותהי  $w = u \times v = m \times \#$  מידת המכפלה של  $u, v$ . נגדיר את  
 האלכסון  $D = \{(x, y) : 0 \leq x = y \leq 1\}$

א. הוכיחו כי האלכסון  $D$  הוא מדיד במרחב המכפלה.

ב. הוכיחו כי המספרים

$$\int_{[0,1] \times [0,1]} I_D(x, y) dw, \int_{[0,1] \times [0,1]} I_D(x, y) dm(x) d\#(y), \int_{[0,1] \times [0,1]} I_D(x, y) d\#(y) dm(x)$$

שווים זה מזה.

פתרון:

קודם כל יש להבין מהו מלבן מדיד במרחב המדובר. התשובה היא קבוצה מהצורה  
 $R = E \times F$  כאשר  $E \subseteq [0,1]$  מדידה לבג ו- $F \subseteq [0,1]$  כלשהי. למשל

$$R = \left[0, \frac{1}{4}\right] \times \left\{\frac{1}{\pi}, \frac{1}{2}, \frac{9}{10}\right\}$$

הוא מלבן מדיד, ונפחו הוא

$$|R| = m\left(\left[0, \frac{1}{4}\right]\right) \cdot \#\left(\left\{\frac{1}{\pi}, \frac{1}{2}, \frac{9}{10}\right\}\right) = \frac{1}{4} \cdot 3 = \frac{3}{4}$$

א. עבור  $n = 0, 1, 2, 3, \dots$  נגדיר קטעים  $I_{n,k} = \left[ \frac{k-1}{2^n}, \frac{k}{2^n} \right]$ . נגדיר בנוסף  $B_n = \prod_{k=1}^{2^n} I_{n,k} \times I_{n,k}$ .

לכל  $n$ ,  $B_n$  הוא איחוד בן מניה של מלבנים מדידים ( $R_\sigma$ ), ופשוט לראות כי  $D = \bigcap_{n=0}^{\infty} B_n$  (ניתן לצייר ציור, זה נראה כמו פיקסלים). כלומר  $D$  מטיפוס  $R_{\sigma\delta}$  ולכן מדידה.

ב. כדי לחשב את המידה  $w(D)$  נזכר במידה החיצונית:

$$w^*(D) = \sup \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} |R_n| : D \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} R_n, R_n \text{ are measurable rectangles} \right\}$$

יהי  $\{R_n = E_n \times F_n\}_{n=1}^{\infty}$  כיסוי של  $D$  ע"י מלבנים מדידים, ז"א  $D \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \times F_n$ . נזרוק מהאוסף  $\{R_n\}$  את כל המלבנים המדידים עבורם  $m(E_n) = 0$ . נותר לנו כיסוי של חלק לא

בן-מניה של האלכסון,  $D' \subseteq \bigcup_{\substack{n=1 \\ m(E_n) > 0}}^{\infty} E_n \times F_n$ . הסיבה לכך היא שקבוצת שיעורי ה- $x$  של

המלבנים שהוסרו היא ממידת לבג אפס, ולכן המלבנים שנותרו מכסים תת-קבוצה של האלכסון, ששיעורי ה- $x$  שלה מהווים קבוצה ממידת לבג חיובית (ומכאן לא בת מניה).

בהכרח ישנו מלבן  $R_{n_0} = E_{n_0} \times F_{n_0}$  באוסף הנותר, עבורו  $F_{n_0}$  אינסופית (אחרת המלבנים שנותרו לא יכולים לכסות את  $D'$ , שקבוצת שיעורי ה- $y$  שלה אינה בת מניה). עבור אותו

המלבן  $|R_{n_0}| = m(E_{n_0}) \cdot \#(F_{n_0}) = \infty$  ומכאן  $\sum_{n=1}^{\infty} |R_n| \geq |R_{n_0}| = \infty$ . כלומר, כל האיברים

בקבוצה  $\left\{ \sum_{n=1}^{\infty} |R_n| : D \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} R_n, R_n \text{ are measurable rectangles} \right\}$  הם  $\infty$  ולכן  $w^*(D)$  שהוא

sup-שלה שווה אינסוף. מכאן ניתן לחשב את האינטגרל הראשון (הכפול):

$$\int_{[0,1] \times [0,1]} I_D(x, y) dw = w(D) = \infty$$

לגבי האינטגרלים הנשנים:

• לכל  $y \in [0,1]$  קבוע,  $\int_{[0,1]} I_D(x, y) dm(x) = 0$  (כי  $I_D = 0$  כב"מ  $dm$ ) ולכן

$$\int_{[0,1]} \int_{[0,1]} I_D(x, y) dm(x) d\#(y) = 0$$

• לכל  $x \in [0,1]$  קבוע

$$\int_{[0,1]} I_D(x, y) d\#(y) = \int_{\{x\}} I_D(x, y) d\#(y) + \int_{[0,1] \setminus \{x\}} I_D(x, y) d\#(y) = \int_{\{x\}} 1 \cdot d\#(y) + 0 = \#(\{1\}) = 1$$

$$\cdot \int_{[0,1]} \int_{[0,1]} I_D(x, y) d\#(y) dm(x) = \int_{[0,1]} 1 \cdot dm(x) = 1 \text{ ולכן}$$

תרגיל: תהי  $f : (\mathbb{R}, L(\mathbb{R})) \rightarrow \mathbb{R}^*$  מדידה לבג, הוכיחו את השוויון

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dm(x) = \int_0^{\infty} m(\{x : |f(x)| \geq t\}) dm(t)$$

פתרון:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dm(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \left[ \int_0^{|f(x)|} 1 dm(t) \right] dm(x) =$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left[ \int_0^{\infty} I_{\{(x,t): |f(x)| \geq t\}} dm(t) \right] dm(x) \stackrel{\text{Tonelli}}{=} \int_0^{\infty} \left[ \int_{-\infty}^{\infty} I_{\{(x,t): |f(x)| \geq t\}} dm(x) \right] dm(t) = \int_0^{\infty} m(\{x : |f(x)| \geq t\}) dm(t)$$

הסיבה שמשפט טונלי תקף היא כי מדובר במידות לבג  $dm(x), dm(t)$  שהן שלמות ו- $\sigma$  סופיות. בנוסף יש לבדוק כי הפונקציה  $I_{\{(x,t): |f(x)| \geq t\}}$  מדידה במרחב המכפלה, וע"פ אחד מתרגילי הבית הכרחי ומספיק להוכיח כי **הקבוצה**  $\{(x,t) : |f(x)| \geq t\}$  מדידה " $L \otimes L$ ".

(נשתמש בסימון  $\otimes$  לסמן את  $\sigma$ -אלגברת המכפלה)

ובכן יהי  $\alpha \in \mathbb{R}$ , ההעתקה  $x \mapsto |f(x)|$  מדידה (הרכבה של רציפה ומדידה), ולכן הקבוצה  $\{x \in \mathbb{R} : |f(x)| > \alpha\} = E_\alpha \in L$  ומכאן  $\{(x,t) \in \mathbb{R}^2 : |f(x)| > \alpha\} = E_\alpha \times \mathbb{R} \in L \otimes L$  מלבן מדיד (שהוא קבוצה מדידה!). קיבלנו אם כן כי ההעתקה  $(x,t) \mapsto |f(x)|$  מדידה  $L \otimes L$ .

הפונקציה  $t \mapsto t$  גם כן מדידה לבג ולכן  $\{t \in \mathbb{R} : t > \alpha\} = F_\alpha \in L$  ומכאן  $\{(x,t) : t > \alpha\} = \mathbb{R} \times F_\alpha \in L \otimes L$ . הפרש בין פונקציות מדידות הוא מדיד, ולכן  $(x,t) \mapsto |f(x)| - t$  מדידה. הקבוצה שלנו היא בדיוק  $[0, \infty) \cap (|f| - t)^{-1}$  ולכן מדידה.

תרגיל: תהי  $\mu$  מידה סופית על  $\mathbb{R}$ , ונגדיר  $\alpha(x) = \mu((-\infty, x])$ . הוכיחו כי

$$\int_{-\infty}^{\infty} [\alpha(x+c) - \alpha(x)] dm(x) = c\mu(\mathbb{R})$$

פתרון:

$$\int_{-\infty}^{\infty} [\alpha(x+c) - \alpha(x)] dm(x) = \int_{-\infty}^{\infty} [\mu((-\infty, x+c]) - \mu((-\infty, x])] dm(x) =$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \mu((x, x+c]) dm(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{(x, x+c]} d\mu(t) dm(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} I_{\{(x,t): x < t \leq x+c\}} d\mu(t) dm(x) =$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} I_{\{(x,t): t > x \geq t-c\}} d\mu(t) dm(x) \stackrel{\text{Tonelli}}{=} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} I_{\{(x,t): t > x \geq t-c\}} dm(x) d\mu(t) = c \int_{-\infty}^{\infty} d\mu(t) = c\mu(\mathbb{R})$$

אנליזה פונקציונלית:

תרגיל: האם הפונקציות הבאות הן נורמות במרחב המצורף?

א.  $X = BV([a,b])$   $\|f\| := T_a^b[f]$

ב.  $X = BV([a,b])$   $\|f\| := |f(a)| + T_a^b[f]$

פתרון:

א. לא. האקסיומה הראשונה של הנורמה,  $\|f\| = 0 \Leftrightarrow f = 0$  נכשלת: לכל פונקציה קבועה יש השתנות טוטאלית אפס, ולא רק לפונקציית האפס. (שאר התכונות מתקיימות, ולמרחב שמקיים את תכונות 2-3 קוראים מרחב סמי-נורמי)

ב. זו כן נורמה.

- ברור שלכל  $f$   $\|f\| \geq 0$ , ויש שוויון או"א  $|f(a)| = T_a^b[f] = 0$  (כי זהו סכום של אי-שליליים).  $T_a^b[f] = 0$  אומר כי הפונקציה  $f \equiv c$  קבועה, ו- $|f(a)| = 0$  אומר שהערך הקבוע הזה הוא 0.

- לכל  $c \in \mathbb{R}$  קבוע,  $f \in BV([a,b])$

$$\|cf\| = |cf(a)| + T_a^b[cf] = |c||f(a)| + |c|T_a^b[f] = |c|\|f\|$$

- לכל  $f, g \in BV([a,b])$

$$\|f+g\| = |(f+g)(a)| + T_a^b[f+g] \leq |f(a)| + |g(a)| + T_a^b[f] + T_a^b[g] = \|f\| + \|g\|$$