

פיזיקה למתמטיקאים

תרגיל 8: בור אינסופי, אוסילטור קוונטי, אופרטורים

1. חלקיק בעל מסה m נמצא בבור פוטנציאלי אינסופי בתחום $|x| \leq a/2$.

(א) מצאו את 2 רמות האנרגיה הנמוכות ביותר ואת המצבים העצמיים המתאימים.

ב $t = 0$ החליק נמצא במצב המתוור ע"י $\psi(x) = \phi_1(x) + i\phi_2(x)$ כאשר $\phi_1(x), \phi_2(x)$ המצבים העצמיים שמצאתם ב (1א).

(ב) מצאו את תוחלת האנרגיה ביחס ל ψ .

(ג) מהי ההסתברות למצוא את החליק בחצי הימני של הבור ב $t = 0$?

(ד) מצאו את פונקציית הגל התלויה בזמן $\psi(x, t) = |\psi(x, t)|^2$. הביעו תשובתכם באמצעות ϕ_1, ϕ_2, E_1, E_2 .

(ה) באילו זמנים ההסתברות למצוא את החליק בחצי הימני של הבור מקסימלית? מהי הסתברות זו?

2. ההAMILTONIAN של חלקיק בפוטנציאל הרמוני נתון ע"י $\mathcal{H} = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2x^2$. המצבים העצמיים מתקובלים ע"י $E|\psi\rangle = E|\psi\rangle$.

(א) באמצעות סימוני דיראק והציגו היחידה $\int dx|x\rangle\langle x| = 1$ הראו כי

$$(1) \quad \int dx'\langle x|\mathcal{H}|x'\rangle\psi(x') = E\psi(x)$$

(ב) הוכחו (באינדוקציה) כי

$$(2) \quad \int \delta^{(n)}(x - x')f(x)dx = (-1)^n \int \delta(x - x')f^{(n)}(x)dx$$

כאשר $f(x) \in C^\infty$ פונקציה מבחן.

קחו $f(x) = (x - x')^n g(x)$, $g(x) \in C^\infty$ והשתמשו ב (2) כדי להראות כי

$$(3) \quad (x - x')^n \delta^{(n)}(x - x') = (-1)^n n! \delta(x - x').$$

(ג) הראו כי אלמנטי המטריצה $\langle x|\mathcal{H}|x'\rangle$ נתונים ע"י

$$(4) \quad \langle x|\mathcal{H}|x'\rangle = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \delta(x-x') + \frac{1}{2} m\omega^2 x^2 \delta(x-x')$$

(הדרכה: כתבו תחילה את אלמנטי המטריצה $\langle x|[x,p]|x'\rangle$ והראו כי $\langle x|p|x'\rangle = i\hbar\delta(x-x')$. בעת כתבו את את אלמנטי המטריצה $\langle x|[x,p^2]|x'\rangle$ והעזרו בנוסף בתוצאה (3) ובתכונת הקומוטטורים כדי לחשב את $\langle x|p^2|x'\rangle$).

(ד) העזרו ב (1) וב (2) על מנת לקבל את משוואת שרדינגר של אוטילטור הרמוני בהצגת המקום

$$(5) \quad -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2\psi(x)}{\partial x^2} + \frac{1}{2} m\omega^2 x^2 \psi(x) = E\psi(x)$$

3. חלקיק בעל מסה m הנמצא בבור פוטנציאלי הרמוני מותואר ע"י $\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle = 5|0\rangle + |3|1\rangle + |2|2\rangle$ כאשר $\{|n\rangle\}$ הם האצטומים של ההAMILTONIAN המתאים.

(א) מהי הסתברות למצוא את החלקיק במצב $|2\rangle$?

(ב) מהי תוחלת האנרגיה?

(ג) חשבו את $\langle p^2 \rangle$, $\langle x^2 \rangle$.

4. האופרטור המתאים גודל פיזיקלי נתון ע"י:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -2 \\ 0 & -2 & 4 \end{pmatrix}$$

(א) מהם הערכים האפשריים במדידת הגודל הפיזיקלי המתאים לאופרטור A ?

(ב) אם מצב המערכת נתון ע"י הווקטור $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, מהם הערכים האפשריים במדידת A ובאיזה הסתברויות הם מתקבלים (שים לב, הוא קטור אינו מנורמל)?

- (ג) אם מצב המערכת נתון ע"י הוקטור $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, מהם הערכים האפשריים במדידה A ובאיזה הסתברויות הם מתקבים?
- (ד) גודל פיזיקלי אחר מתואר ע"י האופרטור

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 7 & -5 \\ 7 & 3 & -8 \\ -5 & -8 & 15 \end{pmatrix}$$

אם מזדנו כרגע את הגודל הפיזיקלי המתאים ל B וקיים שתווצאת המדידה היא 2, מה יתקבל אם נזدוד עכשו את A ?

5. נתונה מערכת עם שלושה מצבים כאשר הAMILTONIAN H ואופרטור נוסף המતאר את המערכת A נתונים ע"י המטריצות

$$H = \hbar\omega \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, A = \mu \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- (א) מהם הערכים האפשריים המתקבים במדידה של A ?
- (ב) מהם הערכים האפשריים המתקבים במדידה של H ?
- (ג) מכינים את המערכת במצב $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. מהם הערכים האפשריים המתקבים במדידה של H ובאיזה הסתברויות הם מתקבים?
- (ד) מבצעים מדידה של A וכעבור זמן t מבצעים מדידה של H . בהנחה שבמדידה הראשונה מתקובל הערך הנדוע ביותר של A , מצאו את ערך התצפית של המדידה השנייה.